

Aus der Chirurgischen Klinik der Universität Bonn.

Direktor: Professor Dr. Freiherr von Redwitz.

Das kindliche Pleuraempyem.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 15. Februar 1937

von

Friedrich Virchow,

Arzt

aus Oberhausen (Rheinland).

Gedruckt mit Genehmigung
der hohen medizinischen Fakultät der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Freiherr v. Redwitz.



Die Erfahrungen aus dem vorigen Jahrhundert, als die chirurgische Behandlung des Pleuraempyems noch nicht durchgeführt war, haben gezeigt, daß ein großer Teil dieser Kranken an Sepsis, an Entkräftung, Amyloid zugrundeging (Landois). Bekannt sind auch die plötzlichen Todesfälle bei großen Exsudaten und Empyemen, die durch Abknickung der großen Gefäße, vor allem der Vena cava infolge der Verdrängungsercheinungen durch das Exsudat oder auch zuweilen bei Lagewechsel der Patienten, ferner durch Embolien der Lungenarterien hervorgerufen werden.

Diese Erfahrungssätze gelten besonders für die Empyeme im Säuglingsalter und beim Kleinkinde nicht nur wegen des klinischen Gepräges einer infanten Infektionskrankheit, sondern auch wegen der größeren Nachgiebigkeit des Mittelfells und der vielen bronchopneumonischen Herde, die es begleiten.

Sauerbruch, Grütz, Jamin u. a. heben hervor, daß eine besondere Gefährdung in der Störung des intrathorakalen Gleichgewichtes besteht. Im gewöhnlichen halten sich Lungenzug und Spannung der Brustwand das Gleichgewicht. Wird das Volumen der Lunge geringer, so muß die Zugkraft der Lunge zunehmen. Der Körper gleicht aber, solange er dazu imstande ist, das Gleichgewicht aus. Zwei Umstände wirken schädigend, einmal die Unfähigkeit, das Thoraxgleichgewicht wieder herzustellen, und zweitens, die pneumonische Verdichtung der Lunge und die dadurch herbeigeführte Minderung des Lungenzuges. Nicht die Größe des Exsudates ist maßgebend, sondern die Summe der Erscheinungen in Lunge und Brustkorb einschließlich Zwerchfell. Die kompensatorische Kraft der gesunden Seite kann nicht entfaltet werden, wenn das Mittelfell herübergezogen ist, womit auch eine Abknickung der Gefäße und Schädigung des Herzens verbunden ist. So läßt sich als Ergebnis dieser Betrachtungen die große Bedeutung des Mittelfells und der Funktion des Brustkorbes und des Zwerchfelles hervorheben.

Mortalität.

Die Mortalität bei Empyemen im Kindes- vor allem aber im Säuglingsalter ist sehr groß. Beträgt sie doch nach Erdély, nach Sammelstatistiken 40—80%. Ihre Ursache sieht er in der oft toxischen, phlegmonösen Form der Brustfellentzündung. Müller gibt bei einem Alter von unter 2 Jahren an 13 Fällen eine Sterblichkeit von 15,4% an; Allen berichtet über 112 Empyeme bei Kindern mit 7,1% Sterblichkeit; McEnery gibt eine Gesamtmortalität bei 94 Fällen in den Jahren von 1928—30 von 12,8% an. Lehtinen fand bei 102 Fällen im Alter bis zu 13 Jahren eine Mortalität von 20,5%, während sie bei den 137 Fällen von 13—75 Jahren nur 13,1% betrug.

Weiterhin spielt das Alter des Kindes eine ausschlaggebende Rolle. Je jugendlicher der Patient, desto gefährlicher die Erkrankung. (Mikula, Catteruccia). Stamm weist darauf hin, daß die Prognose günstiger ist, wenn das Empyem sich nach der Pneumonie und nicht während derselben entwickelt. Nach Frenkl und Margolis zeigen die synpneumonischen Erkrankungen höhere Mortalität als die metapneumonischen (50,5 : 26%). Nach Haas und Reinold verläuft aber in den ersten beiden Lebensjahren das Empyem meist synpneumonisch. Erst nach dem dritten Jahre begegnet man mit dem Auftreten der mehr akut verlaufenden lobären Pneumonie dem metapneumonischen Empyem, das eine bessere Prognose hat.

Ebenso erwähnt Klages und Sluckij den synpneumonischen Verlauf des Pleuraempyems. Frenkl weist hierzu an seinen 275 beobachteten Empyemen bei Kindern bis zu 12 Jahren nach, daß die synpneumonischen Erkrankungen eine höhere Mortalität als die metapneumonischen zeigten (50,5 : 26%).

Einige weitere Autoren möchte ich noch anführen, die zeigen, in welchem hohem Grade das Alter des Kindes mitbestimmend ist für die Mortalität des kindlichen Pleuraempyems. So befanden sich nach Frenkl und Margolis unter von 1911—31 beobachteten 634 Kindern mit Pleuraempyemen 275 (43%) bis zu 2 Jahren. Die Sterblichkeit betrug durchschnittlich 45,7%; sie sank von 73%

bei Säuglingen bis auf 12,5% bei Kindern über 8 Jahren. Zischinsky gibt sogar eine Mortalität von 96,42% unter den 84 unter 1 Jahr alten Kindern an, unter den Zweijährigen 87,8% und unter den älteren 63,72%. Hierbei handelte es sich in der überwiegenden Mehrzahl um Empyeme bei Pertussis oder Masern. Die hohe Sterblichkeit des Säuglings erklärt sich durch die daselbst stets begleitenden Lungenkomplikationen, durch die Schwere des Keuchhustens selber (Pertussisgehirn) und die häufige pyämische Genese des Empyems. In der Breslauer Kinderklinik fanden sich in den Jahren 1918—28, wie Reinold angibt, 71 Empyeme; davon entfielen auf das erste Lebensjahr 23 mit 19 Todesfällen, auf das zweite Lebensjahr 17 mit 7 Todesfällen, auf das 3.—8. Lebensjahr 31 mit 1 Todesfall.

Nach Klages gibt Sauther genau die Hälfte aller Fälle unter 10 Jahren an. Paschla und Lehmann geben im ersten Lebensjahr eine Mortalitätsziffer von 56—70%, für das zweite Lebensjahr 24—59%, für das dritte 13—17% an. Voelker beobachtete von 1926—33 98 Kinderempyeme, wovon 30 dem Säuglings- und Kleinkindsalter angehörten. Steinke erwähnt, daß von 310 Fällen nur 20 unter 6 Monate alt waren, das jüngste Kind war eine Frühgeburt, die 7 Stunden post partum eingeliefert wurde und am 24. Tag starb. Die höchste Sterblichkeit liegt in den ersten 6 Monaten des Lebens mit 80% Todesfällen; im 7.—12. Monat ist sie dann noch 54,5%. Sluckij fand unter 103 Empyemen 43,6% bis zu 2 Jahren. Die Mortalität betrug 47,5%; für Kinder bis zu 1 Jahr sogar 73,3%. Rohrer gibt die Sterblichkeit der Kinder, vor allem unter 1 Jahr, bis zu 40% an. Ratichvili fand unter 170 Empyemkranken im Hôp. in Tiflis 72,5% Kinder. McEachern führt fünf maßgebende amerikanische Krankenhäuser an, deren Mortalität bei Empyem der Kinder unter zwei Jahren zwischen 22,2 und 37,8% sich bewegt; im Winnipeg-Kinderhospital macht das Thoraxempyem 3% der Zugänge aus und ist häufiger als die akute Appendicitis.

Nach der Statistik der Vereinigten Staaten ist die Zahl der Todesfälle an Rippenfellentzündung ein Viertel bis ein Drittel so hoch wie die an Appendicitis. Die Hälfte der von Douglas be-

obachteten Fälle betraf Kinder, deren ungewöhnlich hohe Sterblichkeit an dieser Krankheit beachtenswert ist.

Die Häufigkeit der Empyeme im Kindesalter, vor allem im 2. Lebensjahr und darunter, bestätigen auch Finkelstein und v. Pirquet.

Die Häufigkeit des Auftretens der Pleuraempyeme im 1. und 2. Lebensjahre und der hohen Mortalität läßt sich auch damit erklären, wie Krieger erwähnt, daß nach Salge jeder eitrige Prozeß an den serösen Häuten des Säuglings sofort die schwersten Erscheinungen auslöst, indem der jugendliche Organismus nicht die gleichen Schutzkräfte wie der erwachsene aufbringen kann (Rivello). Dazu ist die Resorptionsfähigkeit der serösen Häute beim Kinde eine viel höhere (Ylppö), da die Resorptionsorgane des kindlichen Organismus noch weniger durch fortgesetzte infektiöse und andere Erkrankungen geschädigt sind, was den Frühtod auch durch Toxinresorption nach Larsson herbeiführt.

Eingehende Beobachtungen über das Resorptionsvermögen der Pleura hat Brock gemacht. Er erwähnt, daß die akute Entzündung der Pleura eine Beschleunigung der Aborption verursacht. Weiterhin ändert sich das Aborptionsvermögen der Pleura direkt mit dem Volumen der vorhandenen Flüssigkeit; bei tiefer Atmung nimmt es zu, bei oberflächlicher Atmung verringert es sich. Die gleichzeitige Anwesenheit von Luft im Pleuraraum, wie z. B. bei Pyopneumothorax, verbunden mit Kurzatmigkeit, bedingt die stärkste Aborption.

Die Mortalität des Pleuraempyems hängt außer von der Behandlungsmethode weitgehend von der Art und Malignität der Krankheitserreger ab.

Stransky erwähnt, daß von 11 Kindern mit Streptokokkenempyem 10 starben, wobei das Streptokokkenempyem stets kombiniert war mit Sepsis, Lungenabszessen, abgediegender Pneumonien. Die Streptokokkenempyeme sind meist nur ein führendes Symptom bei einer schweren Grundkrankheit. Dementsprechend ist die Prognose der Streptokokkenempyeme ernst zu stellen. U. a. unterscheidet es sich sehr wesentlich vom Pneumokokkenempyem auch dadurch, daß es während des Verlaufs der Pneumo-

nie sich einstellt, während das Pneumokokkenempyem als Folge der Pneumonie nach mehr oder weniger völliger Überwindung der Toxämie aufzutreten pflegt (Binney). Binney beobachtete an 12 Streptokokkenempyemen eine Mortalität von 25%, während 73 Pneumokokkenempyeme eine solche von 12,3% hatten.

Steinke sah unter 310 Fällen zu 69,5% Pneumokokkenempyeme mit einer Mortalität von 14,9%, Staphylokokkenempyeme zu 14% mit einer Mortalität von 21,4%, Sluckij unter 310 Fällen eine Mortalität für Pneumokokkenformen von 56%, für Streptokokken von 40%, für Staphylokokken von 37,5%.

Nach feinen Beobachtungen über die Behandlung des Pleuraempyems gibt Paszkiewicz eine Virulenzsteigerung der Keime vom Micrococcus catarrh., Bact. Pfeifferi, Staphylococcus pyogenes alb., Pneumococcus, Streptococcus haemolyticus zum Staphylococcus pyogenes aureus.

Neuhof beobachtete bei 182 Fällen 56 Fälle von Pneumococcus mit Mortalität von 3,5%, 45 Fälle mit Staphylococcus aureus mit Mortalität von 27,5%; 6 Fälle mit Staph. albus ohne Mortalität; 41 Fälle mit Streptococcus haemolyticus mit Mortalität von 18,7%; 7 Fälle mit Streptococcus viridans mit Mortalität von 14%; 17 Fälle mit Anaerobiern mit Mortalität von 29,4%; 10 Fälle mit Bakteriengemengen mit Mortalität von 20%.

Frenkl fand an feinen 275 Empyemen bei Kindern bis zu 2 Jahren im Gegensatz zur allgemeinen Anschauung, daß sich der Streptococcus weniger gefährlich als der Pneumococcus und der besonders bei den schweren septisch-metastatischen Formen gefundene Staphylococcus zeigte. Letztere Fälle verliefen sämtlich tödlich. Im übrigen war die Mortalität abhängig vom Grundleiden, wobei Scharlach die niedrigste Zahl aufwies (14,3%), während sie sich bei Typhus auf 25%, bei Masern auf 46,5%, bei Keuchhusten auf 80% erhöhte. In den Fällen von McNery waren die Mortalitätsziffern bei Infektion mit Pneumokokken 7,5%, mit Streptoc. haemolyticus 28%, mit Streptoc. viridans 33,3% und mit Staphylococcus 44%.

Die Höhe der Mortalitätskurve wird weiterhin bestimmt durch die von Jahr zu Jahr und Ort zu Ort außerordentlich stark wechselnde Malignität der Infektionen, unabhängig von der gewählten Behandlungsart (Heuer). So konnte die Mortalität in Beobachtungsreihen, deren statistische Vergleiche einzelner Gruppen des Empyem-Beobachtungsmaterials des John Hopkins-Hospitals von 425 Fällen aus den Jahren 1889—1921 und desjenigen des Allgemeinen Krankenhauses von Cincinnati 158 Fälle von 1922 bis 30 zugrunde lagen, während bestimmter Jahre Null sein, um bei anderen Beobachtungsreihen während anderer Jahre bis auf Werte von 50% anzusteigen. Einen Beitrag hierzu bringt Laurinsich, wonach im 1. Lebensjahr das erste Halbjahr weit seltener betroffen wird als die Zeit nach der Halbjahreswende. Diese jahreszeitliche Abhängigkeit ist aber bei den Kindern jenseits des 2. Lebensjahres weit deutlicher ausgeprägt als im 1. und 2. Lebensjahr. Riehoff kommt durch seine Beobachtung seit 1889 zu dem Ergebnis, daß die Mortalitätsziffer am höchsten war bei Kindern in schlechtem Allgemeinzustand, bei links- und doppelseitigen Empyemen und Komplikationen. Ochsenner konnte sogar in einem Vergleich zwischen der farbigen und weißen Rasse bezüglich der Mortalität Unterschiede feststellen. Bei den Farbigen war die Mortalität der linksseitigen Empyeme (33,3%) wesentlich höher als diejenige der rechtsseitigen (5%), während es bei der weißen Rasse die rechte Seite war, die die höhere Mortalität (13,6%) aufwies (links 3,19%).

Auch finden sich in dem Vorkommen des Pleuraempyems bei männlichem bzw. weiblichem Geschlecht Unterschiede. Laurinsich gibt unter 60 806 Patienten 842 Fälle mit eitriger Pleuritis an, wovon 518 Knaben und 324 Mädchen betroffen waren; 354 Erkrankungen fanden sich auf der rechten, 483 auf der linken und 5 auf beiden Seiten. Bauer fand bei 48 Empyemkranken 75% männlichen und 25% weiblichen Geschlechts. Daß das männliche Geschlecht häufiger betroffen ist als das weibliche, erwähnt auch Hanzawa. Ebenso gibt Steinke nach Bosch an, daß die Knaben häufiger befallen sind als die Mädchen. Ein Einfluß auf die Sterblichkeit besteht jedoch nicht, was das Geschlecht anbetrifft.

Gewöhnlich ist das Empyema pleurae nur auf einer Seite lokalisiert.

Rohrer fand unter 265 Fällen 6 mal ein doppelseitiges Empyem, die durch Thorakotomie behandelt wurden; 1 Kind starb. Steinke fand in der Literatur seit 1910 insgesamt nur 69 doppelseitige Empyeme; er selbst beobachtete davon 8 an Kindern in den Jahren 1920—31. In 6 von den 8 Fällen ging eine Lungenentzündung voraus. Einmal fand sich eine käfige Pneumonie und in einem Falle folgte die Krankheit einer Zahnextraktion, 6 mal wurde vom Eiter eine Kultur angelegt, wobei sich 5 mal Pneumokokken fanden, einmal Influenzabazillen. 6 von den 8 Patienten starben, also 75%, was mit der Schwere der kausalen Krankheit oder ihrer Komplikationen, nicht mit der Art der Behandlung zusammenhängt (einfseitige bzw. doppelseitige Drainage). Laurinich fand von 842 Erkrankungen 354 auf der rechten, 483 auf der linken und 5 auf beiden Seiten. Keyes berichtet über 41 doppelseitige Empyeme, wovon 38 aus der Literatur zusammenge stellt und 3 aus dem Newyorker Hospital beobachtet sind. Er teilt mit, daß beide Pleurahöhlen ungefähr gleichzeitig erkrankten, meist akut, und zwar entstand das andere meist als Komplikation eines einfseitigen Empyems. Die Ursache war meist eine Pneumonie, in 75%, feltener eine Pyämie, Tbc., Aktinomykose, Exantheme usw. Der Erreger war der Pneumococcus, Streptoc. haemolyticus und fand sich meist beiderseits als Erreger. Die Mortalität betrug 37%.

Gewöhnlich ist das Empyem auf einer Seite lokalisiert, feltener ist es doppelseitig. Die Statistiken, die Fabrikant und von Redwitz nach den Zahlen der verschiedensten Beobachter aus der Literatur zusammenge stellt haben, ergeben (Landois):

	Fälle	rechts	links	doppel- seitig	Mort.
Fabrikant	341	139	161	41	12 %
v. Redwitz	328	152	162	14	4,2 %

Bakteriologie.

Über die Häufigkeit der Bakterienarten seien noch einige Zahlen angeführt. McEachern fand in 75 Empyemfällen 46 mit Pneumokokken, 9 mit Streptokokken, 6 mit Staphylokokken, 2 gemischt, 6 steril; bei 6 lag kein Bericht vor. Paszkiewicz in 44 Kinderempyemen 29 mit Pneumokokken, 3 mit Mischinfektion von Pneumokokken und Staphylokokken und Bact. Pfeifferi, 7 mit Staphylokokken, 2 mit Staphyloc. aureus, 5 mit Staphyloc. albus, 3 mit Streptoc. haemolyticus, 3 mit Bact. Pfeifferi. Hanzawa fand an 72 operierten Empyemfällen in 40% der Fälle als Erreger Pneumokokken, dann folgten Streptokokken, Influenzabazillen und Staphylokokken. Im 1. Lebensjahr überwog weitaus als Erreger der Pneumococcus; 7 der 72 Empyemfälle zeigten Mischinfektion; am häufigsten waren Pneumokokken mit Influenzabazillen vermischt. Als Entstehungsursache ließ sich am häufigsten die Pneumonie feststellen, dann Erkältung oder Influenza, in 9% Quetschwunden des Brustkorbes. In 15% der Fälle ließ sich eine greifbare Entstehungsursache nicht nachweisen. Auch Mikula fand am häufigsten das Empyem verursacht durch Fränkel'schen Pneumococcus, in 61% aller von ihm behandelten Fälle (nach Feer in 80%), die meist zwei bis drei Wochen nach überstandener Lungenentzündung entstanden, wovon die metapneumonischen Empyeme prognostisch am günstigsten waren. Bedeutend gefährlicher waren Staphylokokken- und Streptokokkenempyeme; Empyeme nach Grippe zeichneten sich durch anaerobe Flora aus.

C. Beck fand bei 289 bakteriologisch untersuchten Pyothoraxfällen 131 mal Streptokokken, 86 mal Staphylokokken, 17 mal Saprophyten, 55 mal überhaupt keine Bakterien. Netter sah bei 109 Fällen 50 mal Streptokokken, 32 mal Pneumokokken, 12 mal Tuberkelbazillen, 15 mal Saprophyten. von Redwitz hat aus der Literatur die bakteriologischen Befunde von 533 Grippeempyemen zusammengestellt: Streptokokken in 71,19%, Pneumokokken in 12,29%, Staphylokokken in 7,62%, Influenzabazillen in 1,71%; Mischinfektion in 7,41%. Bei der Grippe sind diese Bak-

terien höchstwahrscheinlich nicht die eigentlichen Erreger der Krankheit, vielmehr handelt es sich um Sekundär- oder Mischinfektion. Ein uns unbekannter Erreger bereitet den Boden vor, auf dem die genannten Bakterien ihre deletäre Wirkung im Organismus ausüben können. Bei Kindern werden häufiger Pneumokokken beobachtet, bei Erwachsenen mehr Streptokokken, die sich vor allem beim traumatischen Empyem finden. Die Pneumokokkeneiterungen verlaufen sehr viel gutartiger als die Streptokokkenempyeme, eine Erscheinung, die durch die verschiedenartige Virulenz zu erklären ist (L a n d o i s). Unter den Bakterien, welche bei der Entstehung des Empyems eine ätiologische Rolle spielen, hebt P e r t h e s - L ä w e n hervor den *Diplococcus lanzeolatus* (den *Pneumococcus*) beim metapneumonischen Empyem, den *Streptococcus pyogenes* bei den Empyemen nach Erysipel, Streptokokkenpneumonie, Puerperalfieber, infizierten Wunden. Bei den Grippeempyemen wird meist ein hämolytischer Streptokokkus, weniger häufig der *Pneumococcus*, selten der Influenzabazillus gefunden. Der *Staphylococcus pyogenes* wird z. B. bei Empyemen nach malignen Furunkeln gefunden. Bei jauchigen Empyemen, die besonders als Komplikation bei Lungengangrän und Brochiektasen, seltener nach Thoraxverwundungen, auftreten, finden sich verschiedenartige Fäulnisbakterien. Bei tuberkulösen Empyemen lassen sich die Tuberkelbazillen meist erst nur durch den Tierversuch nachweisen. Bei den Empyemen, die als Komplikation bei Typhus oder Gonorrhoe selten nur beobachtet werden, sind Typhusbazillen und Gonokokken nachgewiesen worden. Ferner fanden sich bakteriologisch, wie L a n d o i s angibt, Friedländer'sche Bazillen, Colibazillen, *Proteus*, gramnegative und grampositive Stäbchen.

Über einen Fall von Sekundärinfektion eines Pleuraempyems mit Diphtheriebazillen berichtet V a h a l a von der Operationswunde aus: Im Februar 31 Tonfillektomie, Ende März links Empyem, Rippenrefektion mit Drainage; 16 Tage danach hohes Fieber, Zerfall der Operationswunde, Exitus; Obduktion, bakteriologische Tierversuche ergaben Infektion mit Diphtherie unter Assoziation von Streptokokken.

Einen außergewöhnlichen Fall gibt R a p a u t an, wobei es sich um eine primäre Typhuslokalisation in der Pleura bei unbekannter Eintrittspforte der Infektion handelte: Ein 20jähriger Patient erkrankte unter den Symptomen einer fieberhaften Pleuritis; durch Punktion wurde eitriges Exsudat entleert, das in Reinkultur Typhuserreger enthielt. Der negative bakteriologische Befund im Urin, Stuhl, Duodenalfaft lassen die Erkrankung als sekundäre Lokalisation in der Pleura bei einem Typhusträger oder Typhusrekoneszenten ausschließen, um so mehr, als auch anamnestisch keine Daten für eine überstandene Typhusinfektion zu erheben waren.

R u t k o w s k i erwähnt einen sehr seltenen Fall von operierter Pleuritis purulenta, wo die bakteriologische Untersuchung Streptothrixfäden zeigte. Diese Art von Pleuraempyem kommt wohl nur bei Leuten vor, die mit Heu und Stroh zu tun haben.

Actiologie.

Die Häufigkeit der Infektionskrankheiten im Kindesalter bedingt auch die Häufigkeit der Pleuraempyeme beim Kinde. So haben die Erfahrungen R o h r e r s im allgemeinen dahin geführt, auch die Infektion der Atmungsorgane als eine Infektion im Kindesalter anzusehen. Er berichtet aus den Jahren 1925—32 über 265 Fälle von Empyemen im Kindesalter, die sich mit 5 Ausnahmen an eine primäre Infektion der Atmungsorgane angeschlossen — Bronchopneumonie, lobäre Pneumonie. Ist aber die Pneumonie in Wirklichkeit eine Komplikation der ursprünglichen Infektionskrankheit, z. B. Masern oder Scharlach, so ist dies von großem Einfluß auf die Sterblichkeitsziffer. Es waren in dem Infektionskrankenhaus 78 Empyemfälle mit 21 Todesfällen zu verzeichnen. In mehr als der Hälfte aller Fälle konnte der Streptococcus haemolyticus isoliert werden. Als Grundkrankheit wurde angegeben: Scharlach 34, Masern 26, Diphtherie 10, Windpocken 5, Keuchhusten 3 und 28 mal trat Otitis als Komplikation auf. Bei den 21 Todesfällen zeigten 70% eine Infektion mit Streptococcus haemolyticus. Dieses Überwiegen der Streptokokkeninfektion, vereint mit der Tendenz, sich nicht zu lokalisieren, brachte als häufigste

Folgeerscheinung die Septicämie, wie R o h r e r aus der Zusammenstellung der beiden anderen Berichtskrankenhäuser von 187 Emphyemen mitteilt, wobei 34 mal Streptokokkeninfektion die Ursache war, mit einer Mortalität von 15 %, und die Komplikation Emphyem mit Septicämie trat 14mal mit einer Sterblichkeit von 57 % auf; 80 mal war darunter das Emphyem (Pneumokokkenemphyem) die Folge einer lobären Pneumonie als Endprodukt mit einer Mortalität von 7,5 %. In 12 % von den 146 untersuchten Kindern fand man Staphylococcus aureus mit einer Mortalität von 16 %, was damit auch eine hohe Sterblichkeit anzeigt. Häufig war das Staphylokokkenemphyem die Folge von Lungenabszessen oder multiplen subpleuralen Abszessen; in 7 % hiervon lag eine Mischinfektion vor, mit einer sehr hohen Mortalitätsziffer von 45 %.

Das Pleuraemphyem ist meistens eine sekundäre Erkrankung, wie S p a s o k u k o c k i j und V i n o g r a d - F i n k e l an ihren über 100 in den letzten zwei Jahren operierten Emphyemfällen eingehend studieren konnten: Primär war die Erkrankung nur äußerst selten (2 Fälle). Sie kann entstehen durch unmittelbares Eindringen der Infektion in die Pleurahöhle infolge penetrierender Brustwandverletzungen wie auch Rippenosteomyelitis oder einer Oesophagusperforation. Auch das Entstehen und Schicksal der serösen Pleuraexsudate, die nach ihrer Meinung trotz der allgemein verbreiteten Auffassung oft bereits infiziert sind, hängen vom primären Entstehen eines Eiterungsherdes im Lungenparenchym, Pleurairritation und darauf Infektion per continuitatem ab. Somit ist die eitrige Pleuritis keine primäre Erkrankung, sondern eine sekundäre, am häufigsten metapneumonische, von Lungeneiterung abhängige. B r o w n berichtet nach S t e i n k e, daß bei seinen 250 beobachteten Fällen bei 162 von 246 Kindern eine Pneumonie bestand, bei den übrigen waren gleichzeitig Komplikationen vorhanden bzw. waren Ursachen: eiternde Ohren, Bronchitis, Appendicitis, Maern, Diphtherie usw. N e u h o f f, H a r o l d und B e r c k fanden unter 373 Fällen von Pleuraemphyemen bei Kindern unter 13 Jahren in 17 %, bei Säuglingen in 71 % Staphylokokkeninfektionen. Der Krankheitsherd liegt nach Ansicht der erwähnten Autoren in der Lunge (Bronchus und Blutbahn) und ist gewöhnlich

ein Lungenabszeß, der in die Brusthöhle durchbricht und die staphylogene Infektion der Pleura verursacht. Laurin¹ fand unter 60 806 Patienten 842 mit eitriger Pleuritis. Die Mehrzahl der Erkrankungen trat im Anschluß an Bronchopneumonie oder Pneumonie auf; nur vereinzelt kam es zu eitrigen Pleuritiden nach Scharlach, Säuglingssepsis oder Otitis. Von den Bronchopneumonien hatte sich die Mehrzahl im Verlauf von Masern, seltener von Grippe, Keuchhusten oder aus unbekannter Ursache eingestellt.

Unter den mannigfachen Erkrankungen, die zur eitrigen Pleuritis führen können, steht an erster Stelle die Pneumonie. Sie tritt meist metapneumonisch, bei Kindern und Säuglingen vorwiegend synpneumonisch auf. Nach den Angaben von Stortz² findet sich eine eitrige Pleuritis in 6—7% der beobachteten Pneumonien, nach Jürgen³ in 5%, nach Fieseler und Grifolle sogar in 12,6 bis 15%. Nach den Erfahrungen von Hudson jr.⁴ an seinen 86 beobachteten Empyemfällen ist jeder Pneumoniefall im Stadium der Rekonvaleszenz auf Empyem verdächtig und nach den Untersuchungen von Hill⁵, wie Hudson erwähnt, folgt nach Lungenentzündungen in 4—5% der Fälle das Empyem.

Auch kann es zu einem Empyem der Pleura kommen durch ein Trauma, bei Verletzungen von Lunge und Pleura, wie bei Lungenschüssen im Kriege und Stichverletzungen, vor allem nach den Erfahrungen von Landois⁶ bei Lungensteckschüssen, wo das Geschoß frei im Komplementärraum liegt. An die primäre Blutung schließt sich bald die Pleuritis an, die auf Infektion des Haematoms zurückzuführen ist und häufig zu einem Empyem führt. So gibt nach Landois Gerhardt⁷ in 14% seiner Lungenschußverletzten ein Empyem an, Holbeck⁸ in 10,2%, Rotter⁹ in 10,4%, Ehret¹⁰ in 9%, Moritz¹¹ in 12%, Burckhardt¹² und Landois¹³ in 10%.

Die schlechte Prognose dieser traumatischen Empyeme wird von Sauerbruch-Schmidt¹⁴ im besonderen erwähnt, da meist hierbei ein Pneumothorax mitentstanden ist. Die Keime finden im Bluterguß einen sehr günstigen Boden; sie wuchern und steigern ihre Virulenz. Der Widerstand des Brustfells ist durch den Pneumothorax vermindert. Diese rein primäre Infektion über-

schwemmt mit einem Schlage den ganzen großen Hohlraum, wobei es zur Ausbildung einer Pleuraphlegmone kommt und schnell setzt eine ausgiebige Toxinresorption ein. Die Kranken fiebern alsbald hoch; der Puls wird klein und rasch; frühzeitig treten Verdünnungsercheinungen auf. Die Kräfte verfallen zusehends und meist erfolgt unter dem Bilde der Sepsis, oft mit Ikterus, der Tod.

Seltener ist zwar das Entstehen eines Pleuraempyems, nur allein bedingt durch ein Trauma, z. B. Sturz von einer Schaukel, wie S a n o in einem Fall beobachtete, bei einem 4 $\frac{3}{4}$ Jahre alten Mädchen; 20 Tage nach dem Sturz Fieber, Hautröte in Höhe des I. L.W., Punktion ergab streptokokkenhaltigen Eiter, der aus einem Empyem der linken Pleurahöhle stammte. H a n z a w a beobachtete an 72 Empyemfällen in 9% ein Empyem, durch Quetschungen des Brustkorbes hervorgerufen.

Dies Auftreten eines Empyems im Anschluß an einen künstlichen Pneumothorax (S a u e r b r u c h) spielt im Kindesalter keine Rolle.

Die Infektionsmöglichkeiten der Pleura sind damit noch lange nicht erschöpft. Eine Pleuritis oder ein Empyem ist meist keine Erkrankung sui generis. Vielmehr ist sie entweder das Symptom der Erkrankung eines benachbarten Organs oder sie hat durch Verschleppung von Keimen auf dem Blut- oder Lymphwege von ferner liegenden Stellen des Körpers ihren Ursprung genommen.

Als Ursache für eine eitrige Brustfellentzündung können weiterhin genannt werden: nach L a n d o i s Lungengangrän, Lungenabszesse, — häufig nach Perforation, manchmal auf dem Lymphwege —, Bronchiektasen, Wirbelfäulen-, Brustwand- und Bronchialdrüsenvereiterung, eitrige Pericarditis, Osteomyelitis einer Rippe.

Auch kann eine Affektion der Bauchhöhle zu einem Pleuraempyem führen (subphrenischer Abszeß, vereiterter Leberechinokokkus und paranephritischer Abszeß), L a n d o i s, B a u e r, R o h r e r. Die Bakterien wandern durch die Lymphbahnen des Zwerchfells hindurch und erzeugen dann eine Pleuritis diaphragmatica oder ein Empyem.

Endlich kann nach L a n d o i s die Pleura metastatisch auf dem Blutwege im Verlauf schwerer Infektionskrankheiten infiziert werden, so bei Mafern, Scharlach, Keuchhusten, Gelenkrheumatismus, Typhus, Blattern, Furunkulose, Osteomyelitis, Grippe, was besonders bei der schweren Grippeepidemie 1918 in Erscheinung trat. Bauer beschreibt ein metastatisch entstandenes Pleuraempyem nach septischer Angina, und zwar beiderseits, wo weiterhin sich eine Humerusosteomyelitis und Cystitis ausbildeten.

Auf die üble Prognose und Folgeerscheinungen der durch Grippepneumonie, wie auch Bronchopneumonie hervorgerufenen Pleuraempyeme weisen S a u e r b r u c h - S c h m i d t hin. Hierbei bilden sich rasch vermehrende, stark verdrängende, insbesondere die Atmung sowie den Allgemeinzustand ernst schädigende, an Keimen, zumal an Streptokokken reiche Ergüsse aus. Durch Verschleppung kommt es, vor allem bei den Grippeempyemen, wobei häufig die Lungenwurzeldrüsen vereitern, zum Einbruch in die Lunge, zur Herzbeutelentzündung, zur Empyembildung auf der anderen Seite oder durch das Zwerchfell hindurch zur Bauchfellentzündung, oder es bilden sich Eiterherde in den Muskeln, in der Nierenrinde, in der Ohrspeicheldrüse aus, entstehen Thrombophlebitis, Mittelohr- und Hirnhautentzündungen.

Die gleichen Autoren heben besonders die schlechte Prognose der metastatischen Entzündungen des Brustfells hervor.

Zur Ursache eines Empyems mit Bronchialfistel wird meist der Durchbruch einer tuberkulösen Kaverne (H e a d), weniger häufig Lungenabszesse, Gangrän, oder ein an der Oberfläche gelegener Infarkt.

Anatomie, Klinik, Diagnostik.

Klinisch und anatomisch tritt das Pleuraempyem nach S a u e r b r u c h - S c h m i d t und L a n d o i s auf: unmittelbar unter der Brustwand als wandständiges, als epidiaaphragmales oder basales, ferner als mediastinales (zwischen Pleura visceralis und mediastinalis), als apikales an der Lungen Spitze und als interlobäres Empyem. Dieses letztere ist erst in neuerer Zeit, insbesondere durch französische Autoren, von deutscher Seite durch O r t n e r,

Fleischner, durch P. Clairmont bekannt geworden, und lokalisiert sich in den interlobären Spalten zwischen zwei Lungenlappen.

Man teilt die Brustfellentzündungen nach der Art ihrer Ausschwitzungen ein und unterscheidet eine Pleuritis fibrinosa (sicca), Pleuritis serosa (Serothorax) und Pleuritis purulenta (Empyema pleurae).

Einfache Pleuritis fibrinosa ist häufig nur Vorläufer eines serösen oder eitrigen Exsudates und begegnet dem Chirurgen bei Rippenbrüchen, Quetschungen und sonstigen Brustverletzungen, sowie nach intrathorakalen Eingriffen. Umschriebene Pleuritis fibrinosa entwickelt sich bei subphrenischen, mediastinalen Entzündungen (Perikarditis), sowie über Abszeß- und Gangränherden der Lunge. Anschoppungen eines Unterlappens der Lunge kann von Pleuritis diaphragmatica begleitet sein, deren Erscheinungen an das Krankheitsbild einer Cholecystitis, eines perforierten Ulcus ventriculi oder sogar einer append. Peritonitis denken lassen können.

Was die Behandlung anbelangt, so wäre zunächst abzuwarten und intern zu behandeln.

Die entzündliche, wässrige Brustfellentzündung, Pleuritis serosa, ist von dem Hydrothorax, dem meist beidseitigen Transsudate bei Herz- und Nierenleidenden, dem Hämothorax, dem Chylothorax, die die Gruppe der nichtentzündlichen Ergüsse bilden, zu unterscheiden. Meist ist der Erguß klar, eiweißreich, keimfrei und zellarm. Die reinsten Formen sind Begleiter von Brustfell und Lungengeschwülsten oder von Lungenechinokokken. Ebenso gehören hierher die serösen Exudate, die Grawitz bei den Staubeinatmungskrankheiten beschreibt. Auch während mancher Grippe-Lungenentzündung tritt rein seröser Erguß auf, der häufig infolge der ungewöhnlich großen Durchlässigkeit der Brustfellgefäße wie Fleischwasser aussieht. Ein großer Teil der sogenannten Erkältungs-brustfellentzündungen gehört zur Tuberkulose und ist deren erstes klinisches Zeichen.

Oft ist auch die Ursache der Pleuritis serosa unklar und stellt den Übergang zur Pleuritis purulenta dar.

Die Beschwerden der Pleuritis serosa sind gewöhnlich nur gering, mit mäßigem Fieber, Pulsbeschleunigung und Beschwerden beim Atmen. Meistens gehen die Erscheinungen bald zurück und der Erguß wird im Körper aufgesaugt. Bei dem gutartigen Verlauf reichen örtliche Maßnahmen aus, wie Umschläge, strenge Bettruhe, harntreibende Verordnungen, kochsalzarme Kost. Nur selten muß man bei größerem Erguß, starken Verdrängungsercheinungen, anhaltendem Fieber, Sinken des Allgemeinzustandes eingreifen, wo meistens dann zwei bis dreimalige Punktionen genügen, um dadurch oft mit einem Schlage die natürliche Aufsaugung des Ergusses und die Heilung zu erreichen.

Unter dem Namen Pleuritis purulenta werden sämtliche Brustfellergüsse von trübseröser, fibrinöser oder gar jauchiger Beschaffenheit mit allen Übergängen zusammengefaßt. Scharfe Grenzen zwischen den einzelnen Formen sowie gegenüber dem serösen Exsudat gibt es kaum, da meist die eitrigen Ergüsse vorher eine Zeitlang serös und sogar steril zu sein pflegen. Auch kommt es vor, daß die oberen Schichten noch serös, die unteren bereits eitrig aussehen.

Beim Progredientwerden der Entzündung verliert die Pleura ihren spiegelnden Überzug und überzieht sich mit einem feinen Fibrinhäutchen, wobei die Pleura costalis stärker beteiligt zu sein pflegt als die Pleura pulmonalis (L a n d o i s). Die Gefäße erweitern sich und es bilden sich gleichzeitig auf der Lungenoberfläche kleine Ekchymosen aus. Dazu tritt dann das Exsudat auf, in das allmählich die Bakterien übertreten, sich in ihm vermehren und die anfänglich klare Flüssigkeit in eine eitrige umwandeln. Vor allem beim frühzeitigen Vorhandensein von polynukleären Leukozyten in einem noch anfänglich serös scheinenden Exsudat, das man zentrifugiert hat, besteht die Neigung zur Vereiterung. Es scheidet beim längeren Stehenlassen Fibrin aus und gibt bei Zusatz von Essigsäure einen stark flockigen Niederschlag. Jetzt fallen auch die durch die Probepunktion gewonnenen bakteriologischen Untersuchungen positiv aus, was äußerst wichtig und maßgebend für die Behandlung des Pleuraergusses sowie auch für die Prognosestellung

des Krankheitsfalles ist. Daher ist eine bakteriologische Untersuchung in keinem Fall zu unterlassen.

Auch ist es möglich, daß sich durch die starke Absonderung des Fibrins Verklebungen ausbilden und sich die Exsudate abkapfeln können. Somit können sie mehrkammerig werden, oder es kommt nur zu einem partiellen Empyem.

Ein kompliziertes System von infizierten Höhlen kann dann dem Chirurgen nach Landois bei der Behandlung große Schwierigkeiten machen, insbesondere aber, wenn nach einer ausgeheilten Pleuritis alte Adhäsionen zwischen Lunge und Pleura costalis bestehen bleiben und sich von neuem später ein Pleuraempyem ausbildet.

Hierzu macht Thomson noch in der Gegenüberstellung von Pneumokokken- und Streptokokkenempyem erwähnenswerte Ausführungen: Da das bei der genuinen Lappenpneumonie entstehende Empyem sich langsam sekundär nach bzw. mit dem Abklingen der pneumonischen Veränderungen entsteht, genügt die Zeit meist, um die Eiteransammlungen in der Pleurahöhle mehr oder weniger abzukapfeln. Während beim Streptokokkenempyem, das eine Streptokokken-Bronchopneumonie begleiten kann und das meist primär mehr oder weniger gleichzeitig mit der Erkrankung der Lunge sich rasch auszubilden pflegt, somit nicht genügend Zeit für eine Abkapfelung vorhanden ist, wenn das schwere Krankheitsbild in Erscheinung tritt.

Hat sich ein stärkeres Exsudat ausgebildet, so sinkt es zumeist, dem Gesetz der Schwere folgend, nach unten und füllt zuerst den Komplementärraum. Die Lunge wird von der Pleura costalis abgedrängt. Allen Flüssigkeitsansammlungen im Brustfellraum ist nun gemeinsam, daß es zu den sehr bedrohlichen Verdrängungsercheinungen der an der Lunge benachbarten Organe kommt, deren Ausdehnung vom Ansteigen und der Schnelligkeit der Eiterbildung abhängt. Anfänglich stehen die Ergüsse, wenn sie noch gering sind, unter dem negativen Druck der Pleurahöhle, was sich durch eine Punktion, bei der aus der Kanüle kein Exsudat zu gewinnen ist, bestätigen läßt. Haben sich dann Verklebungen ausgebildet und ist das Exsudat größer geworden, wird der Druck positiv und kann

fogar, wie Landois angibt, bis auf 20 cm Wasser ansteigen, der durch den hydrostatischen Druck der Flüssigkeit und durch den Druck, der durch den elastischen Zug der überdehnten Thoraxwand ausgeübt wird, bedingt ist. Mit zunehmendem Druck des Exsudates verliert die Lunge ihre Elastizität und wird mehr oder weniger atelektalisch, zieht sich zum Hilus zusammen. Das Zustandekommen dieser Atelektase haben die näheren Untersuchungen von Lichteim und Rosenbach, die Landois erwähnt, begründet: Normalerweise dehnt bei der Inspiration das Zwerchfell, infolge von elastischer Zugwirkung auf die Lungenunterfläche, diesen unteren Teil aus; bei der Expiration tritt das Zwerchfell in die Höhe und die Luft wird wieder entleert. Beim Vorhandensein eines Exsudates gelangt dieses Geschehen nicht voll zur Wirkung. Der Unterlappen der Lunge wird nicht völlig entlüftet, die Luftmenge stagniert darin und wird allmählich resorbiert, teils von den Blutgefäßen der Lunge, teils vom Exsudat. Damit tritt langsam die Atelektase der Lunge ein. Gleichzeitig veranlaßt das Steigen des Exsudates bei Fehlen des negativen Druckes eine Erschwerung des Venenblutstromes, die Kreislaufverhältnisse werden gestört, das Herz muß zur Aufrechterhaltung des konstanten Blutdruckes erheblich Mehrarbeit leisten. Die Vena cava kann fogar durch den Druck des Exsudates oder auch durch die stärkere Kontraktion des Zwerchfells von der gesunden Seite her abgeknickt werden.

Hierzu treten die Verdrängungserrscheinungen des Herzens, des sehr beweglichen Mediastinums, worauf ich eingangs im besonderen bei Kindern hinwies, der Leber und des unteren Thoraxteiles der kranken Seite auf, was bei Kindern infolge der Elastizität und Exkursionsfähigkeit des letzteren anfangs kompensatorisch den ersteren Organen gegenüber günstig ist. Der untere Thoraxteil wölbt sich stärker vor als der gesunde. Die normalerweise beim Kinde beinahe senkrecht stehenden Rippen verlaufen mehr waagrecht. Bei linksseitigem Exsudat kann das Herz und mit ihm das Mediastinum so weit nach rechts verdrängt werden, daß die Pul-sation des Herzens und die absolute Herzgrenze bis zur Parasternal- und Mamillarlinie fogar beobachtet werden kann; bei

rechtsseitigem Exsudat, wobei die Leber erheblich tiefer treten kann, wird u. U. der Herzspitzenstoß bis in die linke vordere und mittlere Axillarlinie beobachtet.

Das klinische Bild des Pleuraempyems trägt ganz den Charakter einer schweren Infektionskrankheit, da es einen abgeschlossenen Abzeß darstellt und es somit zur Eiteraufnahme kommt. Unter Schüttelfrösten setzt Fieber ein, das gleich hoch anhält oder stark auf und ab schwankt. In anderen Fällen hat sich die Pneumonie nicht gelöst, dauerndes Fieber bleibt bestehen, oder es tritt nach anscheinender Gefundung erneuter Fieberanstieg auf. Bei Kindern macht sich leicht ein Gewichtsstillstand bzw. -abnahme bemerkbar. Es kann zu rascher Abnahme der Körperkräfte und fortschreitendem, allgemeinen Verfall und Atrophie kommen. Bei schweren Formen, insbesondere den traumatischen, können septischer Ikterus, Milzschwellung und Albuminurie hinzutreten. Gleichzeitig können Störungen im Digestionsapparat, wie Erbrechen, Appetitlosigkeit, Durchfälle vorherrschen oder auch meningitische Reizerscheinungen wie Krämpfe, Erbrechen, Benommenheit, die Zybelle anführt. Der Kranke liegt auf der kranken Seite, damit der gesunde Lungenflügel frei atmen kann. Die gesunde Lunge ist bestrebt, soweit wie möglich aus- und einzusatmen, was der Kranke zu unterstützen sucht, vor allem bei einem großen Erguß im Pleuraraum, daß er aufrecht im Bett sitzt und nach Luft ringt. Das Gesicht ist bläulich-blaß (cyanotisch), und der Ausdruck ist ängstlich. Die kranke Brusthälfte liegt still, ist vorgewölbt und die Zwischenrippenfurchen sind verstrichen. Neben dieser hochgradigen Dyspnoe, die sich vor allem bei Kindern in der Nasenflügelatmung ausdrückt, begleitet oft von einem quälenden, trockenen Husten, ist der Puls gewöhnlich sehr beschleunigt, klein und zuletzt unregelmäßig.

Die physikalischen Untersuchungsverhältnisse sind wie Finkelstein, Rovello, Zybelle hinweisen, bei Kindern infolge Elastizität des kindlichen Thorax oft unklar; trotz eines ausgedehnten Ergusses kann Bronchialatmen fortbestehen. Es findet sich aber doch stets eine massive Dämpfung des Klopffalls neben aufgehobenem oder abgeschwächtem Stimmfremitus. Das Atem-

geräusch ist meist aufgehoben. Die Grenze des abgedämpften Klopfes verläuft häufig bei kleineren und mittleren Exsudaten in der klassischen Form als Parabel (Ellis - Damoiseau) mit dem Scheitelpunkt schulterwärts, in der mittleren bzw. nahe der hinteren Axillarlinie und die nach vorn und hinten abfällt. Neben der Wirbelfäule besteht oft hierdurch auf der kranken Seite ein mit der Spitze nach unten gerichtetes Dreieck mit hellem Klopfeschal (Garland). Ist aber die Lunge auch entzündlich verdichtet, so besteht ebenfalls hier Dämpfung. Bei größeren Ergüssen ist diese parabolische Begrenzung nicht mehr so deutlich zu erkennen.

Durch die Verschiebung der Herzdämpfung und des Spitzenstoßes bekundet sich die Verdrängung des Mittelfellraumes, auf die auch das Grocco-Rauchfuß'sche Dämpfungsdreieck über der gefundenen Brusthälfte hinten unten neben der Wirbelfäule zurückzuführen ist. Domarus führt hierzu an, daß die obere Spitze dieses Dämpfungsdreieckes annähernd der Höhe des Exsudates entspricht. Als Ursache dieses Dämpfungsdreieckes hält er die durch das Exsudat bewirkte Verminderung der Schwingungsfähigkeit dieses Teiles der Wirbelfäule.

Durch das tieffstehende Zwerchfell rückt rechts die Leber stark herab; links findet sich oft eine Dämpfung bis an den Rippenbogen hinunter.

Sollte aber doch einmal der Lungenbefund negativ sein, so weisen die Patienten eine ausgesprochene Dyspnoe auf, die dann in merkwürdigem Gegensatz zum sonstigen klinischen Befund steht.

Tritt das Empyema pleurae im Anschluß an Lungenerkrankungen oder wie bei Säuglingen und Kleinkindern meist mit dieser zusammen auf, so zeigt das hohe Fieber zunächst keine Neigung zum Absinken oder es treten starke Inter- und Remissionen auf. Erst wenn das Empyem sich genügend durch Schwartenbildung abgekapselt hat, kann die Temperatur fallen und sogar zuweilen fast normal werden. Beim älteren Kind ist es möglich, daß nach der Krisis und Abheilung der Pneumonie plötzlich erneuter, weiterhin bestehender Fieberanstieg auf ein Empyem hinweisen kann.

Unerläßlich zur Klärung der Diagnose ist die Probepunktion, die, wenn nötig, auch wiederholt und frühzeitig gemacht werden soll. Sie ist stets indiziert auf Grund des Untersuchungsergebnisses bei Verdacht auf Eiter im Brustfellraum. Sie verschafft Klarheit über die Beschaffenheit des Ergusses und gibt wertvolle Aufschlüsse für die Behandlung und Prognose durch die bakteriologische, kulturelle, evtl. durch Tierversuch gesicherte Untersuchung des Ergusses oder des Eiters.

Nach Finkelstein ist der Pneumokokkeneiter rahmig, dickflüssig, gelbgrün. Streptokokkeneiter ist von flockiger, milchgrauer Beschaffenheit, während der Staphylokokkeneiter nach Feer dünnflüssig und foetid ist.

Ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel ist die Röntgenuntersuchung zur Sicherstellung eines Pleuraempyems. Sie gibt uns Aufschluß über Begrenzung und Ausdehnung des Ergusses. Wir erhalten Klarheit über den Sitz des Empyems und über die Bildung von Verwachsungen oder Schwarten, über den Tiefstand oder Nichtbeweglichkeit des Zwerchfelles, über die Verschieblichkeit der Schattengrenze bei Lagewechsel des Patienten, auch über die Art des Exsudates, indem eine Eiteransammlung einen dichteren Schatten gibt als ein einfacher Erguß.

Wird ein Empyema pleurae sich selbst überlassen, so kann es, wenn der Erguß nur klein gewesen ist und sich durch Schwarten- und Narbenbildung ausreichend abgekapselt hatte, zur spontanen Selbstheilung kommen. Der Eiter ist in käfige Massen umgewandelt und resorbiert worden. Durch die Schwielen- und Narbenbildung kann es aber wiederum zu Verunstaltungen der Wirbelfäule und der Rippen kommen. Landois beschreibt diese Folgen im besonderen, wenn nicht operativ eingegriffen wird: Die Wirbelfäule biegt sich in Form einer Konvexskoliose nach der kranken Seite herüber; Zwerchfell und Mittelfell werden zur kranken Seite herübergezogen. Die Lunge der betroffenen Seite kann vollständig kollabieren und mit einer dicken Schwarte überzogen werden. Kompensatorisch dehnt sich die gesunde Lunge stark aus und erreicht einen gewissen Grad von Emphysem. Der Raum, aus dem der Eiter stammte, wird allmählich durch die Brustwand verklei-

nert, die sich kahnförmig einzieht, wobei sich die Rippen dachziegelartig ineinanderschieben. Im allgemeinen sind diese üblen Ausgänge selten geworden, da in den letzten Jahren die Hilfsmittel zur Diagnostik eines Empyems umfangreicher und sicherer geworden sind und heute auch frühzeitig chirurgische Behandlung eintritt.

Oder es kapfeln sich, wie Sauerbruch-Schmidt hervorheben, Abszeßreste ab, die dann von neuem aufflackern können, sodaß ein erneuter Fieberanstieg auftritt. Im ungünstigsten Fall können diese Abszeßreste, auch wenn sie sich mit sehr derben Schwarten zurückgebildet haben, nicht völlig veröden, zumal wenn eine Bronchialfistel besteht. Es bleibt eine Empyemresthöhle zurück und die Absonderung kann, wenn ein Durchbruch erst sehr spät erfolgt, manchmal recht stark sein. Diese chronische Eiterung kann für den Allgemeinzustand des Patienten sehr verhängnisvoll werden; es kann zur amyloiden Entartung der inneren Organe, vor allem der Niere, und zur raschen Allgemeinvergiftung kommen. Selbst zweckmäßig chirurgische Eingriffe vermögen dann auch nicht mehr den Ausgang abzuwenden.

Erfolgt bei größeren Eiteransammlungen im Pleuraraum kein frühzeitiger Eingriff, so kann der Eiter durch die Thoraxwand durchbrechen. Diesen Vorgang, der jetzt höchst selten geworden ist, bezeichnet man als ein Empyema necessitatis oder auch, wie Franz König vorschlug, als Empyema perforans. Der Eiter entleert sich durch die Brustwand unter die Haut und durch diese nach außen vorne am Thorax dort, wo die großen schützenden Muskelmassen fehlen, meist in Höhe des 5. Interkostalraumes. Die Haut wölbt sich vor dem Durchbruch stark vor, ist hochrot bis livid gefärbt und heiß. Auf diese Weise kommt es zu einem nach außen hin offenen Pneumothorax, der viel harmloser ist im Gegensatz zu dem nach innen hin offenen Pneumothorax. Hierbei bricht das ursprüngliche Pleuraempyem in die Lunge ein, und es kommt zur Ausbildung einer inneren Lungen- oder Bronchusfistel. Ist das Empyem nur sehr klein, so kann es der Patient einfach aushusten. Nach einer solchen maulvollen Eiterexpektoration fühlt sich der Kranke erleichtert und das Fieber kann absinken. Günstigenfalls

heilt so das Empyem aus, jedoch besteht die Möglichkeit des Bestehenbleibens einer Empyemresthöhle, die mit dem Bronchus in Verbindung steht, wobei das Fieber wieder ansteigen kann.

Meistens ist aber der Eiterabfluß nur mangelhaft und keine Heilung zu erwarten. Dazu kann nach Landois sich die akute Gefahr des verhängnisvollen, von innen her offenen Ventilspannungspneumothorax ausbilden, der durch Klappenbildung an der Durchbruchstelle ein inspiratorischer ist. Das Bronchialrohr kann plötzlich mit großen Eitermassen überschwemmt werden, und es drohen Aspiration und Erstickung. Auch besteht hierbei leicht die Gefahr des Übergreifens auf den anderen Lungenflügel (Eiteraspiration).

Oft ist die Diagnostik gegen einen Lungenabszeß schwierig; man kann dann zur Klärung in das Empyem Methylenblau einspritzen. Der ausgehustete Eiter sieht dann blau aus.

Bei dem Durchbruch eines Lungenabszesses oder Gangränherdes in den Pleuraraum, die die Folge einer croupösen oder Bronchopneumonie, einer bronchiektatischen Eiterung, des Eindringens eines Fremdkörpers von den Atemwegen her, einer einzelnen oder mehrfachen Embolien sind, hört schlagartig der eitrige oder gangränöse Auswurf auf. Es erscheint eine Dämpfung und der Allgemeinzustand des Kranken verschlechtert sich. Zum Nachweis der Lungenabszesse dienen röntgenologische Untersuchung, Thoraskopie und -graphie, mikroskopische Sputumuntersuchung auf elastische Faser und Blut. Die Prognose kann sehr ungünstig werden, da es hierbei zu der üblen Brustfellverjauchung kommt, die auch wieder zum Pneumothorax führen kann, entweder in der Form des Spannungspneumothorax durch Ventilbildung oder häufiger noch der Gasentwicklung.

Diese Gasbildung kann aber auch schon bei einem einfachen Pleuraempyem auftreten durch eine Milchinfektion, wobei sich dann ein geschlossener Pneumothorax ausbildet, der bis zum Spannungspneumopyothorax fortchreiten kann.

Ein Pneumothorax, der, wie Mikula betont, nach Durchbruch von Kavernen, Lungenabszessen, Bronchiektasen oder Perforation von Lungenverätzungen der Speiseröhre entstehen kann,

endet meist tödlich, ebenso Empyeme nach septischen Infektionskrankheiten.

Selten ist die Ausbildung einer direkten Lungenfistel oder Bronchialfistel. Bettmann weist zwar darauf hin, daß die Häufigkeit des Vorkommens von Bronchialfisteln bei Kindern meistens auf 10% zu veranschlagen ist. Häufiger ist sie bei Kindern als bei Erwachsenen und häufiger bei intralobären Empyemen als bei anderen. Sie kann bei einem nach außen durchgebrochenem Empyem (*Empyema necessitatis*) entstehen, wenn es auf einen Lungenherd zurückgeht. Dieser hat dadurch eine Verbindung durch die Brustfellhöhle und die Brustwand hindurch mit der Außenluft und es besteht dann eine äußere indirekte Lungenfistel. Hängt das Lungengewebe aber durch Brustfellverklebung unmittelbar durch die Brustwand hindurch mit der Außenluft in Verbindung, indem es mit dieser verwächst, so liegt eine äußere direkte Lungen- oder Bronchialfistel vor. Die Ausheilung dieser Fisteln von selbst ist kaum möglich und bedarf notwendig der chirurgischen Behandlung. Zur Sicherung der Diagnose solcher Fisteln bedient man sich der Perthes'schen Saugvorrichtung, wobei bei Bestehen einer Lungenfistel die Luftverdünnung in der Saugflasche ausbleibt.

Sauerbruch weist noch auf eine besondere seltene Form des Empyems hin: Ist das Empyem linksseitig abgekapselt und die Brustwand noch sehr nachgiebig, wie beim Kinde, so kann durch Fortpflanzung der Pulsation der Aorta das Empyema pulsans entstehen.

Beim interlobären Empyem ist die Entstehung eines nach innen hin offenen Pneumothorax nicht selten, der zum Spannungspneumothorax durch Ventilbildung fortschreiten kann (Landois). Sauerbruch-Schmidt führen an, daß die interlobären Empyeme am häufigsten auf angrenzende Lungenherde zurückgehen. Jedoch können auch die übrigen Entstehungsurflächen wie für die Empyeme im großen Pleuraraum in Betracht kommen. Diese interlobären Empyeme finden sich in den Spalten zwischen den Lungenlappen, entweder im kurzen, wagerechten Spalt oder im rechten bzw. linken schrägen Spalt.

Die Diagnostik dieser interlobären Empyeme ist ziemlich schwierig, da die physikalischen Zeichen häufig wechseln. Die Patienten erkranken mit heftigen Seitenschmerzen, vor allem im Bereich der Achselgegend, mit Schüttelfrost und Fieber, inter- und remittierenden Charakters, zunehmender Abnahme des Allgemeinbefindens, ausgesprochener Dyspnoe, die klinisch ganz im Gegensatz zum negativen Lungenbefund stehen kann. Nach Clairmonts Beobachtungen, die Landois im besonderen anführt, findet sich die Dämpfung, die der Interlobärspalte entspricht, an drei sehr charakteristischen Stellen: 1. interscapular in der Höhe des 3.—6. Brustwirbels, 2. in der Achselhöhle in Höhe des 4. und 5. Interkostalraumes, 3. vorne im Bereich der 3. und 4. Rippe. Dazu ist im Bereich der Dämpfung das Atemgeräusch und der Stimmfremitus abgeschwächt. Der Patient gibt bei der Palpation meist weiterhin noch dementprechend druckempfindliche Zonen an, die im Bereich des 4., 5. oder 6. Interkostalraumes unter oder vor der Achsel liegen. Gelegentlich finden sich hier auch Weichteilödeme. Sollte klinisch der Befund eines interlobären Empyems so gesichert sein, so können mehrfache Probepunktionen dennoch fehlschlagen, was nach Clairmont geradezu charakteristisch ist. Sie sind oft recht schwierig und sollten nur von fachkundiger Hand in der Axilla ausgeführt werden. Zur Erhärtung der Diagnose ist hier unerlässlich die Röntgendurchleuchtung in verschiedenen Durchmessern. Es findet sich bei ihr ein keilförmiger oder bandförmiger „schwebender Schatten“ (Clairmont), der oben und unten von normalen Lungengewebe umgeben ist und in seiner Lage dem Sitz der Interlobärspalte entspricht.

Die Bedingungen für die Selbstheilung sind bei dem interlobären Empyem besonders ungünstig, und die Prognose wegen der Durchbruchgefahr in die Lunge verhängnisvoll. Daher sollte der Patient rechtzeitig, auch wenn noch keine stürmischen Erscheinungen vorliegen, der chirurgischen Behandlung zugeführt werden.

Eine andere Art des abgekackten Empyems ist das epidiaphragmale zwischen Pleura visceralis und diaphragmatica, dessen klinische Untersuchung über Sitz und Ausdehnung auch äußerst schwierig ist und ebenfalls nur durch wiederholte Röntgenuntersuchungen

zu sichern ist. Durch Zwerchfellnervenreizung rufen sie Singultus, Brechreiz, Oberbauchschmerzen hervor, und können zur Annahme eines Magengeschwürs und zu Fehleingriffen führen. Sie können in den Bauchraum durchbrechen oder übergehen. Rechts bildet sich dann ein subphrenischer Abszeß aus, der die Leber nach unten drückt und in sie eindringen kann, links kann sich die Eiterung in der freien Bauchhöhle ausbreiten und zu Peritonitis führen oder sie kapselt sich ab, wenn Magen oder Milz sich vorlegt.

Prognose.

Die Prognose ist nach Sauerbruch abhängig von der Grundkrankheit, von der Art und Schwere der Infektion (Pneumokokken, Streptokokken, Staphylokokken etc.), toxischen Einflüssen, von der Fähigkeit, das thorakale Gleichgewicht gegenüber den durch das Exsudat bedingten Verdrängungserscheinungen an den der Lunge benachbarten Organen zu halten, von dem Lebensalter, von der Zeit des Entstehens (synpneumonisch oder metapneumonisch), von den allgemeinen Einflüssen auf Kranke und Krankheit, von der Konstitution, der persönlichen Widerstandskraft und Allgemeinbefinden des Kranken und seiner Erbmasse, von der Abwehrfähigkeit seiner Brustfellhöhle und nicht zuletzt von der rechtzeitigen Diagnose, von der Art der chirurgischen Behandlung und Nachbehandlung.

Sind schon alle diese aufgeführten Faktoren mitbestimmend für die Prognose, so kann sich diese im Verlaufe der Krankheit noch weiterhin verschlechtern, wenn es zu plötzlicher Perforation eines Bronchus kommt und damit die Erstickungsgefahr droht, oder es zur Ausbildung eines Pneumothorax kommt; weiterhin besteht die Möglichkeit, daß der Eiter in die Herzhöhle oder in die Bauchhöhle durchbrechen kann. Sauerbruch führt an, daß Senkungsabszesse entstehen können, die am Musculus psoas zum Vorschein kommen. Ebenso können sich subphrenische Abszesse ausbilden. Auch können metastatische Eiterherde auftreten, wie eine Otitis media, Pyodermien, Pyelitis, Cystitis, Parotitis, Thrombophlebitis.

Das Bestehenbleiben und Fortschreiten der toxischen Einflüsse wie hohes Fieber, Schüttelfröste, Mitbeteiligung des Nervensystems, kleiner, fliegender Puls, hohe Atemfrequenz, ängstlicher Gesichtsausdruck, Cyanose, starkes Absinken der Gewichtskurve lassen das klinische Bild und die Prognose äußerst infaust erscheinen, wenn zudem noch das Exsudat rasch anwächst.

Das akute Empyema pleurae kann auch längere Zeit bis weit ein halbes Jahr fortbestehen und damit chronisch werden. Als chronisch wird nach Hedblom ein Empyem angesehen, wenn es keine weitere Heilungsneigung zeigt, oder wenn es über eine bestimmte Zeit hinaus, meist drei Monate, bestanden hat. Verursacht wird dieses Chronischwerden nach Hedblom durch eine ungenügende Behandlung; so sah er das Empyem chronisch werden in 50% von 310 Fällen bei ungenügender Drainage.

Bessesen ist auf die Ursachen des Chronischwerdens näher eingegangen. Als Grund hierfür sieht er an das Vorhandensein abgekapselter Eitertaschen, bronchopleuraler Fisteln, die einen Pneumothorax verursachen, weiter einen Lungenabszeß und schließlich Mischinfektionen, die besonders zum Chronischwerden neigen und auch die Wiederausdehnung der Lunge hemmen.

Bessesen weist hierbei auf den Nachteil der offenen Empyembehandlung hin, daß sie frühzeitig eine Mischinfektion setzen kann.

Die Häufigkeit des chronischen Empyems variiert nach Bessesen von Jahr zu Jahr unter dem Einfluß der allgemeinen Wirtschaftslage und ihrer Rückwirkungen auf den allgemeinen Gesundheitszustand und die allgemeinen hygienischen Verhältnisse; desgleichen variiert sie auch mit der Art des Erregers.

Behandlung des Pleuraempyems.

Mögen auch die Behandlungsmethoden und die technischen Wege für das Entleeren des Brustfelleiters recht zahlreich sein und von den verschiedenen Autoren die eine oder die andere angewandte Behandlungsmethode recht gute Erfolge gebracht haben, so gilt es, wie Silber und Paschla-Lehmann hervorheben, im Säuglings- und Kleinkindesalter vor allem noch immer

die richtige und zweckmäßige Empyembehandlung zu finden, da die Empyeme im Säuglings- und frühen Kindesalter eine Sonderstellung in der Behandlung einnehmen und verlangen. Dafür sprechen die von Spence mitgeteilten Erfahrungen an dem großen, 204 Fälle umfassenden Material des New Yorker Babies-Hospital: Die besten Erfolge gab hier die Heberdrainage mit 39,4% Mortalität, während die selten ausgeführte Rippenresektion 44,4%, die einfache Inzision und Drainage 51,7% und die Aspiration 66,6% Sterblichkeit zeigte. Günstiger sind die Resultate der Thorakotomie, über welche Ladd, Cutler berichten: Unter 154 mit Rippenresektion behandelten Kindern starben von den unter zwei Jahren alten 29%, von den übrigen 15%.

Stets ist ein Hauptgrundsatz des Hippokrates (460—377 v. Chr.) zu beachten, möglichst den ganzen Menschen zu behandeln.

Schon im Schrifttum des Altertums wird von der Behandlung des Empyems durch Brustwandchnitt gesprochen, dessen Kenntnisse aber dann wieder verloren gegangen sind. Hippokrates konnte es bereits ziemlich sicher diagnostizieren und hat es mit Punktion und allmählicher Entleerung behandelt (Landois). Galen folgte ihm darin. Aber von da an wagte es jahrhundertlang niemand mehr, ihren Rat zu befolgen bis zu Arcolano im 15. Jahrhundert, der dies Verfahren wieder empfahl; ebenso Paré. Doch galt diese Operation immer noch als so gefährlich, daß Dupuytren sich weigerte, den Eingriff an sich vollziehen zu lassen. Mit Einführung der Antisepsis trat die Eröffnung durch Schnitt wieder mehr in den Vordergrund. Franz König führte 1878 die breite Eröffnung der erkrankten Pleurahöhle durch Resektion mehrerer Rippen ein. Noch heute konkurriert diese Methode mit dem Verfahren, welches die Absaugung des Exsudates zum Ziele hat (Playfair 1873; Bülow 1876; Perthes 1898). In den 70er Jahren und später sind die Methoden der Thorakoplastik zur Beseitigung der Empyemresthöhlen ausgearbeitet worden (Schneider 1878; Langenbuch 1881, Roser, Simon, Schede, Küster, Eftlander).

Erst die Erfahrungen der Grippeepidemie, besonders der von 1918/19, in welcher die Mortalität der durch Rippenresektion behandelten Empyeme auf 90% stieg (Sauerbruch), schuf hier Wandel. Man gab wieder mehr der geschlossenen Drainage den Vorzug und kam dabei zu der Erkenntnis, daß hier nicht die Grundkrankheit den Tod herbeigeführt hatte, sondern die plötzlich schnelle Entleerung des Eiters, der die kompensatorischen Kräfte des Brustkorbes nicht mehr gewachsen waren. Besonders bei rechtsseitigen Empyemen konnte die Blutverteilung sich nicht so rasch ausgleichen. Behandlungsmethoden, die eine offene Verbindung zwischen Empyem und Außenluft schaffen, führen zum offenen Pneumothorax und damit zur akuten Mittelfellverschiebung (Rütz). Auf der linken Seite setzt die starke Muskulatur des linken Herzens dem Exsudatdruck starken Widerstand entgegen. Die unmittelbare Herzbelastung steht hier nicht so stark im Vordergrund, bei großen Empyemen kann aber die breite Angriffsfläche, die das beweglich aufgehängte Herz darstellt, die Möglichkeit einer Torsion des Organs und der großen Gefäße bieten.

Die Behandlung der Empyeme muß auf diese pathologisch-physiologischen Auswirkungen Rücksicht nehmen. Das Empyem ist nicht wie ein Abzeß breit zu eröffnen und ein schablonenhaftes therapeutisches Vorgehen ist unmöglich. Rütz fordert daher Beseitigung der pathologischen intrathorakalen Spannung ohne Gefahr für Herz und Lungen, Beseitigung des Eiters, Wiederentfaltung der Lunge mit Rückkehr zu physiologischen Zuständen. Die Wahrung der Geschlossenheit der Brusthöhle ist vor allem bei dem zarten, nachgiebigen kindlichen Mediastinum möglichst anzustreben und lange zu wahren, da die offene Thorakotomie bei Empyemen, besonders der Kinder, eine hohe Mortalität hat. Diese Forderung betont u. a. auch Nissen sehr eindeutig. Hedblom und Binnely weisen bezüglich dieser Frage auf die von Graham und Bell gewonnenen Erkenntnisse während des Weltkrieges hin, daß unter normalen Bedingungen das menschliche Mediastinum so beweglich ist, daß vom Standpunkt des intrapleurale Drucks aus die beiden Pleurahöhlen wie eine einzige funktionieren. Die Vermeidung eines offenen Pneumothorax bei einem frischen, akuten Em-

pyem ist die sinngemäße Schlußfolgerung. Das Mediastinum ist nicht fest genug, die Einwirkung des atmosphärischen Druckes von der offen drainierten Pleurahöhle her auf die gesunde Seite zu verhindern. Die Vitalkapazität wird dadurch weiter beträchtlich erniedrigt. Diese ist überdies ein guter Maßstab, ob man beim akuten Empyem primär oder geschlossen drainieren soll. Nur bei septischer Pleuraphlegmone oder beim metastatischen, jauchigen Empyem, wo die allgemeine Körpervergiftung im Vordergrund steht, treten die Rücksichten gegenüber Herz und Lunge zurück und Rütz hält hier die Behandlung durch Rippenresektion bei Anwendung des Druckdifferenzialverfahrens für berechtigt. Beim metapneumonischen Empyem, wo die Gefahr der Mediastinalverschiebung vorherrscht, ist zunächst die Punktionsbehandlung vorzuziehen.

Das Mediastinalflattern, d. h. Pendeln des Herzens, konnte durch die Versuche von Th. Naegeli eindeutig nachgewiesen werden und im röntgenkinematographischen Film festgehalten werden, wobei die Strömungsverhältnisse in den großen Gefäßen durch Einspritzung von Abrodil dargestellt, die Druckveränderungen im Thorax (Mediastinalflattern, doppelseitiger Pneumothorax etc.) durch Einblasen von Luft, schließlich die Versteifung des Mediastinums durch Injektion einer 5%igen Gummilösung herbeigeführt wurden.

Lilienthal fand bei den Untersuchungen über das verschiedene Verhalten des Mediastinums beim offenen und geschlossenen Pneumothorax, daß beim offenen Pneumothorax es beim Einatmen zu einem Aufblasen der kollabierten Lunge und Verdrängung des Mediastinums gegen die offene Seite kommt. Beim geschlossenen Pneumothorax kommt es dagegen zu einer Kompression der kollabierten Lunge und Verdrängung des Mediastinums nach der gefunden Seite, die ebenfalls komprimiert ist. Verstärkte Expiration bewirkt beim geschlossenen Pneumothorax eine Drehung des Herzens und seiner Anhangsgebilde.

Dazu führt Landois weiter an, daß der Kollaps bei plötzlicher Eröffnung des Thorax, der seit 1912 eingehend von Zelas, Brauer und Petersen studiert worden ist, auch teilweise auf

arterielle Luftembolien, vielleicht sogar auf die Einwirkung sensibler Reize auf die Pleura (Pleurareflexe) zurückzuführen ist.

Doch lassen sich heute in der modernen Lungen- und Thoraxchirurgie die Gefahren der Pneumothoraxfolgen verhüten und beseitigen durch die Wiederherstellung der Druckdifferenz zwischen Bronchialbaum und Lungenoberfläche bei Anwendung des Unterdruck- (Sauerbruch 1904) bzw. Überdruckverfahrens (Brauer 1904).

Nach Sauerbruch hat die Therapie des Empyems drei Aufgaben zu erfüllen:

1. Die Entfernung des Eiters.
2. Die Beseitigung der krankhaften thorakalen Spannung.
3. Die Wiederentfaltung der Lunge.

Die Aufgabe des Arztes ist es zu entscheiden, ob die Eiterentleerung oder die Beseitigung der krankhaften Spannung das Wichtigere ist. Schwieriger kann die Entscheidung werden bei schwerer Allgemeininfektion und gleichzeitiger physikalischer Wirkung der Eiteransammlung. Die verschiedenen Symptome sind zu berücksichtigen und die Kräfte des Patienten richtig einzuschätzen. Mitunter wird die schnelle Entleerung des Eiters die Hauptaufgabe sein. Wenn das Anhalten des Fiebers das immer wieder neue Anwachsen des Eiters zeigt, dann gibt Sauerbruch der geschlossenen Punktions-Drainagebehandlung nach Ifelin den Vorzug. Führt aber diese nicht zum Ziel, so muß doch die Rippenresektion ausgeführt werden.

Im allgemeinen sollte aber das Empyem nicht länger mehr als Abzeß angesehen werden, wie Young fordert, und als solcher behandelt werden, der eröffnet werden muß, sobald er erkannt ist. Vielmehr sind Ursache, anatomische Lage und Größe immer erst genau zu erforschen, ehe der Behandlungsplan aufgestellt wird. Zu früh und zu spät erfolgende operative Behandlung kann in gleicher Weise verhängnisvoll werden. Es gilt dies besonders für das Streptokokkenempyem, bei dem sich Verklebungen langsam bilden, sich aber sehr schnell organisieren und infolgedessen dazu neigen, die Lunge an der Wiederausdehnung zu verhindern.

Die wichtigste Erkenntnis der Lehren des Weltkrieges in der Behandlungsart nach dem Bericht der Empyemkommission der amerikanischen Armee (Graham und Bell) ist nach Larson, daß beim Streptokokkenempyem mit seinem dünnen Eiter und der fehlenden Abkapslung in Rücksicht auf die fast immer dabei vorhandene Bronchopneumonie frühzeitiges Operieren zu vermeiden ist, wobei der Fröhrtod weniger auf Toxinresorption als auf den Kollaps von lufthaltigem Lungengewebe zurückzuführen ist (Larson).

Wichtig ist für die Empyembehandlung, den günstigen und richtigen Zeitpunkt für die Rippenresektion zu wählen, wenn eine Punktionsbehandlung bei toxischen und hochfiebernden Zuständen zu aktiverem Vorgehen mahnt. Rütz gibt einen Zeitpunkt von 2—3 Wochen seit dem Auftreten des Ergusses an, da dann bereits eine Mediafinalstarre, — nach Binney bedingt durch entzündliche Verdickung —, eingetreten ist, die die offene Thorakotomie mit Rippenresektion zuläßt und sogar der zwar schonenderen geschlossenen Drainage vorzuziehen ist, da letztere zwei Nachteile mit sich bringt: Stockung des Eiterabflusses durch Eindicken, Fibrinbildung (besonders Staphylokokkenempyem) und die Gefahr einer phlegmonösen Entzündung der Brustwand in der Schlauchumgebung.

Klages führt an, erst am 8.—10. Tag seit der ersten Punktion die Rippenresektion auszuführen, bis sich der Eiter eingedickt hat.

Bei Packard jr. galt als Indikation für Rippenresektion das Dickwerden und stark Fibrinhaltigwerden des Eiters nach Überwindung der Pneumonie. Die durchschnittliche Dauer zwischen Auftreten und Empyemoperation betrug in den mitgeteilten Fällen (10 Rippenresektionen) dreieinhalb Wochen. Die tödlich verlaufenden Fälle waren fünf Tage nach dem Auftreten der Pneumonie operiert. Bei Beobachtung des angegebenen Zeitpunktes der Operation war nur ein Todesfall zu verzeichnen. Dieser Zeitpunkt erwies sich auch als günstig bei den durch geschlossene Drainage behandelten 50 Fällen, wobei nur ein Todesfall eintrat.

Bauer gibt ebenfalls den günstigsten Zeitpunkt für die Rippenrefektion um die 3. bis 4. Woche herum an nach Beginn der urfächlichen Erkrankung. Stets sind größere Kreislaufstörungen und pneumonische Prozesse vorzubehandeln. Weiterhin hat Bauer beobachten können, daß nach der 5. Woche die Sterblichkeit wieder leicht anzusteigen beginnt. Die Abnahme der hohen Sterblichkeit nach den ersten Tagen erklärt er aus der Abnahme der Virulenz der Erreger, der Besserung der Abwehrkräfte des Körpers und der Zirkulations- und Atmungsverhältnisse.

Graham, Everts, Berck verlangen mindestens fünf Wochen bis zur Eröffnung der Pleurahöhle durch Rippenrefektion abzuwarten, bis sich die **formative Periode** des Empyems ausgebildet hat.

Auch Brown hält erst den Augenblick für die Operation (breite Eröffnung der Pleura durch Rippenrefektion) gekommen, wenn der Eiter dick wird, mit Fibrinfäden durchsetzt ist, wenn die Wände des Empyems sich durch Fibrinauflagerungen verdickt haben, damit das Mediastinum genügend Halt findet. Bis dahin ist zur Therapie bei stärkerer Dyspnoe nur die Punktion anzuwenden. Bei Auftreten von Kurzatmigkeit als Charakteristikum fordert Brock gegebenenfalls zweimal die Punktion, um schnelles Ansteigen des Empyems zu verhindern.

Interessant ist der von Young angeführte Hinweis auf die Darstellung dieser Frage bei Hippokrates im Hinblick auf die heutige Einstellung zur Behandlung des akuten Pleuraempyems, die er in der Übersetzung wiedergibt: „Vor dem 15. Tage, gerechnet von dem Beginn der Erkrankung an, soll nicht operiert werden. Vom 10. Tag nach der Operation an, muß die Höhle mit warmem Wein und Öl gespült werden, um die Lungenoberfläche zu reinigen; diese Spülungen müssen zweimal gemacht werden“.

Von wichtiger Bedeutung ist aber vor allem für die Wahl des richtigen Zeitpunktes für den Beginn der Behandlung, sei es die der einfachen Thorakotomie durch interkostale Inzision oder durch geschlossene Drainage oder die breite Thorakotomie durch Rippenrefektion, daß abgewartet werden muß, bis die Pneumonie abgeklungen ist, bis sich Pleuraadhäsionen gebildet haben, um einen

Kollaps der Lunge zu verhindern, und bis das Mediaſtinum zur Ruhe gekommen iſt (durch entzündliche Verdickungen). Dieſe prinzipielle Forderung erhebt R o h r e r bei der Behandlung des kindlichen Empyems. L a n d o i s hält jeden chirurgiſchen Eingriff bei dieſem für falſch, ſolange noch ein pneumoniſcher Herd vorhanden iſt; denn der Tod iſt dann immer die Folge des Eingriffes. Auch P a c k a r d, S t a j i é, B e t t m a n n, K ü t t n e r (R i t ſ c h e l), M c E a c h e r n u. a. warnen vor jedem frühzeitigen chirurgiſchen Eingriff bei Kindern, ſolange nicht bei gleichzeitig beſtehender Pneumonie dieſe abgeklungen iſt.

B e t t m a n n erwähnt nebenbei, daß der ſicherſte Wegweiſer meiſt das Verhalten der Temperatur iſt. Der Temperaturverlauf bei der Pneumonie iſt unregelmäßig, gewöhnlich erhöht, ohne normale Werte zu erreichen. Das Empyem pflegt durch eine ausgeſprochene ſeptiſche Fieberkurve charakteriſiert zu ſein. Ihr Manifeſtwerden, gegebenenfalls nach einer Art freien Intervalls, zeigt an, daß das Empyem nunmehr im Vordergrund des Krankheitsbildes ſteht.

Neben dieſen allgemeinen Behandlungsgrundsätzen ſind ſtets die Regelung der Herztätigkeit, Schutz vor Abkühlung, Stillung des Durſtes, Hebung des Organismus, evtl. durch intravenöſe Traubenzuckerinfuſionen, zu beachten, welche Forderungen E r d e l y im beſonderen erhebt. N o e g g e r a t h empfiehlt dazu neben der geeigneten Ernährung einſchließlich Waſſerverſorgung noch die Freiluſtanwendung.

K o o s hebt hervor, daß eine mächtige Waffe gegen die ſeptiſchen Erſcheinungen die Bluttransfuſion iſt. Sie iſt wohl dann ſicher indiziert, wenn eine ſtarke Anämie eingetreten iſt, ein Ereignis, das nach B ö h m nicht ſelten beobachtet wird; bei Streptokokken ſank in ſeinen Fällen der Haemoglobingehalt bis auf 50%, bei Pyämie bis auf 10 %. Bei Pneumokokkenempyem war die Wirkung nicht ſo ſtark.

Um eine Überſicht über die verſchiedenen Behandlungswege für das Entleeren des Bruſtfelleiters zu gewinnen, führe ich eine kurze Aufſtellung nach S a u e r b r u c h - S c h m i d t an, ehe ich ſie und ihre Erfolge und Nachteile im einzelnen beſchreibe.

A. Durch die Haut hindurch oder nach Spaltung der Haut im Zwischenrippenraum Einstich mit Hohnadel oder Troikart in die Brusthöhle (Bruststich, Thorakozentefe).

1. Einmalige oder wiederholte Punktion, offen oder geschlossen, ohne oder mit Ansaugung (Heberwirkung P o t a i n) während des Eingriffes.
2. Punktion, offen oder geschlossen, mit anschließender Dauerableitung, meist durch ein Rohr, ohne oder mit Ansaugung (Heberwirkung B ü l a u).

B. Brustwandschnitt (Thorakotomie).

I. Im Rippenzwischenraum (Interkostalschnitt und einfache Pleurotomie).

II. Mit Eingehen durch das Knochengefüge.

1. Mit Rippentrepanation und Pleurotomie: perkostale Daueranlegung eines an eine tragbare Saugflasche angeschlossenen Drains.
2. Mit Rippenresektion und Pleurotomie, offen oder geschlossen (I f e l i n) mit Dauerableitung.
 - a) ohne Ansaugung.
 - b) mit Ansaugung
 - aa) durch Mulltamponade
 - bb) durch äußere Saugkraft (P e r t h e s, I f e l i n)
 - cc) unter Druck von innen her, mit Lungenblähung durch Druckdifferenz.

C. Verbindung von entlastender Punktion und eine Zeit darauf folgende Thorakotomie (Rippenresektion, Pleurotomie und Lungenblähung, J e h n).

D. Thorakotomie, Entfernung ganzer Brustwandstücke.

Als weitere Behandlungsmethoden sind noch zu erwähnen: die Punktion des Empyems und Füllung oder Spülung der Höhle mit antiseptischen Flüssigkeiten zur Sterilisation des Eiters.

Punktionsbehandlung.

Nach K ü t t n e r ist die Methode der Wahl die **Punktionsbehandlung** — die Eiterentleerung ohne Eröffnung der Brusthöhle —, womit jede Behandlung beim kindlichen Pleuraempyem beginnen sollte. Diese konservative Therapie halten S a u e r b r u c h, M c E n e r y, F r e n k l, S t a m m, F l e i s c h, L o c k w o o d, A c u n a, K l a g e s, A r o n und D e m e l für das kindliche Empyem besonders unter 2 Jahren am Platze, wobei aber von Fall zu Fall zu entscheiden ist, ob man damit auskommen kann oder ob eine chirurgische Operation zu erfolgen hat.

Die Punktion schafft nach K l a g e s die erste oft lebensrettende Entlastung und läßt Zeit gewinnen für spätere notwendige operative Eingriffe. Als Indikation für die präliminare Aspirationsbehandlung betrachtet B i n n e y eine noch vorhandene Pneumonie unter dem Empyem, Cyanose oder Dyspnoe infolge der Pneumonie oder großer Flüssigkeitsansammlung als Ursache einer beträchtlichen Erniedrigung der Vitalkapazität, sowie unverhältnismäßig rascher Puls aus irgendwelchem Grunde.

E d e r e r, S c h w a r z, R ü t z, S i l b e r, Z i s c h i n s k y, L e w k o w i c z, N i s s e n, C o q u e l e t warnen vor Rippenrefektion im Säuglingsalter wegen ihrer hohen Mortalitätsziffer und lassen sie nur als ultimum refugium gelten. N o e g g e r a t h lehnt sie überhaupt für Kinder ganz ab; ebenso H a t h a w a y.

R a t n e r hält nur bei schweren putriden Infektionen, wo vielleicht der Einfluß der Luft auf die Anaerobier einen gewissen Wert hat, die offene Behandlung für zulässig.

Nach P a s c h l a u und L e h m a n n's Erfahrungen beim Pleuraempyem gibt es für das Empyem der Kinder im allgemeinen und für die einzelnen Altersstufen im besonderen keine schematisch zu befolgende Behandlungsweise.

Vor jeder Punktionsbehandlung empfiehlt Y o u n g eine wirklich vollständige Lokalanästhesie bis hinunter auf die Pleura, nicht nur um Schmerz zu vermeiden, sondern auch in Rücksicht auf die, wenn auch seltene, so doch immerhin zu berücksichtigende Gefahr des Pleurashocks. C o c k e hat diesen nur dreimal unter

4—5000maligem Eingehen in die Pleurahöhle, meist Pneumothoraxfüllungen, beobachten können.

Zur Technik der Punktion erwähnt K ü t t n e r, daß die Wahl der Punktionsstellen von der Lage des Exsudates abhängig ist. Dann punktiert er mitten in die Dämpfung hinein. Hat man die Wahl, so nimmt man den 7. oder 8. Interkostalraum in der mittleren oder hinteren Axillarlinie und vermeidet den unteren Rippenrand. In jedem Falle empfiehlt K ü t t n e r, mindestens 3 Querfinger breit oberhalb des Brustkorbrandes zu punktieren, um das Zwerchfell sicher zu vermeiden. Dabei sitzt der Patient auf dem Rande des Operationstisches oder Bettes und wird gestützt. Dann anästhesiert man mittels Chloräthylsprays oder Schleich'scher Infiltration, macht eine kleine Stichinzision und stößt das senkrecht aufgesetzte Instrument am oberen Rippenrand ein.

K ü t t n e r hebt hervor, daß am einfachsten ist, die Benützung eines gewöhnlichen mittelstarken Troikarts, an dem ein Gummischlauch befestigt ist. Der Schlauch, der zusammen mit dem Troikart ausgekocht ist, taucht in ein zu ebener Erde stehendes steriles und mit steriler Kochsalzlösung gefülltes Gefäß, das, falls es nicht steril ist, dann mit einer schwach antiseptischen Flüssigkeit beschickt werden muß. Der Schlauch erfüllt nach K ü t t n e r einen doppelten Zweck: Er verhindert das Eintreten von Luft in die Pleurahöhle und übt durch den Zug der Flüssigkeitssäule eine leichte, unschädliche Heberwirkung aus.

Zur Verhinderung des Lufteintritts in den Pleuraraum während der Punktion sind mancherlei Vorschläge gemacht worden. R e h n erwähnt, daß schon R o s e r sich eines dünnen Troikarts bediente, über dessen Ausflußöffnung ein Condom gebunden war, der die Entleerung der Flüssigkeit gestattete, jedoch das Eindringen von Luft verhinderte (K ü t t n e r).

Wichtig ist, daß die Entleerung des Exsudates wegen Kollapsgefahr langsam erfolgen soll, damit die Organe des Thorax Zeit haben, sich an die veränderten Druckverhältnisse anzupassen. Um solchen unangenehmen Zuständen vorzubeugen, ist es ratsam, vor der Thorakozentese Herzanregungsmittel zu geben. Sehr große Exsudate sollen möglichst in mehreren Sitzungen entleert werden.

Über 1 bis 1½ Liter soll man im allgemeinen bei einer Entnahme nicht hinausgehen.

Ein Warnungszeichen, sofort die Punktion zu unterbrechen, ist, daß nach der Thorakozentese zuweilen eine seroalbuminöse Expektoration beobachtet wird. Küttner beschreibt dieses Bild sehr eingehend: Während oder nach beendeter Pleurapunktion tritt heftiger Hustenreiz auf, an den sich eine mehr oder minder reichliche Expektoration einer schaumig serösen, mitunter blutig tingierten Flüssigkeit anschließt. Diese Erscheinung kann stundenlang anhalten; es können sogar bis zu 2 Liter einer stark eiweißhaltigen Flüssigkeit entleert werden. Nicht allzu selten tritt der Tod ein. Von 44 Fällen, die Korach (nach Küttner) zusammenstellte, starben nicht weniger als 12 unter asphyktischen Erscheinungen. Diese seroalbuminöse Expektoration wird von Korach, Waldvogel und Gerhardt als Folge intensiver Hustenanstrengung angesehen. Korach betrachtet deshalb den Husten als erstes Zeichen einer stark aktiven Hyperämie der plötzlich dem Luft- und Blutzuflusse wiedereröffneten Lungenpartien.

Zu erwähnen wäre noch die früher viel geübte Entnahme des Exsudates meist durch Saugapparate, wie in der Form des Dieulafoy- und Potain'schen Aspirators. Auf die Nachteile dieser Saugwirkung geht Küttner näher ein, die sich vor allem bei älteren Exsudaten geltend machen und die durch Verwachsungen und Elastizitätsverlust der Lunge deren Ausdehnung hindern. Aus den in solchen Fällen vorhandenen Atelektasen können durch kräftiges Anfaugen Thromben mobilisiert werden, können seröse Exsudationen in die Alveolen, Blutungen in die Pleura erfolgen und sogar auch einmal Lungenrupturen. Küttner hält die Saugwirkung für entbehrlich, da meist die größeren Flüssigkeitsansammlungen stets unter positivem Druck stehen. Im Laufe der Entleerung eines Exsudates kann aber auch ein negativer Druck in der Pleurahöhle vorherrschen. Dann findet eine Aspiration in die Pleura statt. Es entsteht ein Pneumothorax, der doch möglichst vermieden werden soll.

Ungeachtet dieser Gefahr wurde eine Behandlungsmethode von Parker 1882 zuerst ausgeführt und vorgeschlagen, nach

Natab empfohlen, wo bei Ablassen pleuritischer Exsudate Luft in den Pleuraraum eingelassen wird, gemäß der abgelautenen Flüssigkeit. Hierdurch werden zwar Adhäsionen und Schrumpfung verhindert, bereits bestehende Verklebungen gelöst und die Wiederherstellung völliger Funktionstüchtigkeit der Lunge und Pleura nach der Rekonvaleszenz größer. Natab berichtet über 20 Heilerfolge. Das gleiche Verfahren wandten auch Bloch und Parrich mit Erfolg an, und berichten über 14 Fälle.

Das Eindringen von Luft in die Pleura bei dieser Methode soll im allgemeinen kaum Gefahren mit sich bringen, sodaß, wie Küttner hervorhebt, von Schmidt die offene Pleurapunktion empfohlen wird. Küttner und Korach u. a. raten aber dennoch hiervon stark ab.

Drainagebehandlung.

Um eine dauernde Entleerung des Exsudates im Anschluß an die Punktion zu erreichen, sind zahlreiche geschlossene Drainagemethoden ausgearbeitet worden.

Landois gibt hierzu einen kurzen geschichtlichen Rückblick: Wie von Iselin festgestellt worden ist, haben Potain 1869 und Revilliod das Saugverfahren in die Empyembehandlung eingeführt. Unabhängig von ihnen hat Playfair 1871 seine Unterwasserdrainage und Bülow 1867 seine Heberdrainage angegeben, die in Deutschland sehr bekannt geworden ist.

Für die Wahl des Ortes der Drainage gibt Bettmann an, sie am tiefsten Punkt anzulegen. Nach seinen Erfahrungen hat sich am meisten der 8. und 9. Zwischenrippenraum im Gebiet zwischen hinterer und mittlerer Axillarlinie bewährt. Bei zu weit nach hinten angelegter Drainage kann leicht eine Abflußbehinderung eintreten, daß der Kranke durch sein Gewicht den Drainageschlauch zudrückt. Auch ist es zweckmäßig, sie nicht zu tief anzulegen mit Rücksicht darauf, daß das Zwerchfell im Gefolge der entzündlichen Veränderungen seiner Pleurabedeckung teilweise gelähmt zu sein pflegt und infolgedessen nach Anlage der Drainage mehr oder weniger hochtritt, wodurch dann leicht das Drain verstopft wird.

Eine ausschlaggebende Bedeutung für das Behandlungsergeb-

nis und besonders für die Erhaltung des Lebens in bedrohlichen Fällen ist die richtige Wahl des Zeitpunktes für die Anlegung der Drainage, worauf im besonderen McEachern hinweist. Die Drainage soll erst angelegt werden, wenn die Lösung des Lungenprozesses erfolgt ist, wenn sich genügend zuverlässige Verwachsungen zwischen Lunge und Brustwand gebildet haben, um einen Kollaps der Lunge zu verhindern. McEachern gibt hierzu folgende Regel an: Handelt es sich um einen dicken Pneumokokkener, so soll die Drainage nicht angelegt werden, bevor diese Eiterung nicht wenigstens eine Woche bestanden hat. Sind Streptokokken die Infektionserreger, so soll mindestens 10 Tage mit der Drainage gewartet werden von dem Zeitpunkt an, von dem dicker Eiter festgestellt worden ist. Bis zur Anlegung der Drainage müssen entlastende Punktionen ausgeführt werden, wobei ein Eintritt von Luft in die Pleurahöhle vermieden werden muß.

Als Zeitpunkt für die Entfernung der Drainage betrachtet McEachern, wenn die Kapazität der Resthöhle nicht mehr über 15 ccm steigt und wenn die zurückkommende Flüssigkeit 5 Tage frei von makroskopischen Beimengungen ist. Hedblom erwähnt, daß Alexander verlangt, die luftdicht schließende Drainage nicht vor völliger Obliteration der Höhle zu entfernen.

Die Dauer der Drainage, wofür Bettmann als entscheidendes Kriterium der Ausheilung die festgestellte Obliteration der Pleurahöhle angibt, belief sich im Durchschnitt nach seinen Beobachtungen auf 6 Wochen. Klages gibt als Dauer der Drachter'schen Stachelheber-Drainage durchschnittlich 29 Tage, bei metapneumonischen Empyemen 21—24 Tage an, während McEachern bei seiner mit allen Vorichtsmaßnahmen durchgeführten Bülaü'schen Drainage eine durchschnittliche Behandlungszeit von 21,8 Tagen hatte. In einem anderen Bericht gibt er die Durchschnittsdauer der Drainage mit 25,6 Tagen an.

Da bei der Bülaü'schen Drainage leicht die Möglichkeit besteht, daß das Drain oder auch die lange Gummischlauchleitung durch Gerinnsel, Fibrinflocken, klumpige Eitermassen verstopft oder abgeknickt wird, daß eine Verengerung der Interkostalräume durch Thoraxschrumpfung und das allmählich emporsteigende

Zwerchfell hinzukommt, hat man versucht, auf verschiedene Weise diesen Mißständen abzuhelpfen. So führt nach K ü t t n e r F o r s c h - b a c h nach Einstoßen in den Pleuraraum mit einem lanzettförmigen Messer ein dickes Drain von bis zu 1 cm Durchmesser ein, oder R i e d e l und L a n g e m a k starre Metallkanülen. Statt des Hebers von B ü l a u bedienen sich H a h n und M a f f i n i der Wasserstrahlpumpe. I s e l i n wendet das alte R e v i l l i o d ' s c h e Verfahren der Anfaugung durch einen Kautschukballon an.

Neben diesen Nachteilen der B ü l a u ' s c h e n Drainage ist immer die Gefahr der Entwicklung einer fortschreitenden Thoraxwandphlegmone gegeben, worauf K ü t t n e r, L a n d o i s, Y o u n g, K l a g e s hinweisen. Auch kann es zur Mischinfektion des Eiters bei langem Bestehen kommen, zu Gefäßarrosionen, nach K l a g e s zur Ausbildung von Neuralgien.

An Stelle eines einfachen Gummidrains hat D r a c h t e r eine Stachelheberdrainage modifiziert, die sich nach H a a s an der Münchener Universitäts-Kinderklinik gut bewährt hat. Sie besteht darin, daß eine metallene, mit Kugelventil versehene Troikarthülse in den Thorax eingeführt und durch seitliche Flügel an ihm befestigt wird. An den Troikart wird der Heberschlauch luftdicht angeschlossen. Neben K l a g e s setzt sich auch A r o n für das Drachter'sche Verfahren ein, da es die Forderungen einer wirklich geschlossenen Thorakotomie weitgehend erfüllt.

Zur Vermeidung des offenen Pneumothorax mit der Gefahr einer plötzlichen Verlagerung der Organe des Mediastinums während der Operation schlägt R a t n e r statt der geschlossenen aktiven Aspirationsmethode nach P e r t h e s - H a r t e r t - I s e l i n, wobei sich nach der Einführung der Drainageröhren die Wunde oft unter dem Druck der Flüssigkeit erweitert und so dennoch zur Entstehung eines Pneumothorax führen kann, die Trepanation einer Rippe vor. Durch die in der Rippe angelegte Trepanationsöffnung wird die Pleurahöhle eröffnet und dann 1 cm tief ein Drainagerohr eingeführt. Da die Ränder der Trepanationsöffnung das Drainagerohr fest umschließen, wird ein Auseinandertreiben der Ränder, ein Eintreten des Eiters in die Wunde und die Möglichkeit eines Pneumothorax vermieden. R a t n e r hat diese Me-

thode mit Erfolg durchgeführt. Bei doppelseitigen Empyemen sieht Ratner sie als die Methode der Wahl an. Auch Sedillot und von Langenbeck führten, wie Landois erwähnt, schon früher eine Trepanation der Rippe aus, und legten durch diese Öffnung ein Drain in die Pleurahöhle ein.

Um die Abknickung des Drains durch die Rippen zu vermeiden, damit die Druckverminderung im Brustkorb keine plötzliche ist, hat Evler die subkutane Dauerdrainage durch einen Knochenkanal in der Rippe empfohlen, die Küttner mehrfach mit Erfolg, besonders bei hartnäckigen, stets von neuem auftretendem Pleuraexsudat angewandt hat.

Zur Schaffung günstiger Abflußbedingungen des Eiters bei der Nachbehandlung, ihn dünnflüssig zu halten, empfiehlt Landois 150—200 ccm einer Pepsin-Salzsäurelösung in die Pleurahöhle durch den Schlauch einzuspritzen und ihn dann auf mehrere Stunden abzuklemmen. Durch die Pepsin-Salzsäurelösung, die nach Landois' Angaben eine Zusammensetzung von

Pepsin	20,0
Acid. muriat.	
Acid. carbolic.	aa 2,0
Aqua dest.	ad 400,0

hat, werden die Fibrinflocken verdaut. Spülungen mit Pepsin-Salzsäurelösung wendet auch Rütz bei Verstopfen des Drains durch Fibringerinnsel an.

Wegen der hohen Mortalität der Thorakotomie und Rippenresektion beim kindlichen Empyem, die Ederer im Säuglingsalter mit 75%, im Kleinkindesalter mit 30% angibt, ist das Verfahren der Wahl nach Ederer im Kindesalter nur die geschlossene Behandlung durch Punktionen und Spülungen mit neutralisierender Flüssigkeit (Optochin). Einer luftdichten Drainagebehandlung steht nach seiner Ansicht im Säuglings- und Kindesalter wegen der dünnen Brustwand zu große technische Schwierigkeiten entgegen. Die günstigen Ergebnisse der Punktionsbehandlung und Spülung führt Ederer auf die physikalische Wirkung der Ausspülungen, weniger auf die antiseptische Wirkung und auf die Geschlossenheit der Brusthöhle zurück. Ederer ging von den physi-

kalisch-chemischen Veränderungen bei der Entzündung aus, die durch die starke Säuerung der entzündeten Gewebe seit Schade bekannt sind. Das sauerste Entzündungsprodukt ist der Eiter von pH 5,8—7,2; Ederer fand, daß je akuter die Entzündung und je reifer der Eiter, die pH um so näher steht dem neutralen Punkt, daß die pH, je chronischer und dickflüssiger der Eiter ist, um so saurer wird. Die sauren Entzündungsprodukte wirken auch für sich entzündungsverstärkend. Diesen *circulus vitiosus* unterbricht Ederer durch Neutralisation, indem er eine alkalische Phosphatpufferlösung, eine isotonische Lösung des Gemisches aus primären und sekundären Natriumphosphat als Spülflüssigkeit anwendet, deren Pufferkapazität genügend groß ist, um die sauren Produkte während 24 Stunden zu binden und die entzündete Pleura in neutralem Milieu zu halten. Das pH-Bereich des Puffers soll je nach dem pH des Eiters zwischen 7,5—8,0 liegen. Sie darf nicht überschritten werden, besonders nicht im subakuten Stadium, da das Granulationsgewebe viel empfindlicher gegenüber pH-Verschiebungen ist als das akut entzündliche Pleuragewebe. Gleichzeitig löst auch die alkalische Flüssigkeit die autolytischen Produkte des Eiters. Um frühzeitige Verwachsungen der Pleurablätter und das Entstehen isolierter Eiterfäcke zu verhindern, empfiehlt Ederer, nach der Spülung von der Pufferlösung das halbe Volumen des ausgehobenen Eiters nachzufüllen. Erst wenn der Eiter dick ist, kann die Nachfüllung unterbleiben. Ederer hält das Verfahren der alkalischen Phosphatspülungen im Kindesalter für ausgezeichnet, da er eine beruhigende Wirkung auf die entzündete Pleura hat beobachten können, die sich in der Entfieberung äußerte, wo sie selbst nicht durch die breite Eröffnung erfolgte. Auch das verfallene Aussehen, der kachektische Gewichtsverlust, das schlechte Allgemeinbefinden, erfuhren einen Umchwung.

Tahashi fand durch seine Untersuchungen im frischen Eiter von 9 pneumokokkenempyemkranken Kindern, daß die pH durchschnittlich 6,3 beträgt. Sie schwankte zwischen pH 6,71 (minimal) und pH 5,71 (maximal). Die pH des Eiters steigt mit den Krankheitstagen bis zu einer gewissen Höhe auf, um dann all-

mählich bis zu einem kleineren Wert als den Beginnwert abzusinken. Im ganzen Verlauf steigt sie nie über pH 5,0 auf und unter pH 7,0 ab. Je stärker die Krankheitserrscheinungen oder je später der Krankheitstag fällt, desto größer ist die Wasserstoffionenkonzentration (pH) des Eiters. Sie erniedrigt sich nicht, solange die Krankheitserrscheinungen noch lebhaft sind und Fieber remittiert. Die pH des Eiters hängt immer mit seiner Autolyse zusammen. Im Eiter des Pneumokokkenempyems kommen ein autolytisches, peptisches, tryptisches, ereptisches, fett- und stärke-spaltendes Ferment vor.

Andere Autoren wie Ratichvili, Zischinsky, Lewkowicz, Boller empfehlen Spülungen von physiologischen NaCl-Lösungen, die sich als bestes Waschmittel neben 25—40%iger Zuckerlösung (nach Jaeger) bewährten, oder auch Lösungen, die gleichzeitig desinfizierend wirken. Tuffier wendet nach Entleerung des Eiters und der Eitermembranen zur Sterilisation der Empyemhöhle 7—8 silberdrahtarmierte Carrel'sche Röhren an, die er in alle Buchten der Höhle einlegt, zweistündlich mit Dakin'scher Lösung durchspielt. Nach 5—30 Tagen soll die Höhle praktisch keimfrei werden. Auch Moschkowitz und Villander betonen den Wert dieser Methode zur Nachbehandlung.

Sauerbruch-Schmidt und Küttner geben an, daß die Abführung von verschiedenen Seiten, namentlich Pädiatern, jedesmal mit desinfizierenden Auswaschungen verbunden wird, wozu Vuzin, Optochin-, Eukupin-, Rivanol-, Trypaflavinlösungen, Gentianaviolett-, Nitroakridinfarbstoffe (Friedemann), Formalin-glyzerin, Pregellösung oder Dakinmischung empfohlen werden, wovon letztere auch die Eiterschwarten angeblich lösen soll.

Nach Landois hat Bälz 1880 zuerst nach Punktion des Pleuraempyems die Höhle mit antiseptischen Lösungen ausgespült; Reyher und Rosenstein haben dieses Verfahren dann nach den Grundsätzen der modernen Antisepsis ausgearbeitet.

Sehr gute Erfolge in der Pneumokokkenpleuraempyembehandlung der Kinder hat die Anwendung des Optochins gebracht. Es wird im besonderen von Woringen empfohlen. Er hält sie für die Methode der Wahl in den ersten zwei Lebensjahren. Sie lieferte

eine Mortalität von 33%, während die übrigen Statistiken, die W o r i n g e r angeführt, zwischen 50 und 80% schwanken.

Zur konservativen Empyembehandlung mit Spülungen gibt P a s z k i e w i c z folgende therapeutische Winke an auf Grund von Erscheinungen, die im Exsudate bei der Heilung des Pleuraempyems im Anschluß an Immunkörperbildung des Organismus selbst oder unter Einwirkung von lokal angewandten bakteriziden chemischen Stoffen einhergehen und die er an einem Material von 44 Kindern mit Pleuraempyem untersuchte. Bei Staphylokokken und Pfeifferbazillen reicht täglich Exsudatentleerung aus. Bei Pneumokokkenempyem ist einige Zeit (4—5 Tage) täglich die Pleurahöhle mit Kochsalzlösung zu spülen. Ergeben dann Ausstrichpräparate weder Agglutination noch intensive Phagozytose, so beginnt P a s z k i e w i c z nach jeder Kochsalzspülung mit 5%iger Optochinlösung (1 ccm pro kg Körpergewicht ohne je 10 ccm zu überschreiten) in die Pleura einzuspritzen; Fortsetzung bis zur vollständigen Sterilisierung des Exsudates. Beim Streptococcus haemolyticus und Staphylococcus aureus ist von Anfang an 2‰ Rivanollösung anzuwenden; letztere ist für die putride Infektion zu empfehlen.

A c u n a hält vor jeder operativen Behandlung des kindlichen Pleuraempyems zuerst Spülungen mit 5%iger Optochinlösung für notwendig.

R e i n o l d berichtet ebenfalls über die seit 1921 an der Breslauer Kinderklinik ausgeführte Behandlung der Pneumokokkenempyeme beim Kinde in Punktion, Abaugung und Spülung mit 0,5%ig. Optochin Hydrochlor.-Lösung (100—200 ccm) und nachfolgender Injektion von 0,05 Optochin hydrochloric. pro kg Körpergewicht.

Doch empfiehlt K ü t t n e r, die Spülungen möglichst einzuschränken, weil sie, abgesehen von der Möglichkeit der Reflexauslösung, geeignet sind, zarte Verwachsungen zwischen Pleura parietalis und pulmonalis wieder zu lösen. Vor allem widerrät L a n d o i s die Spülung mit H_2O_2 , weil sie nicht nur von Venen oberflächlicher Lungeneinschmelzungsherde, sondern auch von verletzten und unverletzten Granulationsgefäßen der Pleuraschwarte aus zur

Luftembolie führen kann. Nur bei hochgradiger foetider Sekretion und bei starker Fibrinausscheidung läßt K ü t t n e r die Spülungen gelten, weil sie da oft nicht zu entbehren sind.

Auch S a u e r b r u c h - S c h m i d t lehnen die Spülungen ab, da sie zu Brustfellreflexstörungen oder Eintritt von Luft in berstende Äste der Lungenvene, von da in das linke Herz und in Herz- und andere Körperarterien (Embolie), zu Blutungen und Fiebersteigerungen Anlaß geben können. Auch solien sie fogar Schwartenbildungen befördern. Bei Vorhandensein von Lungenfisteln können sie sehr verderblich werden.

G r a h a m, E v a r t s, B e r c k halten die Spülungen des Empyems für belanglos und nebenfächlich.

Zur Pleuraempyembehandlung mit Optochin und Rivanol erwähnen D o s k o c i l und P r o c h á z k a den Nachteil dieser Behandlung, daß die Leukozyten mit Optochin zerstört, vom Rivanol in ihrer Funktion gehemmt werden, wodurch die Resorption des Exsudates erschwert und verlängert wird.

P r o c h á z k a berichtet über 55 kindliche Empyeme, die er nach Optochin behandelte. Die Mortalität betrug 34,5%. Nach Aspiration des Eiters spülte er die Pleurahöhle mit 0,5%iger Optochinlösung und beließ danach 10 ccm einer 5%igen Optochinlösung in der Pleurahöhle. Die Heilerfolge führt er auf die rein mechanische, gründliche Entfernung allen Eiters zurück, da die desinfizierende Kraft der Optochinlösung nicht groß ist. Diese Behandlung empfiehlt er hauptsächlich bei Kindern bis zu vier Jahren.

Einige Autoren haben eine lokale Immunisation durch Spülungen mit Autoantivirus (filtrierte Mikrobekulturen nach dem Prinzip von B e s r e d k a) erreicht (D a r d e l u. a.).

Andere Autoren haben auf dem Wege der Autopyotherapie das Pleuraempyem im Kindesalter erfolgreich behandelt.

M a k a i hat die subkutane Einspritzung des eigenen durch Aspiration entleerten Eiters in der Menge von 0,5 bis 2 ccm dreibis fünfmal täglich drei bis zehnmal wiederholt. Die Methode erwies sich als wirksam und ungefährlich. S t r o c k i j, P o p o v i c u haben die wiederholte Punktion mit nachfolgender subkutaner Ein-

ispritung des eigenen Eiters nach der Methode von M a k a i ebenfalls mit Erfolg angewandt.

Auch in der römischen Kinderklinik wird nach C a t t e r u c c i a zur Punktionsbehandlung, Pleurotomie und Drainage grundsätzlich eine Behandlung mit Autovaccine vorgenommen, wobei jeden zweiten Tag 0,2—1,0 ccm des Impfstoffes intravenös oder 0,5—2,0 ccm intramuskulär verabreicht werden. Bei 41 so behandelten Kindern wurden 34 (82,9%) Heilungen erzielt.

Die V o r t e i l e der B ü l a u 'schen Heberdrainage liegen vor allem in der Vermeidung des Pneumothorax und Fehlen des Operationsschicks.

Nach L a n d o i s kommt diese Methode in erster Linie beim gutartigen Pneumokokkenempyem in Betracht, ferner als vorläufige Operation zur Eiterentleerung bei allen denjenigen Kranken, die gleichzeitig Lungenherde haben oder an Debilitas cordis leiden. Erst wenn diese Störungen beseitigt sind, ist die Rippenresektion indiziert, eventuell mit Anlegung der P e r t h e s 'schen Saugdrainage. Gerade in der provisorischen Anwendung der Heberdrainage erblickt L a n d o i s den Hauptvorteil des Verfahrens.

K ü t t n e r führt die von S p e n c e an 204 Fällen mitgeteilten Erfahrungen an, wonach die Heberdrainage mit 39,4% Mortalität die besten Erfolge gab.

H a a s, der in den ersten beiden Lebensjahren die Rippenresektion für völlig kontraindiziert hält, lobt die Stachelheberdrainage nach D r a c h t e r, wonach sich die Mortalität auf 22,2% erniedrigte.

R ü t z sieht in der B ü l a u 'schen Drainage nach vorheriger Probepunktion das geeignete Verfahren für die Behandlung des kindlichen Pleuraempyems. Beim Verstopfen des Drains durch größere Fibringerinnung wendet er Spülungen mit Salzsäure-Pepsin an. Die Eiterentleerung soll sich zur Aufrechterhaltung der normalen Thoraxverhältnisse möglichst auf Punktion und B ü l a u 'sche Heberdrainage beschränken.

H a r t wendet ein von ihm ausgearbeitetes Verfahren der ständig in Bewegung befindlichen Spüldrainage mit Pendelspülung und Saugbehandlung an, für das er die Ein- und Ausatmungsbewe-

gungen nutzbar macht. Die günstige Wirkung der Behandlung zeigte sich bei seinen 50 Empyemfällen in erster Linie in einer Herabsetzung der Mortalitätsziffer. Bei 13 Kindern im Alter von zwei Jahren und darunter betrug die Mortalität nur 16%, während sie in der Zeit von 1915—28 bei geschlossener Drainage 50%, bei offener Drainage nach Rippenresektion 29% betrug. Die erforderliche Dauer der Spülbehandlung lag zwischen 17 und 30 Tagen, die im allgemeinen mit dem Lebensalter anstieg. Die Gesamtmortalität bei den 50 Kranken betrug 10%. Unter weiteren 36 Berichtsfällen hatte Hart nur 5 Todesfälle. Bemerkenswert ist, daß unter den 15 Kindern unter zwei Jahren nur 1 Todesfall war (7% Mortalität). Bei vier Fällen handelte es sich um ein doppelseitiges Empyem. An anderer Stelle berichtet Hart über weitere 11 Kinder mit Empyemen unter zwei Jahren, die auf dieselbe Weise, wie oben angeführt, behandelt wurden, wovon nur 9% starben.

McEachern empfiehlt die geschlossene Bülausche Drainage, auf Grund seiner an 75 Fällen von Pleuraempyem im Alter zwischen 1 und 11 Jahren gewonnenen Erfahrungen, als Behandlungsmethode der Wahl. Die Drainagebehandlung sei schon von Hippokrates empfohlen worden. Zur Vermeidung des Luft Eintrittes in die Pleurahöhle rät er, den Katheder so zu wählen, daß er luftdicht in der Troikarthülfe schließt, wenn er mit Glyzerin angefeuchtet ist. Durch entsprechende Verwendung von Klemmen und Anlegung eines Kollodiumverbandes um die Einführungsstelle des Katheters herum wird ein luftdichter Abschluß gewährleistet. 24 Stunden nach Anlegung des Katheters begann er mit Spülungen, zweifündlich am Tage und in der Nacht dreimal mit Dakinscher Lösung. Bei Vorhandensein von Bronchialfisteln setzte er vorübergehend die Spülungen aus, die sich nach 3—7 Tagen in all seinen 7 Fällen verschlossen. Er hatte nur 2 Todesfälle mit anderweitigen Komplikationen von seinen 75 so behandelten Fällen. In weiteren 42 Berichtsfällen mit der Drainagemethode betrug die Mortalität nur 2,38%. Ähnliche Erfolge mit der Bülauschen Drainage geben Bennemann, Packard und Melchior an.

Fleisch empfiehlt nach Punktion die geschlossene Drainagebehandlung. Bei synpneumonischen Empyemen rät er zu Optochin-spülungen oder zur Autopyotherapie.

Ebenso rät Nissen beim Pneumokokkenempyem zur Punktion, und zwar im 7. Interkostalraum im Bereich der hinteren Axillarlinie. Er empfiehlt als Nachbehandlung Spülungen mit Optochinlösung oder Borfäure-Pepsingemisch, wenn nötig Bülausche Dauerdrainage, die alle 2—3 Stunden intermittierend auszuführen ist.

Sauerbruch entschließt sich, wenn trotz Punktionen anhaltendes Fieber neues Anwachsen des Eiters zeigt, zur geschlossenen Drainage, wobei er die von Iselin angegebene Methode, bei der durch Höher- und Tieferstellen der Flasche eine genaue Regulierung möglich ist, bevorzugt. Vor allzu starkem Saugen rät er ab, ebenso wie Perthes, da sich ja die Lunge möglichst wieder von selbst ausdehnen soll.

Im Säuglingsalter und beim Kleinkinde hält Sauerbruch im besonderen die konservative Punktionsbehandlung am Platze. Er hat beobachten können, daß selbst große Mengen nicht punktierter Exsudate im Kindesalter zur Aufsaugung kommen.

Nur mit wiederholten Punktionen und Aspiration des Exsudates behandelte McEnery seine 33 angegebenen Fälle, wovon 25% der Patienten jünger als zwei Jahre, 50% unter drei Jahren waren; es starben nur 6%. Im Durchschnitt betrug die Heilungsdauer $3\frac{1}{2}$ Monate.

Für Kinder unter zwei Jahren hält McEnery die Punktionsbehandlung als Methode der Wahl und fordert sie zunächst in jedem Falle. In seinen 94 weiter berichteten Fällen konnten 72% der Fälle ohne Operation, 70% allein durch Punktion geheilt werden; zwei heilten spontan aus durch Durchbruch in den Bronchus.

Aron empfiehlt für die Empyembehandlung beim Kinde die Punktionsbehandlung zusammen mit dem Drahterschen Verfahren, die solange wie möglich fortzusetzen ist; sie muß vorsichtig begonnen werden, um erhebliche Druckschwankungen zu vermeiden.

Frenkl führte im allgemeinen die Empyembehandlung mit nicht allzu häufigen Punktionen durch, denen, wenn sie sich als un-
Punktionsbehandlung zusammen mit dem Drahter'schen Ver-
zuschließen ist. Primäre offene Rippenrefektion wird von ihm als
Behandlungsmethode für das jüngere Kind abgelehnt.

Mikula wandte bei Pneumokokkenempyemen die Punk-
tions- und Spülbehandlung nach der Methode von Gralka mit
Optochin an. Bei Staphylo- und Streptokokkenempyemen führte
Mikula eine Spülung mit Rivanollösung 1:1000—2000 durch.

Auch Grosser empfiehlt als bestes Verfahren die Optochin-
behandlung nach Gralka bei Pneumokokkenempyemen. Nach
seinen Erfahrungen erscheint es sogar besser, eine Abkapfelung des
Empyems oder ein Dickwerden des Eiters abzuwarten.

Über die Anwendung der Optochinbehandlung und deren Er-
gebnisse berichten ferner Reinold, Paschinsky, Stamm.

Thomson führt eine geschlossene Empyembehandlung mit
täglich mehrmals durchgeführten Spülungen mit Dakin'scher
Lösung aus. Nach ihm hat die Lösung den großen Vorteil, nicht
toxisch zu sein und ferner begünstigt sie die Auflösung vorhandener
Fibrinballen.

Die geschlossene Behandlungsmethode wandten auch Harloe
u. a. erfolgreich an; so berichtet er über eine Mortalität von 9,87%
der 233 Empyeme bei Kindern. In den ersten 24 Stunden nahm er
dann Spülungen mit Salzlösung vor, darauf injizierte er 15—25 ccm
Dakinlösung. Die Spülungen setzte er fort bis zum Klarwerden.

Coquelet fordert zur Entgiftung des Kranken die als-
baldige Drainage mit anschließenden Pleuraspülungen mit Dakin-
scher Lösung, die er besonders zur Sterilisierung eines frischen Em-
pyems geeignet hält; auch bei chronischen Empyemen verkleinert
sie schnell und ausgiebig die Höhle. Seine Resultate ergaben eine
Mortalität von 7,3%.

Scollo, Coccheri, Bonell und Tomaffini empfeh-
len für leichtere und unkomplizierte Fälle die Punktion und Ein-
führung von Taurocholat-Lösung.

Eu. Schwarz erhebt die prinzipielle Forderung aus seinen
Erfahrungen, im Säuglingsalter ein Empyem ausschließlich durch

Punktion zu behandeln und im späteren Kindesalter mindestens die Therapie mit Punktionen zu beginnen, ehe eine Thorakotomie in Frage kommt. Schwarz wandte auch nach beendigter Aspiration des Eiters eine 5%ige Lösung von Natrium-Taurocholat in steriler NaCl-Lösung an und hebt neben der bakteriziden Wirkung des Natrium-Taurocholats auch seine Eigenschaft, den Eiter zu verflüssigen, hervor.

Boller spülte nach Punction mittels Troikart und Eiterabsaugung mit physiolog. NaCl-Lösungen und injizierte, wenn die Spülflüssigkeit klar war, Jodipin oder Lipiodol (15—20 ccm) ein. Er wandte diese Jodölfüllung in 9 Fällen an und konnte 8 zur Heilung bringen.

Lewkowicz sieht in dem geschlossenen Verfahren die Methode der Wahl und empfiehlt daher, das Exsudat durch Punction zu entleeren, die Pleurahöhle mit NaCl-Lösungen zu spülen. Danach führte er frisches Blutplasma in die Pleurahöhle ein, wodurch er eine Entfäuerung des Exsudates erreichte und die Infektion unterdrücken konnte, während das Fieber als Folge der Resorption des Eiters fortbesteht.

Intercostale Thorakotomie.

Der Einfachheit und Bequemlichkeit für Arzt, Kind und Pflege halber empfiehlt Noeggerath die interkostale Pleurotomie, vor allem in den ersten beiden kritischen Lebensjahren. An seinem im Jahre 1930 mit dieser Methode behandelten 34 Fällen hatte er nur eine Mortalitätsziffer von 12,5% zu verzeichnen, wovon ein Fall zu Lasten des Pneumokokkenempyems und 4 Fälle des Streptokokken- und Staphylokokkenempyems zum Tode führten.

Die schlechte Prognose der Rippenrefektion, die unbefriedigenden Ergebnisse der einmaligen oder wiederholten Pleurapunktionen brachte Noeggerath wieder zu dem ältesten Verfahren der einfachen operativen interkostalen Eröffnung der Pleura mit anschließender Drainage durch einen Gummidrain zurück. Bei noch bestehender Pneumonie gehen dem Eingriff einmalige oder mehrfache Pleurapunktionen voraus. Statt des Saugverfahrens nach Bülow wendet Noeggerath reichliche Verbandstoffmengen

an. Zur Verdünnung des Eiters macht er Spülungen mit Straub-Normofal.

Rohrer, Ratichvili, Scollo, Zischinsky, Passeron, Catteruccia und Plate kamen auf ähnliche Weise zu Erfolgen.

Passeron erwähnt eine von Fister und Arancibia aufgestellte Statistik über 72 empyemkranke Kinder, wonach bei kleinster Pleurotomie und Drainage die Mortalität 90%, bei Rippenresektion und Drainage 65%, bei Pleurotomie und Bäderbehandlung 36% betrug.

Jamin kommt zu dem Ergebnis, daß die Pleuraempyembehandlung auf rasche und vollständige Entleerung des Ergusses durch Thorakazentese bedacht sein muß und weist darauf hin, daß die Sekretverhaltung mehr als ein Lufteintritt zu fürchten ist.

Auch Stajić empfiehlt nach mehrmaligen Punktionen bei Vorhandensein von Verdrängungsercheinungen, denen eine Ausspülung der Pleurahöhle mit desinfizierender Lösung (5% Methylenblau, 1% Collargol, 5%ige Optochinlösung) folgt, nur als chirurgischen Eingriff eine minimale Pleurotomie (Interkostalschnitt) mit Drainage beim geschlossenen Thorax. Bei beiderseitigem Pleuraempyem führt er den chirurgischen Eingriff, wenn möglich erst auf der linken Seite, durch.

Brown, Denis wendet bei feiner Behandlung des kindlichen Pleuraempyems ebenfalls die interkostale Inzision längs der Rippe, etwa 5 cm lang, im 6. oder 7. Interkostalraum in der hinteren Axillarlinie an. Die Pleurahöhle wird mit Dakin'scher Lösung (nur etwa 0,5 Ltr) von einer Temperatur von 40° durchgespült unter mäßigem Druck, wodurch die Spülung ungefährlich wird. Die Spülungen werden in der ersten Woche dreistündlich wiederholt. Wenn die Pleurahöhle nicht mehr als 5 ccm Inhalt der Spülflüssigkeit faßt, werden die Katheter entfernt. Im allgemeinen betrug die Dauer dieser Behandlung bis zur Heilung drei Wochen.

Rippenrefektion.

Haben sich Punktions- und Drainagebehandlung bei Pleuraempyemen im Säuglings- und Kindesalter nicht als ausreichend erwiesen oder verlagert, so muß man sich entschließen, wie u. a. Rütz, Binney, Packard, Bauer, Graham, Brown, Klages, Koos, Hoppe, Paschla-Lehmann, Küttner, Niffen, Sauerbruch, Hendson, Mikula, zur Rippenrefektion unter Beobachtung von Grundfätzen, die lebensbedrohende Einflüsse auf den Organismus durch das operative Handeln möglichst fernhalten und die Indikation hierzu rechtfertigen. Hierauf habe ich schon früher näher hingewiesen. Wichtig ist die Wahl des Zeitpunktes des chirurgischen Eingriffes. Wie Graham verlangt, ist die formative Periode des Empyems abzuwarten, wodurch die Gefahr des verhängnisvollen Mediastinalflatterns gemindert ist. Die Pneumonie soll abgeklungen, die Anzeichen eines schweren allgemeinen Kräfteverfalls und bedrohlicher Herzschwäche gebessert sein.

Weniger zahlreich sind die Autoren, die die primäre Rippenrefektion im Kindesalter fordern (Nicol, Anistratenko, Cohen, Sussi, Steinke, Bauer, Erdély, Linhberg, Brown, Douglas u. a.), wenn der Eiter dick geworden und mit Fibrinfäden durchsetzt ist, weiter Koos nach vorheriger vierzehntägiger Punktionsbehandlung.

Bonell und Tomassini, Graham, Everts, Berck halten sie nach dem Grundsatz: „ubi pus, ibi evacua“ als die beste Operationsart.

Von einigen Autoren wird sogar nur die offene Thorakotomie mit Rippenrefektion empfohlen: so glauben Rienhoff und Davidson (nach Steinke), daß die offene Thorakotomie bei Kindern unter 2 Jahren die besten Resultate ergibt; je jünger der Patient und je schlechter sein Allgemeinbefinden, um so wichtiger ist die sofortige Drainage.

Rienhoff hebt hervor, daß nach seinem Eindruck die offene Thorakotomie mit Rippenrefektion im allgemeinen bei Kindern eine befriedigendere Maßnahme ist als die geschlossene Thorakotomie, vor allem deswegen, weil sie einen ununterbrochenen

freien Eiterabfluß gewährleistet. Er hält den teilweise entstehenden Pneumothorax bei der offenen Thorakotomiebehandlung für weniger gefährlich als die Hinderung des Eiterabflusses bei der geschlossenen Thorakotomie, mit der so häufig unvollkommenen Drainage, wodurch nur die Mortalitätsziffer erhöht wird, wie er an seinen 48 beobachteten Fällen bei Kindern unter 2 Jahren feststellen konnte.

Die Vorteile der offenen Thorakotomie gegenüber den anderen Behandlungsverfahren sind, wie Melchior hervorhebt, vor allem die bessere Orientierungsmöglichkeit und Abflußbedingung.

Im allgemeinen betont Küttner, daß die primäre Thorakotomie nur bei kräftigen Kindern und zähem Eiter angezeigt ist, während die sekundäre Thorakotomie bei hoher Virulenz der Bakterien, schlechtem Allgemeinbefinden und Wiederansammlung des Exsudates in Frage kommt. Das häufig allzu oft angeführte Auftreten und die Angst vor einer vermehrten Gefahr durch die Brustwandphlegmone bei Verschuß der mit Eiter primär verschmierten Wunde hält Walz für unbegründet, da man ja auch bei eitriger Bauchfellentzündung primäre Heilung von Bauchwandschnitten erreichen kann. Er weist darauf hin, daß es sich übrigens bei der Empyemoperation um einen Wundverschuß mit seitlicher Drainage handelt.

Aus einer gewissen Unzulänglichkeit der Bülauschen Heberdrainage und ihrer Modifikationen, wie auch des einfachen Thoraxschnittes hat sich die breite Thorakotomie mit Rippenresektion entwickelt, wie Landois anführt. Der eigentliche Grund zu dieser Behandlungsmethode war aber nach Küttner die Verengerung der Interkostalräume, bedingt durch die Thoraxschrumpfung. Die zunehmende Verengerung der Inzisionsöffnung soll durch Vergrößerung des Thoraxfensters beseitigt werden. Vor allem wird die Rippenresektion in der schnellen, ausgiebigen Eiterentleerung weitestgehend der Forderung gerecht: *ubi pus, ibi evacua*. Diese Forderung ist nach Landois trotz der Gefahr des offenen Pneumothorax mit Kollaps der Lunge oder plötzlichem Auftreten von Kreislaufstörungen angezeigt bei Streptokokkenempyemen, Brustfelleiterungen, entstanden nach Durchbruch mischinfizierter Ka-

vernern oder Gangränherden in die Pleurahöhle. Hierbei ist die Bekämpfung der schweren Infektion das erste Gebot.

Für das Grippeempyem hält Neuer die Rippenrefektion für die Grundlage und das Ziel der Behandlung, zu welchen ähnlichen Folgerungen auch Kleinschmidt, von Beust und Dermatt gelangen. Hierbei müsse der günstige Zeitpunkt abgewartet werden; im besonderen empfiehlt Küttner, bei sehr dünnflüssigem, seröseitrigem Exsudat in den ersten Tagen mit der Rippenrefektion abzuwarten. Küttner erwähnt, daß er während der schweren Grippeepidemie im Herbst 1918 sämtliche, auch die ungünstigen Empyeme, mit Rippenrefektion in Lokalanästhesie behandelt hat, wobei die Mortalität nur 25% betrug. Als Methode der Wahl hält er die geschlossene Iselin'sche Rippenrefektion mit folgender Aspiration.

Am Ende des vergangenen Jahrhunderts wurde, wie Landois anführt, vor allem auf Grund der Arbeiten von Franz König (1878 und 1880), Karl Beck (1882) u. a. die Rippenrefektion bei der Thorakotomie zur Methode der Wahl erhoben und mag auch heute unter Beobachtung obiger angeführter Grundsätze und unter Anwendung geeigneter Vorrichtungen, die den Luftzutritt zur Höhle während der Nachbehandlung beschränken, mehr und mehr in der Behandlung der kindlichen Pleuraempyeme Eingang gefunden haben.

Für die operative Behandlung des Empyems hat L. Rehn folgende Grundregeln aufgestellt, die Küttner hervorhebt: 1. Man operiere Eiteransammlungen so früh als möglich; 2. man übe strenge Asepsis, da sonst gefährliche Mischinfektionen auftreten könnten; 3. man lege die Kranken nicht auf die gesunde Seite, um gefährliche Zufälle zu vermeiden; 4. man schneide direkt auf die zu entfernende Rippe und reseziere subperioostal; 5. man lege den Schnitt so, daß sich der Eiter gut entleeren kann, d. h. möglichst dem Grunde der Eiterhöhle entsprechend; 6. die Öffnung soll so groß sein, daß man eitrige Fibringerinnsel möglichst entleeren kann; 7. das Drainrohr soll nicht weit in die Höhle hineinragen, weil es sonst seinen Zweck nicht erfüllt. Man soll es gut befestigen,

damit es nicht in die Pleurahöhle schlüpft; 8. man operiere unter Lokalanästhesie oder in ganz leichter Narkose.

Ob nun die Rippenresektion in Lokalanästhesie oder in Narkose vorgenommen werden soll, darüber sind die Meinungen verschieden.

Als Vorteil der Narkose wird angeführt, daß die Pleura-reflexe weniger heftig auftreten. K ü t t n e r hat jedoch gerade bei dem Empyem von den reflektorischen Hustenanfällen nach Eröffnung der ja stets schwer veränderten und infolgedessen in ihrer Reflexerregbarkeit stark herabgesetzten Pleura keine Schädigung gesehen. Er operiert daher stets und grundsätzlich in Lokalanästhesie und hat sogar bei Kindern nie wirkliche Schwierigkeiten gehabt. Dagegen hat er, worauf er im besonderen hinweist, auch bei ganz leichter Narkose sehr ernste Zwischenfälle erlebt.

Ebenso führt Sauerbruch nach K ü t t n e r die Rippenresektion in Lokalanästhesie aus, wie auch H o l l e n b a c h, K l a g e s, B r o w n, K o o s, D o u g l a s, M i k u l a.

Über die Wahl der Rippenresektion sind die Meinungen geteilt. Hierbei ist die Art des Empyems zu berücksichtigen.

Bei den nicht abgefackten Empyemen herrschen zwei Verfahren, das S c h e d e'sche und K ö n i g'sche, vor. S c h e d e empfiehlt Resektion der 9. oder 10. Rippe lateral von den langen Rückenmuskeln an der tiefsten Stelle und am Rücken wegen der günstigen Abflußbedingungen. Dieser Methode wird vorgeworfen, daß das Hinaufrücken des Zwerchfells die Drainage beeinträchtigen könnte. Deshalb rät K ö n i g die 5. oder 6. Rippe in der vorderen oder mittleren Axillarlinie zu resektieren und durch Seitenlage, Erheben des Kranken die Entleerungen täglich zu fördern. L a n d o i s hält für die beste Stelle zur Ausführung der Rippenresektion bei den einfachen, nicht abgefackten Empyemen die 7. oder 8. Rippe in der hinteren Axillarlinie, da hier für die Nachbehandlung die besten Abflußbedingungen gegeben sind. Beim abgefackten Empyem ist das Operationsfeld schon durch den Sitz der Eiterung vorgezeichnet (L a n d o i s).

Mehrere Rippen zu resektieren hält K ü t t n e r bei einem gewöhnlichen, frischen Empyem nicht für notwendig.

Bei den abgekapselten supraphrenischen Empyemen geht man am besten hinten unten ein, rechts im 8., links im 9. Interkostalraum (K ü t t n e r). Von dem mindestens 10 cm langen Schnitt aus reseziert man ein Stück der Rippe und dringt längs der Zwerchfellkuppe nach innen an der Lungenbasis vor, wobei man meist bald auf den Abzeß stößt.

Hat sich das Empyem aus einem subphrenischen Abzeß entwickelt, so rät K ü t t n e r, diesen durch das Zwerchfell zu indizieren oder bei bereits erfolgtem Durchbruch in die Pleura durch die Perforationsstelle zu drainieren.

Bei doppelseitigen Empyemen empfiehlt K ü t t n e r, zunächst mit Punktionen auszukommen, da diese erfahrungsgemäß rasch Verklebungen beider Pleurablätter herbeiführen, wodurch bei der später nachfolgenden Thorakotomie ein Totalpneumothorax sich vermeiden läßt. Falls noch notwendig, fügt man später die Thorakotomie der anderen Seite hinzu, die man zunächst vorher weiter punktiert hat. Auch L a n d o i s empfiehlt zunächst Punktion der Seite, wo sich das kleinere Empyem befindet, und auf der anderen Seite die B ü l a u 'sche Heberdrainage. Wenn der Kranke sich erholt hat, führt er auf der anfänglich punktierten Seite die Rippenresektion mit anschließender Saugbehandlung nach I s e l i n und H a r t e r t aus und läßt später gegebenenfalls auch die der anderen Seite folgen.

Bei mehrkammerigen Empyemen führt K ü t t n e r, falls nicht von einer Refektionsstelle die weichen brüchigen Zwischenwände mit dem Finger durchbohrt werden können, mehrfache Rippenresektionen aus.

Das Empyema necessitatis, dessen Durchbruchstelle gewöhnlich am tiefsten Punkt der Eiterhöhle liegt, macht evtl. eine Rippenresektion an anderer Stelle noch erforderlich (K ü t t n e r).

Bei den traumatischen Empyemen warnen S a u e r b r u c h - S c h m i d t, die Eiterung durch Punktion oder eine kleine Eröffnung der Brusthöhle anzugeben. Vielmehr ist erforderlich, den Brustraum unter Refektion mehrerer Rippen breit zu spalten und zu tamponieren. Lediglich bei dem traumatischen Früh- oder Spätempyem versuchen diese Autoren zunächst mit der B ü l a u 'schen Hederdrainage auszukommen. Bei den durch Grippepneumonie her-

vorgerufenen Pleuraempyemen empfehlen sie nach vorausgegangenen entlastenden Punktionen, nach Besserung des örtlichen und allgemeinen Befindens, sekundär erst die Thorakotomie mit Rippenresektion unter Druckdifferenz und abdichtendem Verband.

Bei den nach Lungenabszeß- oder Lungengangrändurchbruch entstandenen Empyemen, wobei sich ein Pneumopyothorax, ja selbst ein Spannungspneumothorax durch Ventilbildung entwickeln kann, fordern Sauerbruch-Schmidt baldige Resektion mehrerer Rippen und breite Tamponade der Brusthöhle. Ist der Durchbruch aber erst nach chronischem Verlauf in einen Lungenlappen-spalt oder einen abgekapfelten Bezirk sekundär erfolgt, ist es auch möglich, nacheinander vorzugehen, erst den Brustfelleiter möglichst restlos durch Thorakotomie zu entleeren, und in einer zweiten Sitzung den Lungenabszeß- oder Gangränherd auszuräumen. Um gleich mit dem Entleeren des Eiters an den erkrankten Lungenteil selbst heranzukommen, sollen in dessen Umgebung gleich 4 oder 5 Rippen reseziert werden.

Auch Küttner weist darauf hin, daß vielen nicht ausheilenden Empyemen Lungen- und Bronchialfisteln zugrunde liegen, deren Vorhandensein schon frühzeitig durch Druckdifferenz aufgeklärt werden kann. Diese heilen meist im Gefolge einer Thorakoplastik aus, bedürfen aber doch gelegentlich eines besonderen Verschlusses durch Naht oder Plastik.

Landois führt die von Leb ausgearbeitete Methode mit offenem Kanalsystem der Luftwege zum Verschuß von Bronchialfisteln an und sieht in ihr einen großen Fortschritt, da man die von Sauerbruch und Jahn früher für schwierige Fälle vorgeschlagene Exstirpation des betreffenden ganzen Lungenlappens so vermeiden kann.

Bettmann empfiehlt zum Verschuß der Bronchialfistel beim Empyem die geschlossene Drainage mit einem in die Brusthöhle eingeführten Nelatonkatheter mit Spülung der Pleurahöhle.

Beim interlobären Empyem kommt es nach Landois darauf an, von der Achselhöhle aus den Hauptinterlobärspalt zu erreichen. Dies geschieht nach Clairmont am besten in Höhe der 5. Rippe in der mittleren Axillarlinie. Die 4., 5. und 6. Rippe ist notwen-

digenfalls subperiostal zu entfernen. Liegt keine Pleuraverklebung vor, so kann man nach L a n d o i s vorher die Lunge einnähen.

N i s s e n widerrät beim interlobären bzw. mediastinalen Empyem die Punktion und B ü l a u 'sche Drainage wegen der Gefahr der Infektion gesunder Pleuraabschnitte. Er empfiehlt hier die Methode, den röntgenologisch lokalisierten Herd mit breitem Schnitt freizulegen und falls keine Verlötung vorliegt, diese durch die S a u e r b r u c h 'sche Paraffinplombe zu erzwingen. Nach Eintritt der spontanen Perforation wird das Plombenbett freigelegt, die Plombe entfernt, die nun gut erkennbare Perforationsstelle erweitert und drainiert.

Auch S a u e r b r u c h verlangt beim interlobären bzw. mediastinalen Empyem, daß dem Eiter durch breite Eröffnung bald Abfluß geschaffen werden muß. Liegt das Empyem wandständig, so ist der Eingriff leicht. Ist dies nicht der Fall, so empfiehlt S a u e r b r u c h, mit dem Glüheisen durch die Lunge hindurchzugehen, um an den Eiterherd heranzukommen; bestehen hiergegen aber Bedenken, so hält er die präpleurale Plombierung für notwendig.

Für die Methode der Wahl hält K ü t t n e r in der chirurgischen Behandlung des Pleuraempyems die geschlossene Rippenresektion von I s e l i n mit nachfolgender Aspiration.

S c h m e r z gibt als Durchschnittszahl für den Unterdruck 40 bis 50 mm, höchstens 100 mm Quecksilber an. Durch stärkere Saugwirkungen können nach G r a f, die meist entzündlich veränderte Lunge, Bakterien und ihre Toxine mobil gemacht werden.

L a n d o i s hält diese Methode der Rippenresektion und Thorakotomie mit luftdichter Pleuradrainage und Saugung nach I s e l i n P e r t h e s - H a r t e r t ebenfalls als die Methode der Wahl, da dieses Verfahren die Vorteile der Rippenresektion mit denjenigen der B ü l a u 'schen Drainage vereinigt.

Bei dem Verfahren von H o l l e n b a c h wird die 9. oder bei tiefstehendem Zwerchfell die 10. Rippe in 6—8 cm Ausdehnung in Lokalanästhesie reseziert, das Exsudat abgelassen und statt des Drains ein Gazetampon eingelegt, der, durch einige Seidenfäden in feiner Lage gehalten, die Pleurahöhle luftdicht abschließt. Die Nachbehandlung führt H o l l e n b a c h mit früh einsetzender Lungen-

gymnastik durch und hat dabei gute Wiederausdehnung der Lunge beobachtet (K ü t t n e r).

An das erstmalig von L i f t e r vorgeschlagene und neuerdings von H a t h a w a y (1920) befürwortete Verfahren des sofortigen Verschlusses der Wunde nach Empyemoperation zwecks rascher Entfaltung der Lunge für alle reinen Pneumokokken- und Pneumokokken-Staphylokokkenempyeme sei in diesem Zusammenhang erinnert (K ü t t n e r).

Ein wichtiges Hilfsmittel in der operativen Behandlung ist vor allem im Kindesalter das Verfahren der Druckdifferenz nach S a u e r b r u c h.

K ü t t n e r erwähnt die günstigen Vorteile dieses Verfahrens durch die Mitteilungen von S a u e r b r u c h, W i e t i n g, H a m m e r, B u r c k h a r d t und L a n d o i s, daß sich durch die intra-bronchiale Drucksteigerung gleich wieder normale Spannungsverhältnisse im Brustraum einstellen und damit Pneumothoraxfolgen nicht zu befürchten sind.

Auf die Vorteile und Bewährung dieses Verfahrens geht K ü t t n e r im besonderen ein und weist auf das frühzeitige Wiederentfalten der Lunge hin, was bei akuten Erkrankungen leicht, bei älteren nur durch höhere Druckdifferenz zu erreichen ist, wobei im allgemeinen eine Druckhöhe von 12 mm Quecksilber (= 15,5 cm Wasser) nicht überschritten werden soll, um eine drohende Überdehnung des gefunden Lungenflügels zu vermeiden. Vor allem bewährt hat sich das Druckdifferenzverfahren bei para- und metapneumonischen Empyemen und hier besonders bei denen des Kindesalters, bei den Grippeempyemen, bei allen weniger virulenten Empyemen, bei den frühen und späten traumatischen Empyemen des Friedens und des Krieges. Die günstige Wirkung des Druckdifferenzverfahrens zeigt S a u e r b r u c h selbst in einer Gegenüberstellung zweier Statistiken: von 63 Kranken mit schwersten Grippeempyemen, die unter Druckdifferenz operiert wurden, heilten 57 fistellos, 6 starben (9,5%); von 32 ohne Druckdifferenz Operierten starben dagegen 17 (53%).

Bei hochvirulenten Eitererregern, wenn Jauchung, Durchbruch von den Speisewegen besteht, ist das erste Gebot breite und tiefe

Drainage der Brustfellhöhle. Ebenso wird von K ü t t n e r bei Bestehen einer Lungen- oder Bronchialfistel vor Anwenden dieses Verfahrens gewarnt.

L a n d o i s sieht in der schnellen und ausgiebigen Entleerung des Eiters, in der Vermeidung des Lungenkollaps und des Verbleibens von Resthöhlen die Vorteile bei Anwendung dieses Verfahrens; weist aber auch auf die Nachteile hin, daß durch die plötzliche Ausdehnung der Lunge im Überdruck, was sich auch bei jedem neuen Verbandwechsel wiederholt, die Bakterien und Toxine mobilisiert und in den Körper hineingeschwemmt werden; dazu wird durch die Resektion mehrerer Rippen ein großes Fenster in der Brustwand geschaffen.

Zur Erreichung der Wiederentfaltung der Lunge und Verkleinerung des Hohlraumes, insbesondere bei veralteten Empyemen, die zwar nur allmählich zu erwarten ist, die durch regelmäßigen Verbandwechsel mit Hilfe des Überdruckapparates wesentlich unterstützt wird, empfiehlt K ü t t n e r Atemübungen unter Druckdifferenz durch die einfach zu handhabenden und brauchbaren Apparate u. a. von T i e g e l - H e n l e , B r a t - S c h m i e d e n .

Gelingt es weder durch Aspirations- und Überdruckverfahren, noch durch eine exakte, dichte Verbandtechnik, wie sie von S c h e d e , T h i e r s c h und P e r t h e s angegeben worden ist, eine Verkleinerung der Höhle herbeizuführen, so ist nur von einem nochmaligen chirurgischen Eingriff Hilfe zu erwarten.

Die Beseitigung der veralteten Empyemhöhle, die monatelang Eiter absondern kann, ist nach L a n d o i s eine *indicatio vitalis*, dies kann durch Entknochung und Mobilisierung der starren Brustwand (Thorakoplastik) oder der Lunge durch Befreiung ihrer Schwarten (Decortication) oder beider zusammen erreicht werden, wie auch durch Plombierung der Höhle mit autoplastischem und alloplastischem Material.

Vor dem operativen Eingriff bei veralteten Empyemen ist es von großer Bedeutung, worauf u. a. L a n d o i s und K ü t t n e r hinweisen, sich von der Ausdehnung der Höhle zu unterrichten, sei es durch Sondierung (K ö n i g , P e l s - L e u s d e n), oder durch Röntgenuntersuchung evtl. mit Kontrastmittel (Wismut-Emulsion,

Collargol oder Jodipin), durch Thorakoendoskopie. Um sich über die Form und Ausdehnung der Höhle weiter zu orientieren, wird auch Gebrauch gemacht von dem explorativen Prinzip der Refektion einer Rippe, entweder in der Nachbarschaft der Fistel oder über der Mitte der Höhle (Helferich, Beck, Krause, Kocher, Jordan).

Ein Nachteil dieser Secundär-Operationen ist, daß die Operation der Thorakoplastik nicht aseptisch ist. Vorhergehende Spülungen mit antiseptischen Lösungen haben daran nicht viel geändert.

Zur Verkleinerung der Empyemhöhle empfehlen Sauerbruch und Perthes, wie Küttner angibt, auch die Phrenikotomie oder die Vereifung des N. phrenicus in Lokalanästhesie.

Günstig und zweckmäßig ist es nach Küttner, den durch die chronische Eiterung geschwächten Kranken, besonders aber Kinder, in zwei oder mehreren Sitzungen in Berücksichtigung des örtlichen und allgemeinen Zustandes zu operieren. Gerade bei Kindern ist dann der Erfolg meist sehr erfreulich und verblüffend, selbst in Hinsicht auf die Deformierungen des Thorax und der Wirbelsäule. Am schonendsten ist die von Sauerbruch angegebene mehrzeitige ausgedehnte paravertebrale, extrapleurale Rippenrefektion, die Küttner, Rütz und Nissen empfehlen. Vorausgeschickt wird unter Umständen die Phrenikotomie, wodurch das gelähmte Zwerchfell heraufrückt und die Höhle im senkrechten Durchmesser verkleinert wird. Anschließend reseziert man, fern von der septischen Fistelumgebung, paravertebral und extrapleural die 1. bis 6. Rippe. Nach 2—3 Wochen folgt, wie Sauerbruch selbst ausführt, der intrapleurale Eingriff, indem die Pleura mittels Türflügel- oder Lappenchnitt eröffnet wird und die Verwachsungen gelöst werden.

Ist die Refektion der 1.—6. Rippe nicht ausreichend, so werden nach drei Wochen nach unterem Bogenschnitt die 7.—11. Rippe mit der Brustfellschwarte möglichst weit entfernt, die vertebrealen Stümpfe herausgedreht, die Wunde breit tamponiert und nur z. T. genäht. Wieder 3 Wochen später trägt man von einem Paraesternalschnitt aus die vorderen Stümpfe der 1.—7. Rippe am Brustbein und, wenn nötig, das Rippenfeld ab.

Selbst für das schwere mischinfizierte Empyem hat sich nach Sauerbruch das extrapleurale Vorgehen bewährt und die Mortalität dieser Empyeme konnte von 90—100% auf 20% herabgedrückt werden.

Die ersten, die systematisch die Mobilisierung der Brustwand in Angriff nahmen durch subperiostale extrapleurale Rippenresektion waren Gustav Simon (1869—70) und fast gleichzeitig Ernst Küster (1873). Bei diesem Simon-Küster'schen Verfahren der extrapleuralen Thorakoplastik wurden mehrere Rippen reseziert unter Erhaltung und Schonung der schwierig verdickten Pleura costalis, die dann durch Kompressionsverbände auf die kollabierte Lunge gedrückt wurde. Wie Küttner mitteilt, hielt man die Pleura für ein *noli me tangere* und nahm an, daß die pleuritischen Schwarten nützlich seien und wertvoll für die Ausbildung von Adhäsionen. Estlander suchte den Thorax über der Empyemhöhle gänzlich abzuflachen und empfahl, mindestens 3—4 Rippen übereinander in einer Ausdehnung bis zu 10 cm zu resezieren.

Küttner hebt zu diesem Verfahren der extrapleuralen Thorakoplastik nach Simon-Küster hervor, daß bei jungen Menschen namentlich die Rippenregeneration eine ausgiebige zu sein pflegt und somit eine weitgehende Wiederherstellung eintreten kann, daß bei genügender Mobilisierung der Thoraxwand die Höhlendecke gut einsinkt, die Pleuren miteinander verkleben und die Lunge dehnt sich wieder gut aus.

Nach Küttner ist diese Methode dann modifiziert worden von Wagner, Subotin, Beck, Quénu, Tietze, Jabonlay, Leymarie, Ritter.

L. Rehn hat, wie Küttner anführt, die „costale Pleurolyse“ als endgültigen Eingriff gedacht. Durch allmähliches Fortlassen der Tamponade soll ein Wiederanliegen der Pleura costalis samt der mit ihr inzwischen verwachsenen Lunge an die Thoraxwand herbeigeführt werden.

Schades Verdienst war es, erkannt zu haben, daß die Pleura parietalis in diesen Fällen nicht geschont werden darf, sondern daß sie beseitigt werden muß, weil sie das Haupthindernis für die Ausheilung darstellt; besitzt sie doch auch nach Entfernung der Rip-

pen in ihrer Starrheit noch Halt genug, um die Höhle offen zu halten.

Bei der Sch ed e'fchen Operation, der intrapleuralen Thorakoplastik, werden nach einem Lappenschnitt über der erkrankten Thoraxseite (von der Höhe der 6. Rippe in hinterer Axillarlinie abwärts, untere Pleuragrenze, aufwärts am vertebralen Rand der Scapula) die kostalen Pleuraschwarten samt den Rippen in der ganzen Ausdehnung der Empyemhöhle entfernt. Die 2.—9., evtl. 10. Rippe wird subperiostal reseziert mit den Knorpeln bis zum Tuberculum costae beim Totalempyem. In die muldenförmige Wundhöhle, in deren Grunde die von der verdickten Pleura visceralis bedeckte Lunge freiliegt, wird der Haut-Muskellappen möglichst sorgfältig durch Situationsnähte zur Vermeidung einer starken Retraktion desselben eingepaßt, damit er allseitig gut verklebt und Verhaltungen nicht zustande kommen. Zur besseren Ableitung der Sekrete legt K ü t t n e r statt der einfachen Tampons stets noch drei Drains ein und empfiehlt Nachbehandlung mit D a k i n'scher Lösung nach der Carrel'schen Vorschrift. Zur Vermeidung schwerer tödlicher Kollapses nach der Operation beim nicht sehr widerstandsfähigen Kranken rät K ü t t n e r, den Eingriff auf mehrere Operationsakte zu verteilen.

Die Resultate der Sch ed e'fchen Operation waren bei K ü t t n e r sehr gut. Nach K ü t t n e r hat Sch ed e Fälle mitgeteilt, bei denen über der ganzen Lunge wieder vesikuläres Atmen auftrat, wobei offenbar der Zug, den die Muskulatur des Schulterblattes und des Armes auf die Lungenoberfläche ausübt, günstig wirkte. Der untere Teil der Lunge bleibt allerdings meist atelektatisch.

L a n d o i s hält die Sch ed e'fche Thorakoplastik für eine sehr schwere und für die Kranken verstümmelnde Operation. Wenn man sie schon anwenden will, so rät er, nach der Modifikation von B r a u n, sie auf vier Sitzungen in Lokalanästhesie mit leichtem Chloräthylrausch zu verteilen; nach ihr wird auch die dicke Pleuraschwarte nach Auslösung der Rippen nicht geopfert, sondern zur Plombierung des Kuppelraumes durch Faltung nach M e c h i o r verwendet; um aber auch gleichzeitig wieder die Lunge zur Atmung zu

bewegen, empfiehlt L a n d o i s, nach B r a u n, gitterförmige Inzisionen in die Pleura pulmonalis einzulegen.

Gute Erfolge der S c h e d e 'schen Operation erwähnt L j a c h o - v i c k i j. Er empfiehlt, die Operation nach Möglichkeit bei Kindern nicht früher als sechs Monate nach Beginn der Erkrankung auszuführen.

Die S c h e d e 'sche Operation hat noch weitere mehrfache Modifikationen erfahren, sei es, um die Dauer und GröÙe der Operation zu vermindern, sei es, sie zweckmäßig auf mehrere Sitzungen zu verteilen.

F r i e d r e i c h (1898) hat ein Verfahren ausgearbeitet, wonach die Schwarte nicht entfernt wird, sondern nur durch mehrere Einschnitte (Inzisionen) beweglich gemacht wird, worauf es in Wirklichkeit ankommt (K ü t t n e r). Die Thoraxresektion wird merklich eingeschränkt. Die Pleura costalis bleibt mit dem sonst entfallenden Rippenperiost erhalten.

H e l f e r i c h reseziert die Rippen nicht subperiostal, sondern trägt mit einer schneidenden Knochenzange die gesamte Bedeckung der Empyemhöhle in einem Zuge ab. K ü t t n e r empfiehlt dieses Verfahren nur für kleinere Höhlen wegen des großen Infultes.

B e c k geht von der explorativ resezierten Rippe aus und reseziert nur so viel Rippen nach vorherigem genauen Übersehen und Abtasten der Höhlenwände, wie es der Ausdehnung der Höhle entspricht.

Um die Eiterung einer starren Pleurahöhle gänzlich zum Verfliegen zu bringen, bedeutete, wie schon S c h e d e hervorhob, auch nach Resektion aller Rippen die Ausfüllung der Pleurakuppe eine große Schwierigkeit. Deshalb wurde versucht, den Kuppelraum durch Anwendung von autoplastischem Material zu plombieren, ein Verfahren, das als Ergänzung zur Thoraxresektion ursprünglich empfohlen wurde. M e l c h i o r benutzt so zur Ausfüllung des Kuppelraumes der bis an die Spitze reichenden Empyemhöhle einen nach oben breitbasig gestielten, zungenförmigen Lappen der Pleura parietalis, der in den Kuppelrezessus eingeschlagen wird.

Nach Küttner berichten Melchior, Hirschmann, Hartert, Sprengel und von Hacker über günstige Resultate.

Sudeck zerlegt die Operation in zwei voneinander unabhängige Teile; er reseziert im ersten Akt die 9., 8. Rippe und darüber die 6., 7. Rippe subperioostal in ganzer Länge und legt in die Thoraxmulde einen doppelt gestielten Lappen ein. In den oberen Teil der Empyemhöhle, der sich bereits durch die offene Behandlung mit Tamponade meist schon verkleinert hat, wird in einer zweiten Sitzung nach Resektion der höheren Rippen und der unteren Hälfte der Scapula ein gestielter Lappen des Zwischengewebes der resezierten Rippen und der Muskulatur des resezierten Scapulateiles eingeschlagen. Ähnliche Verfahren wie das von Sudeck, das Küttner für Totalempyeme besonders empfiehlt, haben Gobel, von Hacker, Grosz und Tietze ausgearbeitet.

Kirchner verwendet nach Resektion der 2. und 3. Rippe einen Muskellappen, gebildet aus dem *Musculus pect. maior* und dem *Musc. pect. minor*.

Um die Verkleinerung der Resthöhle zu beschleunigen, kann der N. phrenicus (Sauerbruch, Perthes, Kirchner) vorübergehend durch Vereifung blockiert werden.

Nissen benutzt als Ausfüllung zur Verödung der Resthöhle im hinteren mediastinalen Recessus einen aus der Muskulatur der langen Rückenstrecker gebildeten Fett-Muskellappen.

Diese Methode der Anwendung der Plombierung hat Burk unter Verwendung von alloplastischem Material gänzlich selbständig gemacht. Nach vorheriger Sterilisation der Empyemhöhle mit Dakin'scher Lösung, die eingetreten ist, wenn das Wundsekret aus der Fistel bakterienfrei geworden ist, erfolgt die Plombierung mit Back'scher Wismutpaste.

Auf einem ganz anderen Wege suchte Délorne die Verkleinerung der Epyemhöhle herbeizuführen, indem er der Lunge ihre Ausdehnungsmöglichkeit wiedergeben will durch Befreiung aus der Umklammerung durch die verdickte schwartige Pleura pulmonalis, die Decortication der Lunge. Sauerbruch hebt hervor, daß die Decortication nur dann in Frage kommt, wenn eine deutliche

Grenze zwischen Lungenoberfläche und Schwartenbelag durch Inzision festgestellt werden kann. Bux rät, auch die Schwarten im oberen höchsten Winkel zu entfernen; Donati empfiehlt, nach Küttner, die Decortication mit einer Pneumopexie zu verbinden; er befestigt die Lunge mit Catgutnähten an den aufgeklappten Brustwandlappen.

Küttner gibt an, daß sich mehrfach die Lunge nach der Decortication wieder ausdehnte; ebenso fahen Bier und Kümmel, Sauerbruch, Beck, Ryerson-Fouler, Lardy, Tavel, Tuffier, Roux, Mayo-Beckmann günstige Resultate. Garrè, Rehn, Vöswinkel, Girard, Guinard fanden die Lunge nicht entfaltbar. Von Sauerbruch, Körte, Barth, Kirchner, Kürth, Schede wurde jedoch dieses Verfahren abgelehnt wegen starker Blutung aus der Lunge, vorkommender oberflächlicher Einrisse und wegen Infektion des Lungengewebes. Eine Kombination von Thorakoplastik mit Decortication ist von Jordan, Krause, Kocher durchgeführt worden.

Mögen auch die Thoraxoperationen zu erfolgreichen Ausheilungen der Empyemhöhle beitragen, so macht Pétren doch auch auf die plötzlich bei diesen großen chirurgischen Eingriffen eintretenden cerebralen Störungen aufmerksam, die durch arterielle Luftembolie hervorgerufen werden.

Zum Schluß möchte ich noch einige Erfolge der Empyembehandlung durch Rippenresektion anführen.

Klages berichtet über 98 Fälle, wovon 33 durch Rippenresektion, Einlegen eines Drains mit Thiersch'schem Ventilverband, darüber dicke r Zellstoffverband und 14 Tage nach der Operation mit offener, durchschnittlich 29 Tage erforderlicher Drainagebehandlung mit Erfolg behandelt wurden. Letztere kann ohne Gefahr angewandt werden, da dann eine sichere Verwachsung der Pleura und Abkapselung des Empyems eingetreten ist. Die Dauer der Behandlung betrug bis zur Heilung 40 Tage im Gegensatz zur Bülauf'schen Drainagebehandlung, die 53 Tage erforderte.

In einem weiteren Bericht erwähnt Klages 89 mit diesem Verfahren behandelte Kinder, wovon nur sieben starben; auch bei Kleinkindern belief sich die Sterblichkeit nur auf 10%.

Brown führt auch die Rippenrefektion und Eröffnung der Pleura aus mit folgender Drainage durch dickes Gummidrain und großen Verband. Die fibrinösen Stränge entfernt er einen Tag nach der Operation mit der Kornzange. Die Bildung weiterer fibrinöser Stränge verhindert er durch Spülung mit proteolytischer Dakinlösung. Den Drain entfernt er, wenn Puls, Temperatur normal geworden sind und das Sekret seinen eitrigen Charakter verloren hat. Im besonderen weist er darauf hin, daß urspüngliche bronchopleurale Fisteln im Kollapsstadium schnell ausheilen und sich schließen können; einen sicheren Beweis dafür gibt ihm das Fehlen von Hustenreiz während der Spülung. In einem weiteren Bericht führt Brown nach Steinke über 250 Fälle (1906—12) an; von diesen wurden 171 mit Refektion behandelt mit einer Mortalität von 21,5%; von den 54 mit interkostaler Drainage behandelten Fällen starben 40,3%.

Steinke selbst hält die Rippenrefektion für die Operation der Wahl im Kindesalter, entweder allein oder nach vorhergehender Aspiration. Bei 256 so behandelten Fällen von 310 fand er nur eine Mortalität von 12,5%, während es bei der Thorakozentese zu 10 Todesfällen (= 34,5%) kam. Zusammenfassend läßt sich nach Steinke sagen, daß die Rippenrefektion allein die geringste Mortalität ergibt (11,9%).

Bonell und Tomassini scheint die Rippenresektion mit allmählicher Entziehung des Eiters die beste Operationsart nach dem Grundsatz: ubi pus, ibi evacua; sie haben selten eine Beeinträchtigung durch den Pneumothorax auf den Heilverlauf gesehen. Von 225 empyemkranken Kindern wurden 182 nur chirurgisch, 13 zuerst konservativ, dann chirurgisch und 30 allein konservativ behandelt. Die Sterblichkeit nahm, wie sie hervorheben, mit dem zunehmenden Alter ab; sie betrug 16,8%.

Hoppe rät, wenn der Eiter nicht durch Punktionen entfernt werden kann, zur Refektion, die er in 11 Fällen durchführte, wovon 10 genasen.

Nicol wandte in 17 Empyemfällen bei Kindern im Alter von 4 Monaten bis zu 14 Jahren nur mit 1 Todesfall bei einem zweijährigen Kinde die Rippenrefektion erfolgreich an. Hierbei legte

er in die rezezierte Rippenstelle einen Knopfdrain ein und verschloß darüber den Hautlappen wieder fest; bei der Inspiration verschließt der Lappen das Knopfdrain und verhindert so den Lufteintritt, während bei der Expiration sich der Eiter entleeren kann.

Graham, Everts, Berck kamen nach Prüfung der verschiedensten Verfahren zur Überzeugung, daß das beste Behandlungsverfahren die Rippenresektion am untersten Punkt des zum Abzeß gewordenen Empyems mit anschließender offener Drainagebehandlung durch ein Drainrohr ist. Sie berichten über diese Methode, die sie über Jahre hindurch im St. Louis Children's Hospital befolgten, an 36 Fällen bei Kindern unter 2 Jahren, wovon nur 8 (22%) starben, und an 80 über 2 Jahre alten Kindern, wovon 5 (6,2%) starben.

Anistratenko operierte von 17 empyemkranken Kindern unter 10 Jahren 14 mittels primärer Rippenresektion und offener Drainage, wovon 7 starben.

Cohen berichtet über 123 Empyemfälle von Kindern im Alter von 18 Tagen bis 13 Jahren, von denen zwei Drittel jünger als 4 Jahre waren; 83 mal fanden sich Pneumokokken (meist Typus I) als Erreger. Nach Abklingen der pneumonischen Erscheinungen und evtl. vorangehender Aspiration führte er die Resektion eines Rippenstückes aus, legte ein Drain ein und behandelte weiter offen. Die Letalität betrug nur 8,1%.

Auch Sussis's Empyembehandlung bestand in der Rippenresektion und folgender geschlossener Drainage, worüber er an 30 empyemkranken Kindern unter 7 Jahren Mitteilung macht; er hatte eine Mortalität von 10% zu verzeichnen.

Packard berichtet über 64 Empyemfälle bei Kindern, wovon er 10 mal die Rippenresektion ausführte und nur dabei einen Todesfall zu verzeichnen hatte; bei den durch Pneumonie hervorgerufenen Empyemfällen kam nach Abklingen der Pneumonie (bei Dickwerden des Eiters), wonach erst operiert wurde, kein Fall ad exitum. Alle Fälle wurden zwei oder mehrere Male am Tage mit Dakin'scher Lösung gespült. Die Heilungsdauer betrug im Durchschnitt 42 Tage. Packard selbst bezeichnet seine Erfolge als besonders gute.

Erdély weist im besonderen auf die Unvollkommenheit der Aspirationsdrainage nach Bü lau - Hildebrand hin wegen allzuleichter Verstopfung der Kanüle; infolgedessen empfiehlt er die Rippenrefektion, die er in mehreren Sitzungen auch durchführt: Nach Refektion der 8. Rippe in 8 cm Ausdehnung aspiriert er am folgenden und übernächsten Tage mit einer Spritze 100—200 ccm Exsudat; am 4. Tage macht er eine 1 cm lange Inzision ohne Drainage, die er dann am nächsten Tage in Länge der Gesamtwunde erweitert und legt dann einen Mullstreifen 1—2 cm tief ein. Nach Entleerung der Fibringerinnfel innerhalb von einigen Tagen und zunehmender Wundverkleinerung führt er eine kleinfingerdicke Drainröhre ein, die er bis zum Versiegen des Eiters beläßt. In dieser Weise behandelte Erdély 6 Fälle mit Erfolg und sehr guten Resultaten; einer von ihnen erlag später einer Bronchopneumonie der anderen Seite.

Auf den Vorteil seiner Methode weist Erdély hin und führt an, daß die sonst so verhängnisvolle Shockwirkung herabgesetzt, bzw. die Intensität der Erregbarkeit der Reflexbahnen vermindert wird.

Lin h b e r g empfiehlt die nach Grippe und Bronchopneumonie entstandenen Empyeme stets zu resezieren, da es sich meist um Streptokokkeninfektionen handelt, während nach Pneumonie entstandene Empyeme häufig nach Punktion oder spontan ausheilen können.

N i s s e n entschließt sich auch zur Rippenrefektion unter Einführung eines luftsicher abgedichteten Hebersystems, wenn die Bü lau'sche Heberdrainage allein nicht genügt, was vor allem für das Staphylokokkenempyem in Frage kommt, wie er besonders hervorhebt, wobei es durch die starke Fibrinausscheidung leicht zur Verstopfung kommen kann. Die primäre Rippenrefektion ohne Wahrung der physiologischen Druckverhältnisse empfiehlt er, nur bei kleinen abgekapselten Empyemen, bei älteren mit starker Schwartenbildung und bei Restempyemen auszuführen.

H e n d s o n berichtet über 86 empyemkranke Kinder, bei denen er zu 64 % die Rippenrefektion mit Heilungserfolg ausführte.

Die Heilungsdauer betrug im allgemeinen 30 Tage; während die mit geschlossener Drainagebehandlung erst in 48 Tagen genasen.

Douglas führt ebenfalls, sobald sich der Eiter durch Punktion nicht mehr abziehen läßt, die subperioistale Refektion eines Rippenstückes in Ausdehnung von 3—4 cm aus, mit nachfolgender geschlossener Saugdrainage; um das eingeführte Drain, das er mit einem Gummiläppchen bedeckte, verschloß er das Perioist, Subkutangewebe und die Haut durch Naht völlig dicht. Nach 8—9 Tagen entfernte er das verkürzte Drain, wenn sich röntgenologisch keine Flüssigkeit mehr in der Brusthöhle zeigte. Alle 48 Berichtsfälle behandelte er auf diese Weise, wovon ihm nur 4 Kinder verstarben, die ihm aber schon vorher in sehr schlechtem Allgemeinzustand und Kräfteverfall eingeliefert worden waren.

Mikula geht zur Rippenrefektion und Pleurotomie nach der Iselin'schen Methode mit Drainage über, wenn nach mehrfacher Punktion keine Heilung erzielt werden kann; vor allem hält er sie bei Staphylokokken- und Streptokokkenempyem für notwendig. Die Drainage führt er eine Woche durch, worauf Spülungen der Wunde mit antiseptischen Lösungen die Heilung beschließen. Von 45 auf diese Weise behandelten Kinderempyemen starben nur 4 Fälle, von denen zwei zwar schon im septischen Zustand eingeliefert wurden.

Koos und Carsky haben noch besondere Modifikationen bei der Empyembehandlung durch Rippenrefektion angegeben. So führt Koos und Carsky haben noch besondere Modifikation angegeben. So führt Koos nach der Rippenrefektion der 9. Rippe in Ausdehnung von 2—3 cm ein 12—15 cm langes abgeklemmtes Gummidrainrohr mit aufgesetzter Gummischeibe ein, die er nach Durchstechung des Perioist- und Pleurablattes fest an die thorakale Pleura anlegt; auf das Drain schiebt er dann an die Thoraxwand eine Ebonitscheibe und saugt mit einer 200 ccm Spritze den Eiter vorsichtig ab, bis das Drainrohr unter dem Einfluß des äußeren Luftdruckes etwas zusammenfällt, was den Eintritt des negativen Druckes in der kranken Brusthälfte andeutet. Die Anwendung des Scheibendrainrohres verhindert die Bildung des Pneumothorax, rasche Ablassung des Eiters, leichte Herstellung des negativen Druk-

kes, womit die Möglichkeit der Entfaltung der kollabierten Lunge und Verkleben der Pleurablätter gegeben ist.

C a r s k y beschreibt sein Verfahren wie folgt: Nach Resektion der Rippe und Thorakotomie am Grunde der Empyemhöhle mit nachfolgender Evakuierung des Eiters legt er $\frac{1}{4}$ kg sterile Vaseline in die Pleurahöhle ein. Die Wunde wird mit Gaze abgedeckt und die ganze kranke Thoraxhälfte mit Leukoplaststreifen überklebt. Die eingebrachte Vaseline wirkt wie eine einseitige Klappe, sie erlaubt das Durchsickern des Eiters, wehrt jedoch dem Eindringen atmosphärischer Luft in die Pleurahöhle. Der Verband über dem Leukoplast wird täglich erneuert; nach 14 Tagen wird der eigentliche Fixationsverband entfernt. Die kranke Lungenhälfte hat sich dann bereits an die parietale Pleura fixiert; wenn nötig wird der Fixationsverband wiederholt. C a r s k y empfiehlt sein Verfahren, da er bei seinen Fällen beobachten konnte, daß die Mortalität um $\frac{2}{3}$ sank.

Nachbehandlung.

Nach jedem chirurgischen Eingriff beim Pleuraempyem ist größtes Gewicht auf die Nachbehandlung zu legen.

Die Erhaltung der Kräfte des meist sehr geschwächten Kranken ist eine wesentliche Voraussetzung der Heilung (K ü t t n e r, K l a g e s, N o e g g e r a t h). Daß neben entsprechender Allgemeinbehandlung zuweilen auch Bluttransfusionen zweckmäßig sind, hat H a r l o e beschrieben; er empfiehlt bei Kindern in der Rekonvaleszenz jeden 4. oder 5. Tag 50 ccm Blut zu transfundieren.

Vor allem ist aber die retrahierte Lunge, sobald wie möglich, und auf jede Weise zur Entfaltung zu bringen, da von ihr die Ausheilung des Prozesses weitgehend abhängt. Neben der aktiven Atemgymnastik des Patienten stehen uns mannigfache Methoden des Saugverfahrens, verbunden mit einer sachgemäßen Verbandtechnik, zur Verfügung und unterstützen unser Ziel, wo die Natur nicht allein sich ausreichend helfen kann.

Auf die Aspirationsdrainage weist K ü t t n e r im besonderen hin, da sie die Nachbehandlung sehr erleichtert und sie vor allem auch viel sauberer und angenehmer für den Kranken sich gestaltet.

Bei jeder forcierten Ausatmung wird die Lunge stark erweitert. Man läßt daher die Patienten systematisch Atemübungen gegen Widerstand (Lufringe, Gummikissen!) machen. Kinder erhalten eine Trompete, in die Widerstände eingelassen sind, aufblasbare Gummitiere u. a. Landois empfiehlt auch das Atmen mit Ventilüberdruckmasken, besonders die von Goetze konstruierte. Coquelet und W. Hofbauer führten eine regelrechte Lungengymnastik durch.

Unterstützt wird dieses Ziel der aktiven Wiederausdehnung der Lunge durch eine fachgemäße Verbandtechnik. Ausgezeichnet wirkt hier der Thierfich'sche Ventilverband, mit dem Landois, Küttner u. a. sehr gute Erfolge hatten und den auch Küttner im einzelnen hervorhebt: Er beruht auf der Überlegung, daß die Lunge wieder an der normalen Atmung teilnimmt, sobald die Öffnung, durch welche die Luft von außen in die Pleurahöhle eintritt, kleiner wird als der Querschnitt des Hauptbronchus. Die Fisteln werden durch eine Gummiplatte bedeckt, in welche ein Drainrohr luftdicht eingefügt ist, das in einen dünnwandigen, leicht kollabierenden Schlauch ausläuft, der wohl Luft und Flüssigkeit austreten, aber keine Luft eintreten läßt. Bei Bestehen einer Bronchialfistel bleibt freilich der Verband zwecklos.

Von Küttner wird noch die Morrison'sche Ventil-drainage mittels eines Hautfascien-Muskellappens erwähnt.

Landois weist im besonderen nun darauf hin, daß bei den Atemübungen mit expiratorischem Überdruck die Lunge jedesmal nur vorübergehend gedehnt wird, während es mit Hilfe des Perthes'schen Saugverfahrens (1898) und seiner Modifikation möglich ist, infolge der Luftverdünnung in der Empyemhöhle eine Zugwirkung auf das Lungengewebe auszuüben. Bedingung ist, daß das Drain in die Pleurahöhle vollkommen luftdicht eingelassen ist.

Nach Davis und Morelli kommt es leider bei dieser Methode leicht zu Verstopfungen des Drains.

Küttner und Landois führen noch die Saugapparate von Härtel, Schwarz, Nordmann an, mit denen die Behandlung ambulant durchgeführt werden kann und die Kranken mit Aspirator frei herumgehen können; von Eberts hat einen mit

Gummigebläse betriebenen Apparat empfohlen; Delbet und Girode benutzen die Potain'sche Flasche.

Unbeeinflusst bleiben, wie Landois hervorhebt, bei dieser Behandlungsart wieder diejenigen Empyemhöhlen, bei denen infolge einer Bronchialfistel der Druck im Bronchialbaum dem Druck in der Empyemhöhle gleich ist.

Von der Maßnahme, den Kranken, sobald es der Wundverlauf gestattet, aufstehen zu lassen oder ihn auch im Bett ins Freie zu bringen, hat Küttner großen Vorteil gesehen. Den Hustenreiz bekämpft er nicht, außer wenn er nur sehr quälend ist, da er für die Entfaltung der Lunge nur günstig wirken kann.

Auch Noeggerath erkennt in der Verbesserung der Erfolge der Empyembehandlung die Erhaltung und Stärkung der Widerstandskraft des Kranken, die durch geeignete Ernährung einschließlich der Wasserversorgung, sowie durch Bekämpfung der Kreislauf- und Atmungsschwierigkeiten und durch sorgfältige Pflege, frühzeitige Freiluftanwendung zu fördern ist. Ebenfalls wandte Cohen mit gutem Erfolg frühzeitige Freiluftbehandlung, natürliche und künstliche Sonnenbestrahlung an.

Wichtig ist, wie Küttner hervorhebt, die besondere Lagerung des Kranken, damit ein tägliches Ausgießen der Höhle möglich ist.

Der Verbandwechsel muß stets der Menge des abgesonderten Sekrets entsprechen. Bei jauchigen Empyemen ist dieser mindestens einmal am Tage erforderlich.

Steubuck betont zur Nachbehandlung der breiten Thorakotomiewunde, die von Connors 1926 empfohlene Gazetampnade statt der Drainageröhren, die durch Pleurareizung die Sekretion unterhalten.

Auf die häufigen Temperatursteigerungen in der Rekonvaleszenz nach Empyemoperation weist Küttner noch hin, die meist auf Sekretverhaltung beruhen und nach deren Beseitigung verschwinden.

Sluckij weist im besonderen darauf hin, daß statischer Lungengymnastik, kombiniert mit relativ frühem Aufstehen, eine wichtige Rolle einzuräumen ist in der Prophylaxe der Residual-

erscheinungen bezüglich der Veränderungen von Seiten des Brustkorbes und der Wirbelsäule.

Bauer lenkt die Aufmerksamkeit im besonderen auf die Nachkrankheiten nach Pleuraempyem hin, die zuweilen das erfolgversprechende Endergebnis zerstören können: er unterscheidet die metastatisch entstandenen, in erster Linie auf dem Blutwege, und zum andern die fortgeleiteten, entweder auf dem Lymphwege oder besonderen Wegen wie Knochen, Nerven; so können Abszesse an anderen Körperstellen, ja sogar eitrige Meningitiden u. a. auftreten.

Gerne kommt es nach Pleuraempyem zur Ausbildung eines subphrenischen Abszesses, Senkungsabszessen oder Peritonitiden, infolge Durchwanderung der Infektion durch das Zwerchfell (Bauer).

Spasokukockij erinnert an metastatische Infektionen entfernter Organe durch Thrombophlebitis der Lungenvenen infolge der Lungeneiterung und daraus entstehenden infektiösen Embolien.

Nobécourt erwähnt als Nachkrankheit auch die Pericarditis, die 21 mal nach Pneumonie und eitriger Pleuritis unter den beobachteten Fällen auftrat.

Dennel und Hofbauer heben die krankhaften Zustände an vielen Organen nach der Ausheilung der Brustfelleiterung durch operative Behandlung hervor, die sie an 100 Fällen in 1½ Jahren beobachten konnten. Auch sie bedürfen einer sorgfältigen Nachbehandlung.

So konnten sie Verwachsungen zwischen Pleura costalis und Pleura diaphragmatica in einem großen Abschnitt feststellen, weiter Verwachsungen auf der Zwerchfellkuppe. Sie weisen darauf hin, daß in extremen Fällen diese Zwerchfellverwachsungen die Beweglichkeit des Zwerchfells ganz aufheben, bzw. die Atmungstätigkeit der Lungen hindern, dauernd Schmerzen hervorrufen können.

An der Lunge der erkrankten Seite fanden beide Autoren nicht selten atelektatische Zustände mit vikariierendem Emphysem der gesunden Seite. Häufig fanden sie auch Verwachsungen zwischen Pleura costalis und pulmonalis, wenn die beiden Pleurablätter nach Beseitigung des Ergusses miteinander in Berührung kommen. Bleibt

eine Resthöhle zurück, so ist die vollkommene Wiederentfaltung der Lunge in Frage gestellt.

Auch das Mediastinum zeigt gerne Veränderungen wie Verlagerung des Herzens, der Trachea, Mediastinalwandern und Pneumothorax des Mediastinums. Die knöcherne Thoraxwand zeigte D e n n e l und H o f b a u e r oft eine Skoliose mit der konvexen Seite; nach der kranken Seite; der Schultergürtel einen Tiefstand der Schulter der kranken Seite. Auch M c E n e r y berichtet, daß es unter feinen 33 empyemkranken Kindern zuweilen zu einer Skoliose kam, die aber meist spontan heilte.

Von therapeutischen Maßnahmen empfehlen H o f b a u e r und D e n n e l zur Wiederherstellung, auch wenn sich manche dieser Veränderungen im Laufe der Zeit von selbst zurückbilden, erstens die Lagerung, wobei die pleuralen Verwachsungen durch das Gewicht der Baueingeweide und durch gesteigerte Zwerchfelltätigkeit gedehnt werden, und ihre Resorption angeregt wird; zweitens die systematisch vorgenommenen Atemübungen, namentlich die aktive Expiration.

Eigenes Material.

Im folgenden sollen die 52 Fälle von Kindern, die wegen Pleuraempyem aus den Jahren 1920—1935 in die Chirurgische Universitäts-Klinik, Bonn (43 Fälle) und in das St.-Johannes-Hospital, Bonn (9 Fälle) eingeliefert und behandelt wurden, einer kritischen Sichtung unterzogen werden.

Über den Krankheitsverlauf ergibt sich Folgendes:

Fall 1. (Chir. Klin.) J.-Nr. 3802/1921.

3 Monate altes Kind (männl.), das am 20. 12. 20 an unbekannter Ursache erkrankte und am 5. 1. 21 in die Klinik kam mit einem Pleuraempyem rechts zusammen mit einer Pneumonie; fieberfrei.

Klin. Befund der Lunge rechts: Dämpfung.

Die Probepunktion ergab 10 ccm rahmig-grünlichen Eiters, in dem sich bakteriologisch Staphylokokken in Reinkultur nachweisen ließen.

Der sehr schlechte Allgemeinzustand, die starke Atrophie (Haut in Fetzen abhebbar) verbunden mit einer Kreislauffchwäche, führten bereits am 7. 1. 21 zum Exitus. Die Sektion ergab: Empyem der Pleurahöhle rechts und Abszesse im rechten Unterlappen.

Fall 2. (Chir. Klinik.) J.-Nr. 7632/1933.

6 Monate altes Kind (weibl.), das am 2. 1. 33 mit einer Mittelohrentzündung erkrankte und am 11. 1. in die Klinik eingeliefert wurde mit einem Pleuraempyem rechts zusammen mit einer Pneumonie rechts; Temp. 40°; Cyanose, Nasenflügelatmung.

Klin. Befund der Lunge: absolute Dämpfung.

Die Probepunktion ergab 40 ccm gelben, rahmigen Eiters; bakterio-logisch hämolyzierende Staphylokokken. Im Blutbild fanden sich: 110 200 Leukozyten; Normoblasten 2, Myelozyten 6, Jugendliche 3, Stabkernige 17, Segmentkernige 36, Lymphozyten 28, große Monozyten 10%.

Röntgenologisch fand sich Erguß; dichte Verschattung im Bereich der re. unteren Lungenpartie.

Am 12. 1. Thorakozentese im 5. Interkostalraum, Aspirationsdrainage mit Drachterstachel; am 18. 1. dieser ersetzt durch Schlauch mit vorsichtiger Kochsalzspülung. Am 27. 1. Exitus infolge Herzschwäche.

Die Sektion ergab: Abgekapseltes Empyem (klein, handtellergrößer) über Unter- und Mittellappen re. (z. T. interlobär); Pneumonie re. Unterlappen, z. T. eitrig umschrieben im re. Mittel- und Oberlappen.

Fall 3. (Chir. Klin.) J.-Nr. 344/1932.

8 Monate altes Kind (männl.), das vor 3 Wochen im Anschluß an eine Erkältung an einer Pneumonie rechts erkrankte, die seit 14 Tagen latent blieb und am 16. 3. 1932 mit einem postpneumonischen Pleuraempyem rechts eingeliefert wurde; Temp. 38,3°; beschleunigtes Nasenflügelatmen.

Röntgenologisch fand sich eine diffuse Verschattung der re. Lungenseite, die beim Aufrichten des Kindes einem Erguß entsprach; leichte Herzverdrängung nach links.

Klin. Befund der Lunge: Dämpfung der ganzen rechten Seite bis zur Spitze; abgeschwächtes Atemgeräusch.

Die Probepunktion ergibt dickrahmigen Eiter, in dem kulturell Pneumokokken und gelbe, nicht hämolyzierende Staphylokokken nachgewiesen werden.

Am 17. 3. wird nach Punktion ein Gummidrain eingelegt und die Aspirationsdrainage mittels Wasserstrahlpumpe angelegt; gleichzeitig werden Einläufe mit Traubenzucker und physiol. Kochsalzlösung gemacht und Cardiazol gegeben; Ernährung mit Moro-Milch (5×100).

Am 7. 4. konnte das Drain entfernt werden; Temp 37,5°.

Am 12. 4. waren Wunden fast verheilt.

Am 15. 4. trat ein erneuter Temperaturanstieg auf (39°) durch Pneumonie im Oberlappen rechts. Ein Anhalt für ein erneutes Empyem fand sich nicht.

Dazu findet sich röntgenologisch am 19. 4. ein ausgedehnter Pneumothorax rechts und starke Herzverdrängung; der Pneumothorax wahr-

scheinlich durch bestehende Bronchialfistel hervorgerufen, da keine Verbindung mit Pleuraraum von außen besteht. Die Luft wird durch zweimalige Pleurapunktion abgelassen (am 22. 4. und 28. 4.) (2—300 ccm) und am 2. 5. liegt auch röntgenologisch die Lunge wieder fest an. Entlassung am 8. 5. als völlig geheilt.

Fall 4. (Chir. Klin.) J.-Nr. 5671/1933.

1 Jahr altes Kind (männl.), das vor 8 Wochen an Keuchhusten und vor 5 Wochen an Lungenentzündung erkrankte und am 18. 8. 33 wegen eines Pleuraempyems links zusammen mit Pneumonie links in die Klinik aufgenommen wurde; Temp. 39°; schlechtes Allgemeinbefinden.

Klinisch findet sich geringe Dämpfung und abgeschwächtes Atmen über der linken Lunge.

Röntgenologisch fand sich eine Verschattung der ganzen linken Seite und Verdrängung des Herzens nach rechts.

Durch mehrfache Punktionen (am 22. 8., 23. 8., 24. 8. und 2. 9.) wurden 55—100 ccm grüngelben, dünnflüssigen, fötiden Eiters abgelassen. Nach intermittierendem Schwanken der Fieberkurve zwischen 36,8 und 37,5° blieb am 6. 9. die Temperatur normal; die Punktionsstelle war verheilt; ebenso der am 28. 8. inzidierte Abzeß in der rechten Glutaalgegend, so daß Entlassung als geheilt erfolgte.

Fall 5. (Joh.-Hosp.) J.-Nr. 1472/1921.

1½ Jahre altes Kind (männl.), das vor 8 Wochen an einer Pneumonie erkrankte; da Temperatur hoch blieb, wurde es vor 3 Wochen mit einem postpneumonischen Empyem rechts aufgenommen. Nach Probepunktion wird der Eiter durch interkostale Inzision mit Drain abgelassen; nach Besserung wurde das Kind auf Wunsch der Eltern entlassen.

Am 10. 11. trat wieder hoher Fieberanstieg auf, so daß Wiederaufnahme erfolgte.

Klin. Befund der Lunge: rechts hinten unten Dämpfung und aufgehobenes Atemgeräusch. — Nach Entfernung des Tampons in der Inzisionswunde wird der retinierte Eiter abgelassen und ein Drain eingelegt. Am 11. 12. wurde der Drain entfernt; fieberfrei. Am 24. 12. wurde das Kind als geheilt entlassen.

Fall 6. (Chir. Klinik.) J.-Nr. 2692/1932.

16 Monate altes Kind (männl.), das am 7. 6. 32 mit einer Lungenentzündung erkrankte; vor einigen Tagen fieberfrei. Am 23. 6. erneuter Fieberanstieg; Einweisung in die Klinik mit postpneumonischem Empyem rechts, mit Kurzatmigkeit und Nasenflügelatmen, Cyanose und schlechtem Allgemeinzustand; Temperatur 38,5°, Puls 140.

Klinisch findet sich rechts hinten unten über der Lunge absolute Schallverkürzung, während das Atemgeräusch bis zur Mitte der Scapula

aufgehoben ist. Röntgenologisch: hochgradige Verschattung der ganzen re. Seite, unten dichter als oben; Zwerchfellschatten nicht abgrenzbar.

Durch Punktion werden ca. 100 ccm grünlichen, mäßig dicken Eiters abgelassen, in dem sich bakteriologisch und kulturell massenhaft Pneumokokken nachweisen lassen. Da trotz mehrfacher Punktionen von 20—30 ccm dicken Eiters die Temp. nicht abfällt und teils remittierend, teils intermittierend bleibt, und die Dämpfung über der Lunge erneut zunimmt, wird am 17. 7. die Rippenrefektion im Bereich der Scapularlinie mit folgender Aspirationsdrainage mittels Drachterstachel und Wasserstrahlpumpe vorgenommen, worauf am 19. 7. die Temp. und Puls zur Norm zurückgehen. Am 22. 8. wird die Aspirationsdrainage abgesetzt. Am 9. 9. folgt die Entlassung in gutem Allgemeinbefinden und völlig reizloser Wunde; röntgenologisch ist das Zwerchfell gut beweglich und kein Erguß nachweisbar.

Fall 7. (Chir. Klin.) J.-Nr. 1985/1921.

15 Monate altes Kind (weibl.), das am 8. 7. an einer Lungenentzündung rechts erkrankte und in der hiesigen Kinderklinik Aufnahme fand; dort ergab eine Punktion dickflüssigen Eiter (Diplokokken), worauf am 4. 8. die Einweisung in die Chir. Klinik erfolgte mit postpneumonischem Empyem rechts, in schlechtem Allgemeinzustand. Temp. 39°; Thorax zeigt Rosenkranzbildung.

Klinisch findet sich über der Lunge rechts hinten unten Dämpfung mit aufgehobenem Stimmfremitus und Atemgeräusch.

Nach nochmaliger Punktion von dickrahmigem Eiter wird am 6. 8. die Refektion der 8. Rippe in 1—2 cm Ausdehnung und Eröffnung der Pleura vorgenommen, wonach ein Gummidrain eingelegt, die Wunde durch Hautnähte und Verband geschlossen wird.

Am 9. 9. wird das Kind vom Vater aus der Klinik fortgenommen trotz leichter Sekretion, aber normaler Temperatur.

Fall 8. (Chir. Klin.) J.-Nr. 6282/1932.

Am 13. 11. 32 wurde das 13 Monate alte Kind (männl.) in die Klinik eingeliefert, wegen eines Abszesses an der rechten vorderen unteren Thoraxseite und Fraktur der 11. Rippe rechts durch Fall auf das Gitter des Kinderbettes. Am gleichen Tage noch wird der Abszeß inzidiert und es werden bakteriologisch gelbe hämolyisierende Staphylokokken nachgewiesen.

Am 16. 11. erkrankte das Kind in der Klinik mit einer rechtsseitigen Lungenentzündung. Dämpfung über der ganzen re. Lunge, Nasenflügelatmen, schlechtes Allgemeinbefinden; Temp. 40°, Puls 160.

Röntgenologisch: Diffuse Verschattung der re. Seite, Zwerchfell nicht abgrenzbar.

Am 26. 11. wird, da die Temp. weiter auf $38,6^{\circ}$ und Puls 140 stehen bleiben, das Allgemeinbefinden sich verschlechtert, der Hautturgor erheblich nachläßt, die Dämpfung noch massiver wird, wegen Verdacht auf Empyem eine Punktion vorgenommen, die 60 ccm dicken, gelben Eiters ergibt, in dem sich bakteriologisch hämolysierende Staphylokokken mit Enterokokken nachweisen lassen. Die Punktionen werden mehrfach wiederholt am 28. 11., am 1. 12 und 2. 12 und ergaben 20—80 ccm dicken, gelben, fötiden Eiters.

Röntgenologisch ist am 1. 12. ein Erguß mit Spiegelbildung (Pneumothorax) nachweisbar.

Die Temp. bleibt über 38° konstant, ebenso Puls um 140. Die Inzisionswunde über der frakturierten Rippe kommuniziert frei mit der Empyemhöhle; die Rippe liegt frei.

Am 5. 12. wird in die Punktionsstelle ein Drachterstachel eingelegt und die Aspirationsdrainage mittels einer Wasserstrahlpumpe angeschlossen. Daneben werden Traubenzucker-, NaCl-Infusionen und Cardiazol gegeben.

Am 12. 12. ist röntgenologisch der Erguß und Pneumothorax geringer geworden. — Am 23. 12. wird der Drachterstachel entfernt, zwar die Aspiration durch die Wasserstrahlpumpe noch fortgesetzt.

Am 7. 1. wird diese abgesetzt und Spülungen dann vorgenommen. Die Temp. und der Puls sind fast zur Norm zurückgekehrt ($37,2^{\circ}$); röntgenologisch ist das Zwerchfell gut beweglich und die Empyemhöhle verkleinert. Am 25. 1. ist die Fistel geschlossen, Temp. und Puls sind völlig normal. Das Gewicht nimmt zu (7,3 kg); weiterhin erhält das Kind Höhensonne.

Das Kind erholt sich in folgender Zeit gut; röntgenologisch zeigt sich noch eine ganz geringe Verschattung, die auch bei der Entlassung am 3. 5. noch besteht; das Zwerchfell ist gut beweglich und etwas nach außen adhärent. Die Wunde ist völlig fest vernarbt, der Allgemeinzustand gut, das Gewicht auf 9,4 kg gestiegen.

Fall 9. (Chir. Klin.) J.-Nr. 1720/1927.

Das 18 Monate alte Kind (weibl.) erkrankte Ende Juni 1927 an einer Lungenentzündung links, wovon es sich unter weiterer Gewichtsabnahme nicht mehr erholte; am 12. 9. wurde in der Kinderklinik eine Punktion links vorgenommen, die 150 ccm fötiden Eiters ergab, in dem kulturell Strepto- und Staphylokokken nachweisbar waren. Am 15. 9. wurde es in die Chir. Klinik eingeliefert mit Pleuraempyem links und schlechtem Allgemeinzustand; Haut trocken und faltig; Temp. $37,8^{\circ}$, Puls 120.

Klinisch fand sich über der Lunge links massive Dämpfung und abgeschwächtes Atemgeräusch. Es wird eine Bülausche Aspirationsdrainage angelegt.

Da Temp. und Puls zur Norm zurückgekehrt sind, wird am 28. 9. die Aspirationsdrainage nur durch einen einfachen Drain ersetzt.

Am 14. 11. tritt jedoch wieder erneuter Temperaturanstieg intermittierenden Charakters auf (38°), ebenso Puls auf 140, so daß die Aspirationsdrainage mittels Wasserstrahlpumpe wieder angelegt wird; dazu werden Spülungen durchgeführt.

Röntgenologisch zeigt sich eine völlige Verschattung der linken Lungenhälfte mit Schwartenbildung. Bei der röntgenologischen Untersuchung am 3. 12., um die Größe der Empyemhöhle festzustellen, mittels Bariumbrei, wird dieser ausgehustet und damit eine Bronchialfistel nachgewiesen, die sich als ein etwa fünfmarkstückgroßer unregelmäßiger Fleck darstellt. Die Temp. ist noch immer intermittierend zwischen 36,8 und 37,8°; Puls 120.

Am 13. 12. schreitet man zu einer Refektion der 8. und 9. Rippe in einer Ausdehnung von 6 cm in Chloräthylrausch. Nach Durchtrennung der schwartigen Pleura liegt eine faustgroße Höhle mit bröckeligem Eiter vor. Die Mündung des Bronchus wird isoliert, eingestülpt und übernäht. Ein Hautlappen wird in die Höhle eingelegt und durch Situationsnähte festgehalten.

Am 30. 12. ist die Wundhöhle kleiner geworden, die Sekretion mäßig. Puls und Temp. sind normal; Gewicht beträgt 7,5 kg.

Am 3. 2. wird eine Cystitis nachgewiesen; das Kind erhält drei Mal täglich Acidolamin; doch das Kind erholt sich weiter, das Gewicht ist am 9. 3. sogar auf 9,2 kg gestiegen. Der Urin ist wieder klar. Dazu wird Höhensonne gegeben.

Am 28. 3. besteht noch aus der Fistel eine leichte Sekretion, doch ist der Allgemeinzustand so gut, daß das Kind entlassen wird.

Fall 10. (Chir. Klin.) J.-Nr. 5448/1921.

Im Januar 1921 erkrankte das 18 Monate alte Kind (männl.) an Mafern und blieb seitdem dauernd krank. Am 1. 4. 21 wird das Kind mit einem postpneumonischen Pleuraempyem links von der Kinderklinik zur Chirurgischen Klinik verlegt, in sehr schlechtem Allgemein- und Kräftezustand.

Das Abdomen ist aufgetrieben; es finden sich Epiphysenverdickungen, Caput quadratum und Rosenkranzbildung. Über der Lunge besteht links im Bereich des 4. und 5. Interkostalraumes Dämpfung, wo hier in der Kinderklinik punktiert wurde und 5 ccm grünlich dicken Eiter ergab, in dem Pneumokokken nachweisbar waren. Leider nahm der Vater das Kind aus der Klinik fort.

Fall 11. (Chir. Klin.) J.-Nr. 1322/1929.

Mit 10 Monaten erkrankte das jetzt 18 Monate alte Kind (weibl.) an Keuchhusten; vor 5 Wochen an einer Lungenentzündung links, die in

8 Tagen abklang; jedoch nach 4 Tagen trat erneut Fieber, Kurzatmigkeit, Appetitlosigkeit auf. Eine vorgenommene Punktion in der Kinderklinik ergab Eiter, worauf das Kind am 12. 8. 29 in die Chir. Klinik gelegt wurde mit einem postpneumonischen Pleuraempyem links. Der Allgemeinzustand war sehr schlecht, starke Dyspnoe und beschleunigte oberflächliche Atmung, expiratorischer Stridor; Temp. 37°, Puls 140.

Klinisch findet sich über der Lunge links hinten unten Dämpfung und abgeschwächtes Atemgeräusch; röntgenologisch deutlich Erguß mit Spiegelbildung.

Am 13. 8. wird die Resektion der 7. Rippe in einer Ausdehnung von 3 cm in der hinteren Axillarlinie in Äthernarkose vorgenommen und die Saugdrainage angeschlossen. Im Eiter werden kulturell Pneumokokken nachgewiesen. Am 15. 8. ist das Allgemeinbefinden bereits gebessert; die Temp. ist normal, ebenso der Puls. Am 29. 8. wird die Aspirationsdrainage entfernt, da das Befinden weiter gut bleibt und die Sekretion nur noch gering ist. Am 10. 9. ist die Wunde fest verschlossen und das Kind wird in gutem Allgemeinbefinden am 12. 9. entlassen.

Fall 12. (Chir. Klin.) J.-Nr. 2131/1929.

Mit 18 Monaten erkrankte das jetzt 2 Jahre alte Kind (männl.) an Keuchhusten. Anschließend im April 1929 an einer Lungenentzündung links und folgendem Pleuraempyem, das auswärtig durch Rippenresektion behandelt wurde. Am 1. 8. brach die angeblich geschlossene Wunde wieder durch und es entleert sich jetzt Eiter. Das Kind wird von der Kinderklinik in die Chir. Klinik (10. 8. 29) verlegt in mäßigem Kräftezustand; Temp. 37,6°, Puls 120.

Klinisch findet sich über dem Mittelfeld der Lunge links Dämpfung und abgeschwächtes Atmen; in Höhe der 5. Rippe in hinterer Axillarlinie eine 10 cm tiefe Fistel (Sonde).

Röntgenologisch: Partieller Pneumothorax links nach Rippenresektion; mäßiger Hochstand und Fixation des Zwerchfells links; Verdichtung des Lungenrandes.

Vor Behandlung der veralteten Empyemhöhle nimmt der Vater das Kind aus der Klinik fort.

Fall 13. (Chir. Klin.) J.-Nr. 1221/1926.

Das jetzt zwei Jahre alte Kind (weibl.) erkrankte Ende November 1925 an einer Lungenentzündung links, die nach 14 Tagen abklang. Da aber der Husten blieb und starke Abmagerung auftrat, wurde das Kind in die Kinderklinik aufgenommen, wo eine Punktion dort grüngelben Eiter ergab. Darauf wurde das Kind am 15. 2. 26 in die Chir. Klinik verlegt mit einer linksseitigen veralteten postpneumonischen Empyemhöhle. Der allgemeine Kräfte- und Ernährungszustand des Kindes war mäßig; es finden sich Epiphysenaufreibungen, rachitischer Rosenkranz

und Caput quadratum. Die linke Schulter steht tiefer; Atemexkursionen der linken Thoraxhälfte sind kaum vorhanden. Zwischen Mamillar- und Axillarlinie besteht in Höhe der 7. Rippe eine ca. pflaumengroße, fluktuierende Geschwulst. Über der Lunge links findet sich eine in Höhe der 5. Rippe von der Mitte der Scapula abwärts nach vorn und medialwärts ziehende Dämpfung, über der das Atemgeräusch stark abgeschwächt ist.

Röntgenologisch besteht hier eine starke bis an das Zwerchfell ziehende Verschattung; der linke Lungenunterlappen ist infiltriert; das Herz nach rechts stark verdrängt.

Die Punktion ergibt grünlich-gelben Eiter, der kulturell steril ist.

Am 19. 2. wird in Äthernarkose die 9. Rippe in einer Ausdehnung von 4 cm reseziert; die schwartig verdickte Pleura wird durchschnitten; in die Empyemhöhle wird ein Gummidrain und Jodoformgazetampons eingelegt. Am 5. 3. wird das Drain entfernt und das Kind am 3. 4. in gutem Allgemeinzustand und normalem Lungenbefund mit fast verschlossener Fistel und geringer Sekretion entlassen.

Fall 14. (Chir. Klin.) J.-Nr. 3057/1931.

Das 18 Monate alte Kind (männl.) wurde am 27. 2. 30 wegen eines beiderseitigen Halsdrüsenabszesses in die Ohrenklinik eingeliefert. Kurz darauf trat eine akute Otitis media rechts auf; es wurde eine Antrotomie gemacht, die bei Einweisung des Kindes in die Chir. Klinik am 7. 5. 30 mit Pleuraempyem rechts noch nicht ganz verheilt ist. Das Kind hustet seit 14 Tagen mit Temperatursteigerung.

Eine Punktion rechts ergab Eiter, in dem kulturell hämolyisierende Streptokokken nachweisbar waren. Der Allgemeinzustand des Kindes ist schlecht, atrophisch, cyanotisch. Die Lunge rechts bleibt beim Atmen zurück und es findet sich eine nach unten zunehmende Dämpfung mit Abschwächung des Stimmfremitus und des Atemgeräusches.

Röntgenologisch ist die ganze rechte Thoraxhälfte verschattet (Erguß); das Herz ist nicht verdrängt.

Am 16. 5. zeigt das Unterfeld eine noch stärkere Verschattung, die sich mit einer nach lateral ansteigenden Kurve abgrenzt; Cor und Mediastinum scheinen leicht nach links verdrängt.

Mehrfache Punktionen ergeben Eiter. Die Temperatur ist teils remittierend, teils intermittierend. Am 31. 5. wird die Aspirationsdrainage nach Bülow angelegt im 8. Interkostalraum, wodurch sich reichlich Eiter entleert. Das Allgemeinbefinden hebt sich. Die Temp. ist normal. Am 7. 7. wird die Saugdrainage entfernt und Rivanolspülungen (10 ccm) vorgenommen, die am 28. 7. abgesetzt werden; nur noch einfache Drainage. Das Hämoglobin ist auf 30% gesunken; Leukozyten 12 600.

Eine röntgenologische Nachuntersuchung vom 1. 8. zeigt noch Verschattung der rechten Thoraxhälfte, große randständige Höhle; die fast luftleere Lunge ist gegen das Mediastinum hin zurückgewichen, an ihrer

Spitze adhärent. Das Herz ist nicht verlagert; das Zwerchfell kaum beweglich.

Da die Sekretion nur noch gering ist, die Temp. normal bleibt, wird das Kind zur Kinderklinik verlegt.

Am 25. 10. erfolgt Wiederaufnahme des Kindes in die Chir. Klinik, da sich aus der Thorafistel Eiter entleert. Temp. beträgt $37,2^{\circ}$; Puls 100, Gew. 9,8 kg.

Röntgenologisch ist die rechte Thoraxseite noch verschattet; kein sicherer Anhalt für Erguß.

Am 16. 11. wird eine Jodipinfüllung der Fistel vorgenommen, die einen 8 cm langen und 3 cm breiten Hohlraum ergibt, der an der Vorderseite der rechten Lunge entlangläuft. Da das Kind gleichzeitig Jodipin aushustet, besteht der Verdacht einer Bronchialfistel.

Am 22. 11. wird eine Resektion der 9.—11. Rippe in 7 cm Ausdehnung in Äthernarkose vorgenommen und man findet eine flache, an der Thoraxwand nach vorn zu verlaufende Empyemhöhle; die viscerale Pleura ist in ein derbes Schwielengewebe umgewandelt; eine Bronchialfistel läßt sich nicht nachweisen. Ein Hautlappen wird an die Pleura angelegt und ein Drainrohr eingeführt. Das Kind erholt sich auch nach der Thorakoplastik nicht recht; der Allgemeinzustand bleibt schlecht. Temp. schwankt zwischen $36,5$ und $37,8^{\circ}$, Puls 100. Pirquet ist negativ. Die Eitersekretion ist häufig reichlich. Am 11. 1. 31 bekommt das Kind die Varizellen, die am 20. 1. wieder abgeklungen sind. Da keine Besserung des Zustandes eintritt, die Fistel noch weiterhin stark sezerniert, die Temp. intermittierend bleibt, schreitet man am 14. 2. zu einer ausgiebigeren Rippenresektion in Äthernarkose, wobei die Rippen über der nach vorn gehenden Resthöhle bis zum Sternum und die Reste der bereits früher resezierten Rippen entfernt werden. Eine Bronchialfistel ist nicht nachweisbar. Die Wundränder werden mobilisiert und in die Höhle eingefast; Verschuß durch Naht und Einlegen eines Drainrohres. Leider erlag das Kind eine Stunde post operationem.

Die Sektion ergibt eine schwere chronische adhäsive Pleuritis mit dicken Schwarten (1 cm dick); sackförmige und zylindrische Bronchiektasien mit eitrig gestautem Inhalt in der ganzen rechten Lunge und umschriebene chronische pneumonische Herde. Milzschwellung, starke Anämie und Verfettung der Leber und Nieren; Dilatation des re. Ventrikels cordis. Dazu ergibt die Sektion einen status lymphaticus mit starker Schwellung des lymphatischen Rachenringes, der Lymphknötchen im Darm, der mesenterialen, trachealen, trachobronchialen, peripankreatischen und perigastrischen Lymphknoten.

Fall 15. (Chir. Klin.) J.-Nr. 1403/1932.

Am 20. 4. 32 erkrankte das zwei Jahre alte Kind (weibl.) an einer rechtsseitigen Oberlappenpneumonie, die am 28. 4. abgeklungen war. Da-

nach trat erneut Fieber und Dämpfung über der Lunge rechts auf; eine Punktion ergab 80 ccm dünnen Eiters, worauf das Kind am 3. 5. mit Pleuraempyem rechts in die Chir. Klinik eingewiesen wurde. Es war leicht dyspnoisch und cyanotisch, jedoch in gutem Ernährungszustand. Die rechte Thoraxseite blieb beim Atmen zurück und erschien eingesunken. Über der ganzen Lunge war Schalldämpfung vorhanden, das Atemgeräusch abgeschwächt, stellenweise aber bronchial. Die Temp. war 38,4°, Puls 140.

Röntgenologisch fand sich eine Verschattung der ganzen rechten Seite mit zwar noch erkennbarer Lungenzeichnung; Zwerchfell kaum beweglich; keine Herzverdrängung; kein Pneumothorax. Da die Dämpfung aber zunahm und eine nochmalige Punktion 140 ccm dicken, rahmigen, grünlichen Eiters ergibt, in dem Pneumokokken bakteriologisch nachweisbar sind, das Fieber remittierend bleibt um 38 und 38,6°, wird am 17. 5. ein Drachterstachel mit Aspirationsdrainage mittels Wasserstrahlpumpe angelegt. Am 28. 5. wird die Aspirationsdrainage abgesetzt und am 31. 5. auch der Drachterstachel entfernt; Temp. und Puls sind zur Norm zurückgekehrt. — Röntgenologisch ist am 4. 6. die Verschattung bis auf die Hilusgegend zurückgegangen und das Zwerchfell ist beweglich. Am 21. 6. wird das Kind, nachdem der Allgemeinzustand durch sommerliche Intoxikation etwas beeinträchtigt war, mit normalem Lungenbefund in gutem Aussehen geheilt entlassen.

Fall 16. (Chir. Klin.) J.-Nr. 5934/1933.

Das 2 Jahre alte Kind (männl.) erkrankte am 19. 7. 33 an einer Lungenentzündung rechts. Danach trat ein Pleuraempyem rechts auf, so daß das Kind aus der Kinderklinik in die Chir. Klinik verlegt wird (4. 8.).

Temp. beträgt 39°, Puls 144. Der Kräftezustand des Kindes ist gut. Eine Probepunktion ergibt dickflüssigen Eiter, in dem bakteriologisch Pneumokokken nachweisbar sind.

Röntgenologisch ist die ganze rechte Seite verschattet; das Herz leicht nach links verdrängt.

Klinisch findet sich über der ganzen rechten Lunge intensive Dämpfung. Nach mehrfachen Punktionen und bei Bestehenbleiben der intermittierenden Temperatur wird am 27. 8. der Drachterstachel mit anschließender Aspirationsdrainage eingelegt.

Am 5. 9. kann dieser entfernt werden, da kaum noch Eiter abfließt und Temp. und Puls normal sind.

Am 21. 9. wird das Kind mit völlig geschlossener Wunde in gutem Allgemeinzustand entlassen; röntgenologisch ist die Verschattung nur noch sehr gering, das Zwerchfell ist gut beweglich.

Fall 17. (Joh.-Hosp.) J.-Nr. 412/1929.

Das 2 Jahre alte Kind (männl.) erkrankte vor einiger Zeit an einer Bronchopneumonie, die normal abklang. Dann trat eine Nephritis und

Cystitis auf. Am 6. 2. 29 zeigte sich eine entzündliche Vorbuckelung im Bereich der linken Mamille. Am 7. 2. kommt das Kind in sehr schlechtem Allgemeinzustand und moribund zur Aufnahme, mit einem Pleuraempyem links.

Die Punktion ergibt 300 ccm Eiter; unter starker Dyspnoe tritt danach der Exitus ein.

Fall 18. (Joh.-Hosp.) J.-Nr. 595/1930.

Das 2½ Jahre alte Kind (weibl.) erkrankte am 9. 3. 30 an einer Lungenentzündung. Da das Befinden des Kindes sich nicht besserte und das Fieber remittierend blieb, wurde es mit einem Pleuraempyem rechts aufgenommen (18. 3.).

Die Temp. schwankt zwischen 38 und 39°; es besteht eine starke Dyspnoe mit Nasenflügelatmen; bei der Atmung bleibt die rechte Schulter zurück; die Interkostalräume sind verstrichen. Über der ganzen rechten Lunge findet sich eine intensive Dämpfung und abgeschwächtes Atmen, das nach unten zu noch leicht bronchial ist. Die Lunge links zeigt normalen Befund außer einem kleinen dreieckigen Bezirk links hinten unten neben der Wirbelsäule (Rauchfuß-Grocco'sches Dreieck). Das Herz ist nach links verdrängt. Eine sogleich am 18. 3. ausgeführte Punktion ergibt 120 ccm stark getrübbes Exsudat. Nach mehrfachen Punktionen von 50—190 ccm anfangs sehr trüben, später aber schon rein eitrigem Exsudat, in dem Pneumokokken in Reinkultur nachgewiesen werden, die keine Besserung bringen und die Temperatur intermittierend bleibt, wird am 29. 3. die 8. Rippe in hinterer Axillarlinie reseziert, worauf sich 500 ccm dickflüssigen Eiters mit reichlich Fibrin entleert; es wird ein Drain und Tampon eingelegt und die Wunde durch zwei Nähte geschlossen. In den folgenden Tagen fließt der Eiter gut ab, Temp. kehrt zur Norm zurück. Am 25. 4. wird der Drain entfernt, da kaum noch Eiter abfließt. Am 21. 5. wird das Kind in gutem Allgemeinzustand mit völlig geschlossener Wunde geheilt entlassen.

Fall 19. (Chir. Klin.) J.-Nr. 8491/1921.

Das 2½ Jahre alte Kind (männl.) erkrankte vor 3 Wochen an einer Lungenentzündung. Danach stieg aber die Temp. wieder auf 40°, so daß das Kind in die Chir. Klinik mit Pleuraempyem links eingewiesen wurde (29. 8. 21).

Der Kräftezustand ist mäßig; die linke Thoraxseite bleibt beim Atmen zurück. Über der Lunge links findet sich vom 6. Brustwirbel abwärts bis zur mittleren Axillarlinie hin Dämpfung mit aufgehobenem Stimmfremitus und Atemgeräusch. Die Punktion ergibt dicken, rahmigen Eiter, der im Ausstrich Diplokokken aufweist. Am 30. 8. 21 wird die 8. Rippe in Ausdehnung von 2 cm reseziert, die Pleura inzidiert und 150 ccm gelben, rahmigen Eiters abgelassen; ein Gummidrain wird eingelegt. Nach reichlicher Eitersekretion läßt diese am 8. 10. völlig nach

und die Temperatur ist normal. Am 18. 10. ist die Wunde fast völlig geschlossen und das Kind wird von seinem Vater aus der Klinik fortgenommen.

Fall 20. (Chir. Klin.) J.-Nr. 1908/1933.

Das 2½ Jahre alte Kind (männl.) erkrankte vor drei Wochen an einer Lungenentzündung; vor 8 Tagen trat diese beiderseitig auf. Da das Fieber nicht abfiel, wurde in der Kinderklinik im 5. Interkostalraum links (hintere Axillarlinie) zweimal punktiert und je 5 ccm Eiter entleert, worauf das Kind am 10. 4. 33 zur Beobachtung in die Chir. Klinik verlegt wurde, mit Verdacht auf ein Pleuraempyem links.

Der Kräftezustand und das Allgemeinbefinden des Kindes ist gut. Die Temp. beträgt 37,2°; Puls 100. Über der Lunge findet sich lediglich hinten unten leichter gedämpfter Klopfchall. Röntgenologisch ist kein Spiegel erkennbar. Da die Temp. weiterhin normal bleibt und auch röntgenologisch am 19. 4. kein Erguß und keine Infiltration sich nachweisen lassen, wird es am gleichen Tage entlassen, nachdem offenbar das Empyem von selbst ausgeheilt ist.

Fall 21. (Chir. Klin.) J.-Nr. 4243/1934.

Am 28. 5. 34 erkrankte das 2½ Jahre alte Kind (weibl.) unter hohem Fieber und Husten offenbar an einer Lungenentzündung. Da der Allgemeinzustand des Kindes sich später nicht besserte, wurde durch mehrfache Punktionen am unteren Pleurarand links Eiter entleert. Am 18. 8. 34 wurde das Kind dann mit Pleuraempyem aus der Kinderklinik in die Chir. Klinik verlegt.

Der Kräftezustand ist sehr mäßig, die Temp. beträgt 37,6°, Puls 120. Eine Punktion ergibt dickrahmigen Eiter, in dem bakteriologisch Pneumokokken nachweisbar sind. (Ein Lungenbefund ist im Krankenblatt nicht angegeben!) Es wurde der Drachterstachel eingelegt und eine Aspirationsdrainage angeschlossen. Am 20. 8. ist eine Eitersekretion nicht mehr vorhanden; die Temp. fast normal und das Kind wird am 25. 8. in die Kinderklinik zurückverlegt.

Da aber am 1. 9. ein erneuter Fieberanstieg auf 38° auftritt und röntgenologisch eine intensive Verschattung der ganzen linken Seite sich zeigt, wird das Kind am 6. 9. wieder in die Chir. Klinik aufgenommen.

Klinisch findet sich über der ganzen linken Lunge starke Dämpfung; röntgenologisch diffuse Verschattung, Unbeweglichkeit des Zwerchfells links und starke Herzverdrängung nach rechts. Die Temperatur ist intermittierend zwischen 37 und 38,2°. Am 10. 9. wird im Ätherrausch die alte Wunde durchtrennt, ein Gummidrain eingeführt und die Aspirationsdrainage mittels Wasserstrahlpumpe angelegt, worauf sich reichlich Eiter entleert. Die Temp. kehrt schon am 12. 9. zur Norm zurück; das Allgemeinbefinden bessert sich. Am 3. 10. ist die Verschattung röntgenolo-

gisch sehr gering geworden; die Sekretion nur noch blutig serös; das Allgemeinbefinden gut.

Wegen Verdacht auf Scharlach wird das Kind am 5. 10. in die Kinderklinik zurücksverlegt.

3—14 Jahre.

Fall 22. (Joh.-Hosp.) J.-Nr. 356/1925.

Vor 14 Tagen erkrankte das 3 Jahre alte Kind (weibl.) an einer Lungenentzündung. Da das Kind elend und fieberhaft blieb, wurde es am 14. 3. 25 aufgenommen mit einem Pleuraempyem links. Der Kräftezustand ist mäßig; klinisch findet sich über der ganzen linken Lunge hinten intensive Dämpfung mit aufgehobenem Atemgeräusch. Temp. 39°. Die Probepunktion ergibt reichlich gelben Eiter, worauf mit einem Troikart weiter Eiter abgelassen wird; im Ausstrich sind Pneumokokken nachweisbar. Da das Fieber nicht abklingt und erneute Probepunktion am 20. 3. Eiter ergibt, wird am 25. 3. die 8. Rippe in hinterer Axillarlinie in 4 cm Ausdehnung reseziert, worauf sich große Mengen Eiters mit dickem Fibringerinnfel entleeren. Es wird ein Drain eingelegt. Am 1. 4. ist die Sekretion nur noch gering, die Temp. abgefallen. Am 8. 4. wird das Drain entfernt, die Temp. ist normal. Mit völlig geheilter Wunde wird das Kind am 19. 4. entlassen.

Fall 23. (Joh. Hosp.) J.-Nr. 1116/1927.

Vor sieben Wochen erkrankte das drei Jahre alte Kind (männl.) an Masern, nach acht Tagen an einer Lungenentzündung links. Da das Fieber nicht abklang, wurde vor drei Wochen erstmalig eine Punktion vorgenommen, die 30 ccm Eiter ergab. Nach acht Tagen wiederum Punktion von 30 ccm Eiter. Das Allgemeinbefinden verschlechterte sich weiter, die Temp. blieb hoch, so daß das Kind am 19. 8. aufgenommen wurde mit Pleuraempyem links.

Der Kräftezustand ist mäßig, Haut und Gesichtsfarbe blaß; Temp. beträgt 38,9°. Über der Lunge links findet sich von der 3. Rippe abwärts hinten Dämpfung, aufgehobenes Atemgeräusch und Stimmfremitus. Es wird fogleich die Resektion der 4. und 5. Rippe in 2 cm Ausdehnung in Äthernarkose vorgenommen; aus der großen Empyemhöhle entleert sich reichlich dickflüssiger Eiter. Es wird ein Gummidrain eingelegt, die Wunde vernäht und durch Ventilverband verschlossen, worüber nochmal Mullzellstoffverband gelegt wird.

Am 20. 8. ist die Temp. bereits zur Norm herabgefunken; die Eiterentleerung nur noch mäßig; die Lunge wird durch aktive Lungengymnastik mittels Aufblasen von Spielsachen zur Wiederentfaltung angeregt. Am 11. 9. wird der Drain entfernt; das Allgemeinbefinden hat sich weitgehend gebessert; das Kind steht auf. Am 18. 9. wird es geheilt entlassen.

Fall 24. (Chir. Klin.) J.-Nr. 674/1932.

Vor vier Wochen erkrankte das drei Jahr alte Kind (männl.) an einer Lungenentzündung, die normal abklang. Jedoch erholte sich das Kind in der Folgezeit nicht recht und der einweisende Arzt nahm am 2. 4. eine Punktion vor, die Eiter ergab, worauf das Kind am 3. 4. 32 zur Aufnahme in die Klinik kam mit Pleuraempyem rechts.

Der Kräftezustand ist ausreichend; Schleimhäute sind blaß; Temp. 37,2°, Puls 120; Leukozyten 19 250. Am Thorax findet sich ein leicht ausgebildeter Rosenkranz; die Brustwirbelsäule zeigt eine leichte Skoliose. Klinisch findet sich über der Lunge rechts Dämpfung und abge schwächtes Atemgeräusch.

Röntgenologisch zeigt sich eine intensive Verschattung der unteren zwei Drittel der rechten Lunge, mit Erguß; Zwerchfell nicht abgrenzbar. Während die Temp. auf 37,4° stehen bleibt, steigen die Leukozyten am 7. 4. auf 34 800 an. Eine am gleichen Tage erfolgte Punktion im 8. Interkostalraum ergibt stark eingedickten Eiter, in dem sich Pneumokokken nachweisen lassen. Die Leukozyten sinken allmählich von 30 000 am 11. 4. auf 21 000 am 22. 4., an dem nochmals 70 ccm grünen zähflüssigen Eiters durch Punktion entleert werden. Die Temp. bleibt normal. Am 6. 5. hat sich auch der Allgemeinzustand gebessert, die Atmung ist frei.

Röntgenologisch ist die Lunge nur noch teilweise durch Schwartenbildung offenbar verschattet; das Zwerchfell steht wieder hoch. Am 14. 5. wird das Kind, da das Empyem völlig aufgesaugt ist und die Lunge normalen Befund zeigt, in gutem Allgemeinbefinden entlassen.

Fall 25. (Chir. Klin.) J.-Nr. 1250/1934.

Das drei Jahre alte Kind (männl.) erkrankte Anfang März an einer Lungenentzündung, die nach 12 Tagen vorüber war. Das Kind war fieberfrei. Am 19. 3. trat erneuter Fieberanstieg auf und das Kind wurde, da sich der Zustand nicht besserte, in die Kinderklinik eingewiesen, wo mehrfache Punktionen vorgenommen wurden; in dem Eiter waren Pneumokokken nachweisbar.

Am 19. 4. wurde das Kind in die Chir. Klinik verlegt. Es befindet sich in mäßigem Kräftezustand. Die Temp. beträgt 37,8°, Puls 120. Die rechte Thoraxseite bleibt bei der Atmung zurück. Über der rechten Lunge findet sich von der 4. Rippe abwärts, begrenzt von der vorderen und hinteren Axillarlinie, Dämpfung und abge schwächtes Atemgeräusch. Röntgenologisch findet sich Verschattung, Pneumothorax und Verlagerung des Herzens nach links. Am 20. 4. wird in Lokalanästhesie der Drachterstachel eingeführt und die Aspirationsdrainage mittels Saugflasche angelegt, worauf der Eiter reichlich abfließt. Der Allgemeinzustand bessert sich, die Temp. bleibt normal, die Sekretion ist gering. Am 16. 5. wird die Saugflasche und Drain entfernt, und das Kind angehalten, gegen Widerstand zu blasen.

Röntgenologisch zeigt sich nur noch rechts unten leichte Verschattung (Scharte); das Zwerchfell ist beweglich. Am 22. 5. ist die Wunde bereits verschlossen und am 6. 6. wird das Kind völlig beschwerdefrei entlassen. Fall 26. (Chir. Klin.) J.-Nr. 1638/1932.

Das drei Jahre alte Kind (männlich) erkrankte vor drei Wochen an einer Bronchopneumonie, die sich nicht besserte, worauf das Kind in die Kinderklinik eingewiesen wurde und mit Verdacht auf ein interlobäres Empyem rechts nach Punktion von 10 ccm dicken, rahmigen Eiters am 16. 5. zur Chir. Klinik verlegt wurde.

Das Kind befindet sich in schlechtem Allgemeinzustand, ist kurzatmig, leicht cyanotisch; Temp. 38°, Puls 120, Leukozyten 20 000. Die rechte Thoraxseite schleppt beim Atmen nach. Über der Lunge rechts findet sich besonders vorn und hinten Dämpfung und lautes Bronchialatmen; röntgenologisch zeigt sich eine dicke Verschattung der ganzen rechten Thoraxseite. Eine am 20. 5. vorgenommene Punktion ergibt keinen Eiter; das blutig-seröse Punktat ist steril. Die Temp. bleibt intermittierend (zwischen 38. und 39°). Am 23. 5. wird vorn oben und hinten oben im Bereich des 6. Interkostalraumes die Dämpfung dichter; auch zeigt das Kind dort starkes Kompressionsatmen. Röntgenologisch zeigt sich wie oben nichts weiter Besonderes außer einer Herzverdrängung links. Eine Punktion im Bereich der vorderen Axillarlinie in Höhe der 5. Rippe ergibt dicken Eiter, in dem sich bakteriologisch Pneumokokken nachweisen lassen. Am 24. 5. wird in Solaeßthinrausch nach einem Hautschnitt parallel der 5. Rippe diese in einer Ausdehnung von 2 cm reseziert; es findet sich ein wandständig gewordenes interlobäres Empyem. Es werden 150 ccm Eiter entleert und ein Gummidrain eingeführt. Am 26. 5. fällt die Temperatur zur Norm ab. Am 31. 5. fließt noch reichlich dünnes Sekret ab; die Temperatur bleibt weiterhin normal, die Leukozyten sind auf 7600 gefallen. Am 3. 6. kann der Drain entfernt werden. Röntgenologisch zeigt sich am 11. 6. ein starker Rückgang der Verschattung; das Zwerchfell ist gut beweglich. Die Sekretion hat aufgehört. Am 25. 6. wird das Kind nach einer harmlosen Enteritis mit fest vernarbter Wunde in gutem Allgemeinbefinden und normalem Lungenbefund entlassen. Fall 27. (Chir. Klin.) J.-Nr. 3154/1926.

Das 3 Jahre alte Kind (weibl.) erkrankte Anfang März 1926 angeblich an einer Grippe, Mitte März an Masern und wurde in die Kinderklinik eingeliefert. Da der Allgemeinzustand sich im Laufe der Zeit nicht besserte, das Gewicht weiterhin abnahm und die Temperatur auf 38 und 39° blieb, wurde es am 3. 5. 26 in die Chir. Klinik verlegt mit einem Pleuraempyem rechts. Der Kräftezustand ist mäßig. Es besteht Cyanose, Nasenflügelatmen und leichte Rachitis. Die Atmung ist beschleunigt und angestrengt, die rechte Thoraxseite schleppt nach. Über der Lunge rechts findet sich eine handbreite Dämpfung, hinten zwischen 3. und 7. Rippe mit abgeschwäch-

tem Atemgeräusch, vorne Kompressionsatmen. Eine Punktion im 7. Interkostalraum ergibt dünnflüssigen Eiter, der kulturell steril ist.

Am 6. 5. wird die 8. Rippe in 3 cm Ausdehnung in Äthernarkose refeziert und nach Inzision der Pleura fließt reichlich dünnflüssiger Eiter ab; es wird ein Gummidrain eingelegt. Die Temperatur bleibt in der Folgezeit intermittierend zwischen 37 und 39°. Am 18. 5. wird aus der Empyemhöhle mäßig Fibrin und Eiter entfernt.

Röntgenologisch findet sich am 23. 5. unterhalb der Refektionsstelle eine apfelgroße Verschattung, die in den Leberschatten übergeht. Gleichzeitig tritt eine serofibrinöse Pleuritis links hinten auf. Die Temp. beträgt 39°, Puls 160—180 (26. 5.). Dazu tritt eine starke Cyanose, der Puls ist leicht unterdrückbar. Am 27. 6. tritt unter dem Zeichen der Herzschwäche der Exitus ein.

Die Sektion ergibt eine Karnifikation des ganzen rechten Unterlappens; Obliteration des rechten Pleuraraumes. Serofibrinöse Pleuritis links mit Kompressionsatelektasen der linken Lunge. Thrombose des rechten Herzohres und wandständige Thromben in den Trabekeln des rechten Ventrikels.

Fall 28. (Chir. Klin.) J.-Nr. 2249/1930.

Das drei Jahre alte Kind (männl.) erkrankte vor vier Wochen an grippöser Lungenentzündung und wurde, da sich der Zustand nicht besserte, das Fieber hoch blieb, am 31. 3. in die Chir. Klinik mit einem Pleuraempyem rechts eingeliefert. Die Temperatur beträgt 38,5°, Puls 140, Leukozyten 31 800. Über der Lunge rechts findet sich eine massive Dämpfung mit abgeschwächtem Atemgeräusch.

Röntgenologisch zeigt sich eine Verschattung der unteren rechten Lunge; das Zwerchfell steht hoch und ist kaum beweglich.

Eine Punktion ergibt rahmigen gelben Eiter, in dem Pneumokokken nachweisbar sind. Am 1. 4. wurde die 9. Rippe refeziert und ein Drain eingelegt; aus der großen Empyemhöhle entleert sich dabei reichlich Eiter mit Fibrin. Temperatur und Puls sinken in den nächsten Tagen zur Norm ab.

Am 16. 4. ist die Sekretion nur mäßig; röntgenologisch ist die Höhle nur noch klein, die kollabierte Lunge bereits wieder entfaltet. Am 22. 4. wird der Drain entfernt. Am 30. 4. ist die Wunde bereits geschlossen. Das Kind wird am 30. 5. in gutem Allgemeinbefinden entlassen.

Fall 29. (Chir. Klin.) J.-Nr. 3717/1931.

Vor 14 Tagen erkrankte das 3½ Jahre alte Kind (männl.) an einer Pneumonie rechts und wurde, da keine Besserung eintrat, mit Pleuraempyem rechts von der Kinderklinik, wo eine Probepunktion 30 ccm dickflüssigen Eiter ergab, zur Chir. Klinik am 17. 8. 31 verlegt.

Der Kräftezustand ist mäßig, Temp. 37,8°, Puls 104. Über der rechten Lunge findet sich hinten von der Mitte abwärts und seitlich Dämpfung mit abgeschwächtem Atemgeräusch.

Röntgenologisch war die ganze rechte Lunge, besonders im Unterfeld verschattet; im rechten Oberfeld finden sich mehrere erbsen- bis haselnußgroße scharf begrenzte und von dünnen Gewebsverdichtungen umgebene Höhlen, die den Eindruck isolierter Empyemhöhlen machen. Durch Punktion am 18. 8. werden einige wenige ccm eitrige Flüssigkeit entleert, in der bakteriolog. Pneumokokken nachweisbar sind. Die Temperatur bleibt normal. Das Allgemeinbefinden bessert sich und das Pleuraempyem heilte offenbar von selbst aus. Da am 25. 8. eine Enteritis (Bac. Gärtner) auftrat, wurde das Kind in das Johannis-Hospital verlegt, aus dem es in gutem Allgemeinbefinden am 15. 10. entlassen wurde.

Fall 30. (Chir. Klin.) J.-Nr. 2465/1924.

Das vier Jahre alte Kind (männl.) erkrankte vor vier Wochen an einer Lungenentzündung. Vor 14 Tagen trat erneut eine Pleuritis auf; eine Probepunktion am 28. 4. ergab nur blutig-seröses Exsudat. Am 2. 5. bildete sich im Bereich der rechten Mamille eine entzündliche Schwellung mit Fluktuation aus und das Kind kam am 3. 5. 24 mit einem Pleuraempyem rechts zur Aufnahme in die Chir. Klinik. Der Ernährungs- und Kräftezustand des Kindes sind mäßig, die Schleimhäute schlecht durchblutet.

Über der Lunge rechts findet sich eine hinten von der Spina scapulae und vorne von der 3. Rippe bogenförmig nach hinten abwärts bis zur 10. Rippe begrenzte Dämpfung mit aufgehobenem Stimmfremitus und Atemgeräusch. Die Temperatur ist 38,2°, Puls 140. Durch Punktion werden ca. 50 ccm grünen, dünnflüssigen Eiters entleert, in dem sich bakteriologisch Staphylokokken nachweisen lassen. Durch Rippenrefektion in 2 cm Ausdehnung unterhalb der Scapula wird die sich weit nach vorn hin erstreckende Empyemhöhle in Äthernarkose am 6. 5. eröffnet, wobei sich reichlich Eiter entleert und ein Drain wird eingelegt. Die Temperatur sinkt auf 36°, die Eitersekretion ist stark. Am 8. 5. tritt eine Otitis media acuta auf und am 12. 5. hat sich am vorderen unteren Wundwinkel in der hinteren Axillarlinie ein intramuskulärer Abszeß ausgebildet der inzidiert wird. Am 16. 5. wird der Drain aus der nur wenig absondernden Empyemhöhle entfernt. Am 20. 5. sind die Wunden fast verschlossen, die Lunge zeigt normalen Befund. Das Kind wird am 24. 5. zur Ohrenklinik verlegt.

Fall 31 (Chir. Klin.) J.-Nr. 19806a/1925—26.

Vor drei Wochen erkrankte das vier Jahre alte Kind (männl.) mit Fieber und Husten. Da das Kind sich nicht erholte und das Fieber auf 39° stehen blieb, punktierte der einweisende Arzt das Kind; das Punktat war Eiter.

Am 23. 12. 25 kam das Kind mit Pleuraempyem rechts zur Aufnahme in noch gutem Kräftezustand; Temp. 39,2°.

Klinisch findet sich über dem rechten Lungenunterlappen Dämpfung, abgeschwächtes Atmen mit teilweise bronchialem Atmen. Eine Punktion im 7. Interkostalraum ergibt 25 ccm dicken gelben Eiter, in dem Staphylokokken kulturell nachweisbar sind. Danach erholt sich das Kind gut und wird fieberfrei; am 8. 1. wird es mit normalem Lungenbefund entlassen.

Fall 32. (Joh. Hosp.) J.-Nr. 50/1924.

Vor zehn Tagen erkrankte das vier Jahre alte Kind (männl.) an einer Lungenentzündung; das Fieber ging nicht zurück und eine Probepunktion am 25. 2. ergab Eiter. Am 27. 2. kam das Kind mit einem Pleuraempyem rechts und einer Otitis media purulenta rechts zur Aufnahme in gutem Kräfte-, aber leicht erschöpftem Allgemeinzustand.

Die Temp. betrug 38,8°. Beim Atmen bleibt die rechte Thoraxseite zurück. Über der Lunge rechts findet sich in der Axillarlinie von der Höhe der Scapula abwärtssteigend nach hinten unten Dämpfung mit abgeschwächtem, teilweise auch bronchialem Atmen. Der Herzspitzenstoß ist um anderthalb quersfingerbreit über die Mamillarlinie nach links verdrängt.

Am gleichen Tag der Aufnahme wird noch die Empyemhöhle durch Refektion der 9. Rippe in 3 cm Ausdehnung in hinterer Axillarlinie in Narkose eröffnet und 900 ccm braungrünen Eiters mit Fibrinflocken entleert. In die Empyemhöhle, die durch drei Hautnähte und einen Ventilverband (Guttapercha) geschlossen wird, wird ein Drain eingelegt. Nach reichlichem Eiterabfluß wird am 7. 3. der Drain entfernt; die Temperatur ist noch intermittierend; das Allgemeinbefinden hat sich gebessert.

Am 14. 3. bleibt jedoch die Temp. wieder auf 39,5° stehen; über der Zwerchfellkuppe rechts zeigt sich röntgenologisch ein Flüssigkeitspiegel, Pneumothorax und die Lunge rechts ist kollabiert. Es wird wieder ein Drain eingeführt, der am 18. 3. wieder entfernt werden kann, da die Sekretion nur noch gering geworden ist; die Temp. ist normal. — Am 19. 3. steht das Kind auf und bläst Spielsachen auf. Am 22. 3. wird es in gutem Allgemeinbefinden mit zwar noch ganz geringer Sekretion bei leichter links konvexer Skoliose der Brustwirbelsäule zum Hausarzt entlassen.

Fall 33. (Joh. Hosp.) J.-Nr. 950/1923.

Vor zwei Wochen erkrankte das vier Jahre alte Kind (männl.) wiederum an einer Lungenentzündung. Da der Zustand sich nicht besserte, kam es am 24. 10. zur Aufnahme mit einem Pleuraempyem rechts; dieses wird durch Rippenrefektion behandelt; es entleert sich dünnflüssiger Eiter mit Fibrinflocken.

Am 26. 11. wird das Kind als geheilt entlassen.

Fall 34. (Chir. Klin.) J.-Nr. 3861/1924.

Das 4³/₄ Jahre alte Kind (weibl.) erkrankte an einer Lungenentzündung und wurde am 13. 9. 24 aus der Medizinischen Klinik mit einem postpneumonischen Pleuraempyem rechts zur Chir. Klinik verlegt. Das

Allgemeinbefinden und der Kräftezustand des Kindes ist schlecht. Der Thorax zeigt eine leichte Linksskoliose der Brustwirbelsäule. Über der Lunge findet sich rechts hinten unten Dämpfung mit abgeschwächtem Atmen. Röntgenologisch ist im rechten Herz- und Zwerchfellwinkel eine Verschattung nachweisbar, die nach oben bis zur 3. Rippe ansteigt und nach auswärts über die Mamillarlinie greift. Temp. beträgt 38,1°, Puls 140.

Eine Probepunktion ergibt Eiter, in dem Diplokokken nachweisbar sind. Am Aufnahmetage wird noch die Empyemhöhle in Lokalanästhesie durch interkostale Thorakotomie im 4. Interkostalraum einwärts der Mamillarlinie mittels Troikart eröffnet und ein Gummikatheter eingelegt; die Wunde wird durch zwei Situationsnähte verschlossen. Es entleert sich reichlich dünnflüssiger Eiter. Am 15. 9. sinkt die Temperatur auf 36,6°. Am 8. 10. wird der Drain entfernt; die Sekretion ist nur noch ganz gering, die Wunde fast verschlossen und das Kind wird im guten Allgemeinbefinden in die Medizinische Klinik zurückverlegt.

Fall 35. (Joh.-Hosp.) J.-Nr. 257/1924.

Vor sechs Wochen erkrankte das fünf Jahre alte Kind (weibl.) mit doppelseitiger Lungenentzündung; seit acht Tagen besteht ein Pleuraempyem links. Die Punktion ergab Eiter. Das Kind wird am 28. 3. zur Operation eingewiesen.

Der Kräftezustand des Kindes ist sehr schlecht; es besteht Cyanose und angestrengte oberflächliche Atmung. Über der Lunge links findet sich von der Spina scapulae abwärts massive Dämpfung mit aufgehobenem Stimmfremitus und Atemgeräusch; über der rechten Lunge hinten unten (2 Querfinger breit) Dämpfung mit Bronchialatmen. Die Temp. beträgt 38,9°, Puls 168, der leicht unterdrückbar ist.

Am Aufnahmetage noch wird in Lokalanästhesie die subperioistale Rippenresektion in hinterer Axillarlinie in 2 cm Ausdehnung ausgeführt; aus der Empyemhöhle entleeren sich 300 ccm rahmigen, gelben Eiters, und es wird ein Drain mit Jodoformgazetampon eingelegt. Am 30. 3. hat sich der Allgemeinzustand gebessert; die Temp. beträgt 37,5°, Puls 110 (kräftig); reichliche Sekretion. Am 16. 4. kann der Drain entfernt werden und das Kind wird am 18. 4. mit schon in der Tiefe geschlossener Wunde fieber- und beschwerdefrei zum Hausarzt entlassen.

Fall 36. (Chir. Klin.) J.-Nr. 1759/1927.

Ende Juli klagte das fünf Jahre alte Kind (weibl.) über Schmerzen im Rücken. Am 14. 8. wurde vom Arzt durch Punktion 500 ccm seröse Flüssigkeit abgelassen, in der sich Pneumokokken nachweisen ließen. Am 18. 8. nahm der Arzt eine erneute Punktion vor; das Punktat war fero-fibrinös; er wies das Kind in die Kinderklinik ein, die es am 25. 8. zur Chir. Klinik mit Pleuraempyem rechts verlegte.

Das Allgemeinbefinden des Kindes ist sehr schlecht; Temp. $39,5^{\circ}$, Puls 130. Über der ganzen rechten Lunge findet sich Dämpfung mit aufgehobenem Atemgeräusch. Am 26. 8. wird in Äthernarkose die 10. Rippe in Ausdehnung von 3 cm in hinterer Axillarlinie reseziert und die Pleura durchtrennt, worauf sich massenhaft dünnflüssiger gelber Eiter entleert. In die Empyemhöhle wird ein Drain gelegt. Am 28. 8. ist die Temp. zur Norm gesunken, Puls auf 120 herabgegangen. Am 10. 9. wird das Drain entfernt und das Kind am 20. 9. in gutem Allgemeinbefinden mit geheilter Wunde entlassen.

Fall 37. (Chir. Klin.) J.-Nr. 3074/1930.

Am 2. 4. 30 erkrankte das fünf Jahre alte Kind (männl.) an einer Lungenentzündung. Das Fieber klang aber nicht ab und der Arzt machte am 24. 4. eine Punktion und wies das Kind in die Kinderklinik ein. Dort ergaben die Punktionen nur seröses Exsudat. Da das Fieber noch weiter anstieg und eine Punktion dann 70 ccm Eiter ergab, wurde das Kind am 12. 5. mit Pleuraempyem links in die Chir. Klinik verlegt; Temp. 38° , Puls 128.

Das Kind ist in schlechtem Allgemeinzustand. Über der linken Lunge findet sich Dämpfung mit unten abgeschwächtem Atemgeräusch; oben Tympanie durch Pneumothorax.

Röntgenologisch findet sich über der ganzen linken Lunge Verschattung durch einen Erguß; Verdrängung des Herzens nach rechts; oben Pneumothorax. Am 13. 5. wurde durch Punktion im 8. Interkostalraum 15 ccm Eiter entleert, worauf die Temperatur sank. Da sie am 15. 5. auf 38° wieder anstieg und das Allgemeinbefinden des Kindes sich verschlechterte, wurde ein Troikart eingeführt, durch den aber kein Eiter zu gewinnen war; danach wird ein Drain in die Punktionsstelle eingelegt, aus dem nur einige wenige ccm Eiter abfließen, dann aber nicht mehr. Ab 18. 5. werden Kochsalzspülungen vorgenommen. Die Temp. bleibt jedoch intermittierend zwischen $37,5$ und $38,5^{\circ}$; Puls 120—140. Am 25. 5. wird das Kind bei gleichem Befinden von den Eltern aus der Klinik fortgenommen.

Fall 38. (Chir. Klin.) J.-Nr. 919/1934.

Das fünf Jahre alte Kind (weibl.) erkrankte am 29. 1. an einer Lungenentzündung und wurde am 7. 4. 34 aus der Kinderklinik mit Pleuraempyem links zur Chir. Klinik verlegt. Der Allgemeinzustand ist sehr elend; Temp. 39° , Puls 120.

Klinisch findet sich über der linken unteren Lungenpartie vorn und hinten bis zur Mitte der Scapula reichend Dämpfung mit abgeschwächtem Atemgeräusch.

Röntgenologisch zeigt sich über der ganzen linken Lunge diffuse Verschattung bis zur Mitte der Scapula; ein Flüssigkeitspiegel ist nicht sicher

zu erkennen; das Herz ist leicht nach rechts verdrängt. Da die Punktion unterhalb der Scapula am 11. 4. Eiter ergibt, in dem Pneumokokken nachweisbar sind, wurde der Drachtelstachel mit Aspirationsdrainage eingeführt; es entleert sich reichlich Eiter. Die Temp. kehrt am 24. 4. zur Norm zurück, nachdem sie bis dahin noch intermittierend war; auch fließt kein Eiter mehr ab, so daß am gleichen Tage die Aspirationsdrainage entfernt und ein kleiner Drain eingelegt wird; gleichzeitig bläst das Kind gegen Widerstand. Am 2. 5. wird der Drain entfernt; es ist kaum noch Sekretion vorhanden. Die Temp. bleibt normal; Puls 100. Am 13. 5. wird das Kind mit geschlossener Wunde in gutem Allgemeinbefinden entlassen. Die Lunge ist gut ausgedehnt und zeigt normalen Befund.

Fall 39. (Joh.-Hosp.) J.-Nr. 178/1930.

Das sechs Jahre alte Kind (männl.) erkrankte Anfang November 29 an einer Lungen- und Rippenfellentzündung, wovon es sich nicht mehr recht erholte; es hatte abwechselnd hohes Fieber und Schmerzen. Seit zwei Tagen bemerkten die Eltern eine fast hühnereigroße entzündliche Schwellung an der linken Brustseite im Bereich der mittleren Axillarlinie.

Das Kind wird am 9. 1. 30 mit Pleuraempyem links aufgenommen in sehr elendem Allgemeinzustand. Die Lunge links zeigt klinisch eine massive Dämpfung; röntgenologisch findet sich eine intensive Verschattung und Verdrängung des Herzens nach rechts. Am Aufnahmetage wird noch in Äthernarkose die 7. Rippe in hinterer Axillarlinie reseziert. Unter hohem Druck entleert sich dünnflüssiger gelber Eiter, in dem Pneumokokken nachweisbar sind. In die große Empyemhöhle wird ein Drain und Tampon eingelegt. Danach fällt die Temp. ab und wird bald normal. Die Sekretion ist am 1. 2. nur noch gering, am 18. 2. ist die Wunde geschlossen; röntgenologisch besteht keine Resthöhle, die Lunge ist gut aufgeheilt, der Zwerchfellwinkel zeigt bereits Entfaltung. Am 20. 2. wird das Kind in gutem Allgemeinbefinden entlassen.

Fall 40. (Chir. Klin.) J.-Nr. 13310/1927.

Vor 4 Wochen erkrankte das 6 Jahre alte Kind (weibl.) mit Schüttelfrösten und Fieber; vor 14 Tagen an Masern; vor 8 Tagen machte der Arzt eine Punktion und entleerte 100 ccm Eiter, wonach das Fieber fiel, in den letzten Tagen aber wieder anstieg. Das Kind wird am 18. 6. 27 mit Pleuraempyem links in die Klinik eingewiesen. Der Kräftezustand ist sehr mäßig; Schleimhäute sind schlecht durchblutet.

Klinisch findet sich über der Lunge links abwärts von der Spina scapulae Dämpfung mit aufgehobenem Stimmfremtius und Atemgeräusch. Die Temp. beträgt 40°, Puls 140.

Am 20. 6. wird in Lokalanästhesie die 9. Rippe handbreit von der Wirbelfäule reseziert; aus der Empyemhöhle entleert sich ca. 1 l. dünn-, teils dickflüssiger Eiter, in dem kulturell Pneumokokken nachweisbar sind; es wird ein Drain eingelegt. Die Temp. wird danach normal; ebenso

der Puls. Am 8. 7. ist die Sekretion nur noch sehr gering; der Drain wird entfernt. Am 15. 7. wird das Kind mit geschlossener Wunde in gutem Allgemeinbefinden entlassen.

Fall 41. (Chir. Klin.) J.-Nr. 4482/1926.

Das 6 Jahre alte Kind (männl.) erkrankte vor 4 Wochen an einer Lungenentzündung, wovon es sich nicht mehr recht erholte; in den letzten 3 Tagen hatte das Kind wieder erhöhte Temperaturen, um 38,2°. Eine Punktion in der Kinderklinik ergibt Eiter, in dem Pneumokokken nachweisbar waren, worauf es am 25. 6. mit Pleuraempyem rechts zur Chir. Klinik verlegt wurde. Der Ernährungszustand des Kindes ist gut; es besteht aber Kurzatmigkeit und Cyanose. Die rechte Thoraxseite bleibt beim Atmen zurück und ist eingefunken.

Klinisch findet sich über der rechten Lunge von der 6. Rippe abwärts hinten Dämpfung mit abgeschwächtem Stimmfremitus und Atemgeräusch.

Röntgenologisch zeigt die rechte Lunge seitlich von der 4. Rippe abwärts dichte Verschattung. Eine Punktion im 8. Interkostalraum ergibt dicken Eiter.

Am 26. 6. wird in Äthernarkose die 9. Rippe in 3 cm Ausdehnung reseziert; die verdickte Pleura durchtrennt. Aus der etwa 8 cm weiten Empyemhöhle, die nach allen Seiten durch Verwachsungen abgekapselt ist, entleert sich reichlich Eiter mit dicken Fibrinmassen; es wird ein Gummidrain und Jodoformgaze eingelegt. Am 28. 6. ist die Temperatur zur Norm gefallen und das Allgemeinbefinden gut. Am 1. 7. wird, da die Sekretion geringer geworden ist, der Drain entfernt, und das Kind steht am 3. 7. bereits auf. Mit fest geschlossener Wunde wird es am 13. 7. entlassen.

Fall 42. (Chir. Klin.) J.-Nr. 5551/1923.

Vor 14 Tagen erkrankte das 6 Jahre alte Kind (weibl.) an einer Lungen- und Rippenfellentzündung. Da sich der Zustand des Kindes nicht besserte und sich auch eine faustgroße fluktuierende entzündliche Schwellung an der Außenseite des linken Oberschenkels ausbildete, wurde das Kind am 16. 3. mit einem Pleuraempyem links aufgenommen. Der Kräftezustand ist mäßig. Die linke Thoraxseite bleibt bei der Atmung zurück.

Klinisch findet sich über der linken Lunge hinten von der Spina scapulae abwärts Dämpfung mit abgeschwächtem Atmen. Das Herz ist um anderhalb querfingerbreit nach rechts verdrängt. Durch Pleurapunktion werden 150 ccm gelben dickflüssigen Eiters entleert, in dem sich Pneumokokken nachweisen lassen. Am 17. 3. wird der offenbar metastatisch vom Pleuraempyem her entstandene Abzess am linken Oberschenkel inzidiert, woraus sich dickflüssiger Eiter entleert; es wird ein Drain eingelegt, der am 20. 3. schon entfernt werden kann. Am gleichen

Tage wird nochmals eine Pleurapunktion gemacht, die 20 ccm gelben rahmigen Eiters ergibt; da Blut dabei mitentleert wird, wird die Punktion unterbrochen. Die Temp. wird normal, das Allgemeinbefinden ist gut. Am 28. 3. wird das Kind, da der Allgemeinzustand befriedigend bleibt, zum Hausarzt entlassen; es besteht zwar noch links hinten unten eine leichte Dämpfung. Die Wunde am linken Oberschenkel verschließt sich und zeigt gute Granulationen.

Fall 43. (Chir. Klin.) J.-Nr. 2749/1922.

Das 7 Jahre alte Kind (männl.) erkrankte vor 8 Wochen an einer Lungenentzündung, wovon es sich nicht mehr recht erholte; es blieb elend und wurde in die Kinderklinik eingewiesen, wo eine Pleurapunktion Eiter ergab. Daraufhin wurde es mit Pleuraempyem rechts am 1. 9. 22 zur Chir. Klinik verlegt. Der Allgemeinzustand des Kindes ist sehr schlecht; es ist im Wachstum, wie auch in der Intelligenz zurückgeblieben; die Axillar- und Inguinaldrüsen sind geschwollen; es bestehen deutliche Zeichen von Rachitis der Zähne und Caput quadratum; Pedes plani und Genua valga. Die rechte Thoraxseite ist abgeflacht und bleibt beim Atmen deutlich zurück. Die Brustwirbelfäule zeigt leichte Linkskoliose.

Klinisch findet sich über der rechten Lunge Dämpfung bis zur Höhe des 8. Brustwirbels mit aufgehobenem Atemgeräusch.

Röntgenologisch zeigt die Lunge rechts hinten unten intensive Verschattung; Zwerchfellbewegungen sind nicht erkennbar. Eine Probepunktion in Höhe der 9. Rippe ergibt dickflüssigen, grünlich-gelben Eiter, der steril ist. Am 2. 9. wird in Äthernarkose die 8. Rippe in Ausdehnung von 3,5 cm reseziert.

Nach Eröffnung der Pleura entleert sich reichlich Eiter; in die Empyemhöhle wird ein Drain eingelegt. Nach reichlicher Eitersekretion wird am 7. 9. der Drain entfernt; die Temp. ist bereits normal geworden. Die Sekretion hat am 9. 9. fast völlig aufgehört. Am 13. 9. steigt die Temp. wieder leicht an, der nochmals reichliche Eiterentleerung folgt. Am 16. 9. ist die Temp. wiederum normal; es besteht kaum noch Sekretion. Am 18. 9. ist die Wunde fest verschlossen, doch steigt die Temperatur wiederum an (intermittierend), und es werden durch Punktion 12 ccm blutiger Flüssigkeit entleert; danach wird die Temperatur wieder normal; röntgenologisch findet sich über dem rechten Unterlappen noch eine leichte, drei querfingerbreite Trübung; die Zwerchfellexkursionen sind rechts schlechter als links; bei tiefer Inspiration zeigt das Zwerchfell rechts eine zipfelförmige Ausziehung. Am 21. 9. wird das Kind in gutem Allgemeinbefinden entlassen.

Fall 44. (Chir. Klin.) J.-Nr. 6062/1930.

Das 7½ Jahre alte Kind (weibl.) erkrankte am 2. 8. 30 mit einer Lungenentzündung rechts. Da das Fieber nicht abnahm und der Zustand

sich nicht besserte, wurde es am 5. 9. 30 mit Pleuraempyem rechts aus der Kinderklinik in die Chir. Klinik verlegt.

Der Ernährungszustand ist ausreichend. Das Kind ist zeitweise somnolent und unruhig. Die Temp. beträgt $38,6^{\circ}$, Puls 132. Die flache rechte Thoraxseite zeigt beschleunigte Atemexkursionen. Über der Lunge rechts hinten unten und seitlich in der Axilla rechts findet sich intensive Dämpfung mit aufgehobenem Atemgeräusch. Röntgenologisch zeigt sich starke Verschattung im rechten Unterlappen, die bis ins Oberfeld hinaufzieht; Zwerchfell ist schlecht erkennbar. Eine Punktion ergibt dünnflüssigen, fibrinhaltigen Eiter, in dem kulturell Pneumokokken nachgewiesen werden.

Am 6. 9. wird in Äthernarkose ein Stück der 9. Rippe in hinterer Axillarlinie reseziert. Nach Inzision der Pleura wird eine große sich nach der Wirbelsäule hin erstreckende Empyemhöhle eröffnet, aus der sich reichlich Eiter mit Fibrin entleert; es wird ein Drain eingelegt, an den eine Aspirationsdrainage mittels Wasserstrahlpumpe angeschlossen wird. Die Temperatur sinkt bereits am 7. 9. zur Norm ab. Am 15. 9. wird die Aspirationsdrainage abgesetzt und das Kind zum Aufblasen von Gummiringen angehalten.

Röntgenologisch ist die Verschattung der Lunge zurückgegangen, das Zwerchfell wieder gut beweglich. Das Kind erholt sich in der Folgezeit gut, und am 25. 9. granuliert auch die Wunde zu; röntgenologisch sind beide Lungen gleich hell. Am 1. 10. wird das Kind in gutem Allgemeinbefinden entlassen.

Fall 45. (Chir. Klin.) J.-Nr. 2271/1933.

Am 27. 3. erkrankte das 7 Jahre alte Kind (männl.) an einer Lungenentzündung und wurde in die Kinderklinik aufgenommen. Die Temp. blieb auch in den folgenden Tagen hoch (39°) und über der ganzen linken Lungenseite bestand weiter massive Dämpfung; eine Pleurapunktion ergab am 6. 4. 240 ccm grünlich-gelben Eiters, in dem Pneumokokken nachweisbar waren. Die Punktionen wurden mehrfach wiederholt (7 mal), wobei Eitermengen von 10—500 ccm entleert wurden.

Röntgenologisch war am 20. 4. die ganze linke Lunge stark verschattet, das Herz nach rechts verdrängt.

Da sich der Zustand nicht besserte, das Fieber dauernd zwischen 38 und 40° hoch blieb und das Allgemeinbefinden sich weitgehend verschlechterte, wurde das Kind zur operativen Behandlung des Pleuraempyems rechts am 25. 4. 33 in die Chir. Klinik verlegt. Das Kind befindet sich in einem ausgesprochen reduzierten Ernährungszustand und schlechtem Allgemeinbefinden. Die Temp. beträgt $38,2^{\circ}$, Puls 136; Leukozyten 12 800.

Die linke Thoraxseite bleibt bei der Atmung zurück. Über der ganzen linken Lunge findet sich Dämpfung mit abgeschwächtem Atemgeräusch.

Am 26. 4. wird ein Drachterstachel im 8. Interkostalraum in hinterer Axillarlinie eingeführt und es werden 150 ccm flockenreichen dicken Eiters entleert; gegen Abend nochmals 140 ccm. Im Eiter sind nur Pneumokokken kulturell nachweisbar; Tbc. negativ. Das Kind erhält Lebertran und Cardiazol. Die Temp. bleibt auch in der Folgezeit stark intermittierend zwischen 37 und 40°, Puls 120—150. Da keine Besserung eintritt wird die 10. Rippe am 11. 5. reseziert und in die Empyemhöhle wird ein Drain eingelegt; es entleert sich reichlich Eiter. Trotzdem bleibt die Temp. noch lange intermittierend und wird erst am 5. 6. normal. (37,5°, Puls 120.) Die Sekretion ist nur noch gering. Das Allgemeinbefinden gut. Der Drain wird gekürzt.

Röntgenologisch ist aber noch die ganze linke Lunge verschattet, unten stärker; ein Flüssigkeitspiegel ist nicht deutlich erkennbar; dazu besteht ein erheblicher Pneumothorax; das Herz ist nach rechts verdrängt. Am 8. 6. steigt die Temperatur wieder auf 38 und 40° an; Puls 140. Selbst durch Abfaugen ist aber kein Eiter zu gewinnen. Am 12. 6. ist die Temp. und der Puls wieder normal und es besteht nur eine ganz geringe Sekretion. Am 16. 6. wird der Drain entfernt, das Allgemeinbefinden ist gut.

Röntgenologisch zeigt sich am 20. 6. nur noch eine Verschattung des rechten Unter- und Mittellappens; das Zwerchfell ist nicht abgrenzbar. Am 23. 6. wird jedoch die Temperatur wiederum intermittierend, um am 26. 6. wieder zur Norm zurückzukehren; röntgenologisch ist kein Flüssigkeitspiegel nachweisbar. Bei fortbestehender ganz leichter Sekretion nimmt die Temperatur immer wieder leicht intermittierenden Charakter an; das Allgemeinbefinden bleibt trotzdem gut. Erst am 25. 7. bleibt die Temp. normal und die Wunde schließt sich; röntgenologisch ist zwar noch leichte Verschattung vorhanden, das Zwerchfell ist noch wenig beweglich, ein Pneumothorax ist nicht mehr nachweisbar. Am 30. 7. wird das Kind endlich in gutem Allgemeinbefinden entlassen; Temp. 36,8°, Puls 102.

Eine Nachuntersuchung am 20. 10. 33 ergibt völlig normalen Lungenbefund; das Kind hat an Gewicht stark zugenommen und zeigt einen ausgezeichneten Allgemeinzustand.

Fall 46. (Chir. Klin.) J.-Nr. 7452/1935.

Am 15. 12. 34 erkrankte das 8 Jahre alte Kind (männl.) an einer Lungenentzündung, die abklang. Am 25. 12. stieg aber die Temp. wieder an und das Kind wurde mit einer Rippenfellentzündung in ein auswärtiges Krankenhaus eingeliefert; dort ergaben zweimalige Punktionen keinen Eiter. Da die Temp. aber intermittierend blieb, wurde das Kind am 15. 1. 35 in die Chir. Klinik mit einem Pleuraempyem links aufgenommen.

Der Ernährungszustand ist sehr mäßig; Schleimhäute sind wenig durchblutet, die Atmung ist oberflächlich; Temp. 38,5°, Puls 140; Leukozyten 18 400; Hämoglobin 63%. Über der linken Lunge, besonders über dem Oberlappen findet sich klinisch massive Dämpfung mit aufgehobenem Stimmfremitus und Atemgeräusch; röntgenologisch zeigt sich eine Verschattung. Die Probepunktion ergibt rahmigen gelben Eiter, in dem Pneumokokken nachweisbar sind. Am 17. 1. 35 wird die 8. Rippe in 3 cm Ausdehnung in hinterer Axillarlinie rezeziert und ein dickes Drain in die Empyemhöhle eingelegt. Trotz Aspirationsdrainage und NaCl-Spülungen fließt nur wenig dickflüssiger, stark fibrinhaltiger Eiter ab. Es wird daher am 21. 1. die 9. Rippe ebenfalls in 4 cm Ausdehnung rezeziert, das Drain eingelegt und die Aspirationsdrainage wieder angeschlossen. Doch entleert sich nur wenig teils seröse, teils eitrige Flüssigkeit.

Röntgenologisch hat sich am 27. 1. ein großer Pneumothorax gezeigt. Die Temp. bleibt leicht intermittierend, zwischen 37 und 38°, Puls 112—132. Das Kind erhält Cardiazol und Pyramidon und wird zum Aufblasen von Luftringen, und Mundharmonikaspielen angehalten. Das Zwerchfell steht am 6. 2. röntgenologisch links hoch und es zeigt sich noch ein querfingerbreiter Erguß und Pneumothorax. Die Temp. ist am 12. 2. zur Norm zurückgekehrt; die Sekretion ist gering, und am 21. 2. wird der Drain entfernt. Am 27. 2. ist die Wunde verschlossen. Röntgenologisch steht das Zwerchfell links noch immer sehr hoch und ist fixiert; dagegen ist die Verschattung nur noch sehr gering und kein Erguß mehr erkennbar. Das Kind erholt sich allmählich und steht am 2. 3. auf; die Temp. bleibt normal. Am 11. 3. wird das Kind in gutem Allgemeinbefinden entlassen.

Fall 47. (Chir. Klin.) J.-Nr. 13 809/1929.

Vor 2 Jahren erkrankte das 8 Jahre alte Kind (weibl.) an einer Lungenentzündung mit nachfolgendem Pleuraempyem rechts, das durch Rippenrefektion in einem auswärtigen Krankenhaus behandelt wurde. Im September 28 wurde das Kind nochmals operativ behandelt, da der Prozeß von neuem aufflackerte; es wurde dann im Januar 1929 dort in die ambulante Behandlung entlassen.

Das Kind erholte sich aber in der Folgezeit nicht recht, die Fistel heilte nicht aus; es wird daher am 5. 3. 29 mit einem veralteten Empyem r. in die Chir. Klinik aufgenommen.

Der Kräftezustand ist sehr mäßig; Temp. 37,6°, Puls 120. Die rechte Thoraxseite ist abgeflacht und schleppt bei der Atmung nach; es besteht eine leichte Linksskoliose der Brustwirbelsäule. Aus der Fistel über der 8. Rippe in der Scapularlinie entleert sich etwas serös-eitrige Flüssigkeit; man gelangt mit der Sonde 8 cm tief ein. Über der Lunge rechts findet sich in der Axillarlinie bis zur Scapulahöhe Dämpfung mit abge-

schwächtem Atemgeräusch. Eine Bronchialfistel ist mit Blau- oder Jodipinlösung nicht nachweisbar.

Röntgenologisch zeigt die Lunge rechts in den äußeren Partien Verschattung und das Zwerchfell rechts ist auch dort fixiert und wenig beweglich.

Am 13. 3. wird in Avertin-Äthernarkose die Empyemresthöhle durch einen bogenförmigen Hautschnitt mit Exzision der Fistel und nach Resektion der 5., 6., 7. und 8. Rippe, die einen knöchernen Defekt zeigt, in 8—10 cm Ausdehnung freigelegt mit Entfernung der 2 cm verdickten Pleuraschwarte. Die Wand der handtellergroßen Höhle ist derb und unnachgiebig, mit schmierig eitrigen Granulationen belegt, die nicht tuberkulös verdächtig sind. In der Empyemhöhle findet sich ein zurückgebliebenes Stück eines alten Gummidrains! Nach Einlegung eines Drains und Einschlagung eines Hautlappens in die Höhle wird sie durch Hautnaht geschlossen und ein Kompressionsverband darübergelegt. Am 15. 3. entleert sich reichlich serös-eitrige Flüssigkeit, die Temperatur bleibt noch leicht remittierend zwischen 38 und 39,4°, Puls 120. Auch in der Folgezeit dauert die Sekretion fort; die Temp. kehrt aber am 25. 3. schon zum Normalen zurück; das Kind wird angehalten, gegen Widerstand zu blasen. Am 14. 4. wird der Drain entfernt, die Sekretion ist nur noch gering; röntgenologisch besteht nur noch leichte Verschattung rechts hinten unten. Das Kind erhält Höhensonne. Am 11. 5. ist die Drainfistel geschlossen; Temp. bleibt normal, das Allgemeinbefinden bessert sich.

Am 17. 5. wird das Kind mit röntgenologisch gut beweglichem Zwerchfell und völlig geschwundener Höhle in gutem Allgemeinbefinden entlassen.

Fall 48. (Chir. Klin.) J.-Nr. 9722/1934.

Vor 3 Wochen erkrankte das 9 Jahre alte Kind (männl.) an einer Lungen- und Rippenfellentzündung, wovon es nicht mehr recht gefundete. Am 15. 2. 34 wird es in die Chir. Klinik mit Pleuraempyem rechts aufgenommen. Die Temp. beträgt 38,5°. Puls 132. Der Allgemeinzustand ist schlecht. Die re. Thoraxseite bleibt bei der Atmung zurück. Über der Lunge rechts findet sich klinisch von der Spina scapulae abwärts intensive Dämpfung mit abgeschwächtem Atemgeräusch. Röntgenologisch zeigt sich von der 5. Rippe abwärts hinten Verschattung; das Zwerchfell ist nicht abgrenzbar, das Herz ist nach links verdrängt. Eine Probepunktion im 9. Interkostalraum ergibt reichlich dünnflüssigen, grünlichen Eiter, in dem Pneumokokken nachweisbar sind. Am 16. 2. wird ein Drachterstachel eingelegt und Aspirationsdrainage angegeschlossen; trotzdem ist kein Eiter zu entleeren, sondern nur mittels Punktion durch Kanüle, wie am 17. und 18. 2., etwa 30—40 ccm Eiter. Da die erhöhte Temperatur intermittierend noch anhält, wird am 20. 2. der Drachterstachel entfernt und ein dickes Gummidrain eingelegt, durch den anfangs Eiter abfließt. Da

dieser aber bald durch Fibringerinnfel verstopft wird, wird noch am gleichen Tage die 8. Rippe in Ausdehnung von 2 cm refeziert, worauf aus der großen Empyemböhle reichlich starkfibrinöser Eiter abfließt; ein dickes Drain wird in die Höhle eingelegt und die Aspirationsdrainage angeschlossen. Die Temp. sinkt bald zur Norm bei gutem Eiterabfluß. Am 6. 3. wird die Aspirationsdrainage abgesetzt; der Drain gekürzt.

Röntgenologisch ist die Verschattung der Lunge zurückgegangen und kein Erguß mehr nachweisbar. Am 17. 3. wird der Drain entfernt, die Sekretion ist nur noch mäßig; das Kind bläst gegen Widerstand; der Allgemeinzustand bessert sich zusehends.

Am 5. 4. ist die Wunde fest verschlossen und das Kind wird in gutem Allgemeinbefinden entlassen.

Fall 49. (Chir. Klin.) J.-Nr. 631/1920.

Am 28. 6. erkrankte das 10 Jahre alte Kind (weibl.) an einer Lungenentzündung links. Da das Fieber anhielt, wurde es am 12. 7. in die Mediz. Klinik eingewiesen. Eine Punktion ergab dort 650 ccm dünnflüssigen fötiden Eiter, in dem bakteriologisch sich Streptokokken nachweisen ließen. Die Pirquet-Reaktion war positiv. Da keine Besserung eintrat, wurde das Kind am 15. 7. 20 mit Pleuraempyem links in die Chir. Klinik verlegt.

Temp. 39°, Puls 140. Der Kräfte- und Allgemeinzustand des schlanken Kindes ist schlecht. Die linke Thoraxseite bleibt bei der Atmung zurück. Über der Punktionsstelle findet sich eine kleinhandtellergröße fluktuierende entzündliche Schwellung.

Klinisch besteht über der Lunge links seitlich und abwärts von der Spina scapulae eine nach unten zunehmende Dämpfung mit stark abgeschwächtem Atemgeräusch. Das Herz ist nach rechts verdrängt. Am 17. 7. wird nach Spaltung des Weichteilabszesses und nach einer Probepunktion, die dünnflüssigen fötiden Eiter ergibt, die 7. Rippe in 5 cm Ausdehnung in Äthernarkose subperioostal refeziert, die Pleura breit gespalten; aus der Empyemböhle entleert sich 500 ccm Eiter, in die ein starkes Gummidrain eingelegt wird. Der Puls wird kräftiger; die Temp. sinkt auf 38°. Am folgenden Tag wird die Empyemböhle nach reichlichem Eiterabfluß luftdicht durch einen Fingerling-Ventilverband über dem Drain abgeschlossen. Am 23. 7. tritt eine Pneumonie des re. Unterlappens auf, der das Kind am 24. 7. bei dem entkräfteten Allgemeinzustand erliegt.

Die Sektion ergab den gleichen Befund; die Empyemböhle links war leer; der linke Unterlappen war atelektatisch.

Fall 50. (Chir. Klin.) J.-Nr. 27/1932.

Das zwölf Jahre alte Kind (weibl.) erkrankte am 1. 2. 32 an einer Lungenentzündung rechts, wovon es am 16. 2. gesundete. Nach einigen Tagen Wohlbefindens erkrankte es von neuem; eine Punktion ergab

eitriges Exsudat, die mit Rivanolspülungen am 29. 2. vom Arzt wiederholt wurde. Da keine Besserung eintrat, wurde das Kind am 1. 3. 32 in die Chir. Klinik eingewiesen mit Pleuraempyem rechts, in gutem Allgemein- und Kräftezustand. Die Temp. beträgt $39,1^{\circ}$, Puls 136. Über dem Mittel- und Unterlappen der rechten Lunge findet sich Dämpfung mit abgeschwächtem Atemgeräusch.

Röntgenologisch war die ganze rechte Lungenseite diffus verschattet und ein Erguß vorhanden; das Zwerchfell steht rechts höher als links und ist weniger beweglich; das Herz ist nach links verdrängt. Eine Punktion am unteren Scapularand ergibt gelben, dünnflüssigen Eiter, in dem kulturell Pneumokokken sich nachweisen lassen. Am 2. 3. wird ein Drachterstachel eingelegt und die Aspirationsdrainage mittels Wasserstrahlpumpe angeschlossen. Da aber die Temperatur auf 39° stehen bleibt, wird am 5. 3. die 8. Rippe in 5 cm Ausdehnung subperiostal in hinterer Axillarlinie reseziert, worauf sich auch reichlich fötider Eiter entleert. Nach Einlegen eines starken Gummidrains und Verschuß der Höhle durch Naht der Haut wird die Aspirationsdrainage mittels Wasserstrahlpumpe angelegt. Die Temperatur kehrt bald zur Norm zurück. Am 15. 3. ist die Sekretion schon geringer geworden; das Kind erholt sich gut und bläst Gummiringe auf. Am 21. 3. zeigt sich röntgenologisch, daß der Erguß sehr gering geworden und die Herzverdrängung zurückgegangen ist. Am 2. 4. werden Aspirationsdrainage und am 6. 4. der Drain entfernt. Die Wunde ist am 12. 4. geschlossen, und das Kind wird am 16. 4. in gutem Allgemeinbefinden beschwerdefrei entlassen.

Fall 51. (Chir. Klin.) J.-Nr. 4181/1930.

Im August 29 erkrankte das 13 Jahre alte Kind (männl.) an einer Lungen- und Rippenfellentzündung. Da keine Besserung eintrat, machte der Arzt einen Einschnitt in die Brustwand und legte ein Drain ein, wonach sich reichlich Eiter entleerte. Eine mäßige Sekretion blieb noch sieben Wochen lang bestehen, bis sich die Fistel verschloß. Nach acht Tagen aber brach sie wieder auf mit Eiterentleerung. Das Kind wurde vom Arzt am 22. 6. in die Chir. Klinik mit einem veralteten Empyem links in mäßigem Kräftezustand eingewiesen; die Temp. betrug $37,6^{\circ}$; Puls 112.

Klinisch findet sich über der Lunge links von der Spina scapulae abwärts eine nach unten zunehmende Dämpfung mit abgeschwächtem Stimmfremitus und Atemgeräusch. Mit der Sonde gelangt man in die unter dem Angulus scapulae gelegene Fistel 6 cm tief ein. Röntgenologisch zeigt sich eine diffuse Verschattung der unteren Lungenpartien links; das Zwerchfell links ist nicht beweglich. Eine Kontrastfüllung der Fistel ergibt eine faustgroße Empyemresthöhle; eine Bronchialfistel ist nicht nachweisbar.

Am 26. 6. wird nach Exzision der Fistel und einem bogenförmigen Schritt in Avertin-Äthernarkose die 5.—9. Rippe in 10—15 cm Ausdeh-

nung im Bereich der vorderen und hinteren Axillarlinie refeziert; nach Entfernung der 2 cm dicken Pleuraschwarte wird eine glatte, starrwandige Empyemresthöhle eröffnet, die mit NaCl-Lösung gespült und jodiert wird. In die Höhle wird ein Hautmuskellappen eingeschlagen und sie durch Haut- und Subkutannaht verschlossen; darüber wird ein Kompressionsverband gelegt. Das Kind erhält p. o. eine 500 ccm Traubenzuckerinfusion, Cardiazol, Ephetonin, Campher. In den nächsten Tagen ist die Sekretion reichlich; die Temp. ist noch leicht intermittierend. Am 1. 7. ist die Sekretion gering; es wird ein Gummistreifenverband angelegt. Die Temp. ist normal geworden; Puls 100. Das Kind erholt sich gut. Der Hautmuskellappen hat sich gut angelegt. Röntgenologisch ist am 14. 7. keine Höhle und kein Erguß mehr nachweisbar; zwar sind noch die unteren Lungenpartien leicht verschattet. Das Allgemeinbefinden des Kindes bessert sich zusehends; es steht ganztägig auf und erhält Höhensonne, Lebertran, Vigantol.

Mit fast völlig geschlossener Wunde wird das Kind am 8. 8. in gutem Allgemeinbefinden entlassen.

Fall 52. (Chir. Klin.) 5740/1928.

Das 14 Jahre alte Kind (weibl.) erkrankte am 27. 2. 28 mit hohem Fieber und Schüttelfrösten an einer Pneumonie des linken unteren Lungenlappens; (die linke Lunge war vor einem Jahr wegen einer Tbc. in einer auswärtigen Heilstätte stillgelegt worden, aus der die Pat. gebessert entlassen wurde). Die hohe Temp. hielt jedoch an und es trat keine Besserung ein.

Am 15. 3. machte der Arzt eine Punktion, die Eiter ergab, worauf das Kind am 16. 3. mit einem Pleuraempyem links in die Chir. Klinik eingewiesen wurde.

Der Kräftezustand des Kindes ist gut, die Schleimhäute sind zwar mäßig durchblutet. Die Temp. beträgt 36,9°, Puls 112. Die linke Thoraxseite ist abgeflacht und bleibt bei der Atmung zurück.

Klinisch findet sich über der linken Lunge hinten unten eine handbreite Dämpfung. Röntgenologisch zeigt sich ein Seropneumothorax; das Herz ist mäßig nach rechts verdrängt. Eine Pleurapunktion am 16. 3. ergibt 110 ccm grünlich-gelben Eiters, in dem kulturell hämolyisierende Streptokokken nachweisbar sind. Die Pleurapunktionen werden noch mehrfach am 23. 3., 7. 4., 16. 4. wiederholt, wobei 150—400 ccm Eiter entleert werden. Die Temp. bleibt im allgemeinen normal.

Am 21. 4. wird die Bülow'sche Drainage angelegt, wobei reichliche Eitermengen entleert werden. Erst am 22. 5. kann nach mehrmaligen Unterbrechungen die Aspirationsdrainage völlig abgesetzt werden, da endlich die Sekretion geringer geworden ist. Röntgenologisch ist auch kein Flüssigkeitspiegel mehr nachweisbar; lediglich besteht noch ein spalt-

förmiger wandständiger Pneumothorax. Am 25. 5. wird auch das Drain entfernt.

Das Kind wird am 4. 6. in gutem Allgemeinzustand entlassen.

In der folgenden Auswertung werden die Pleuraempyeme der Kinder von 1—2 Jahren (21 Fälle) und die von 3—14 Jahren (31 Fälle) von einander getrennt behandelt, weil nach den Erfahrungen des Schrifttums das Lebensalter für die Bewertung der Erkrankung von maßgebender Bedeutung ist.

Wie aus Tabelle I hervorgeht, kamen in der Beobachtungszeit 21 Kinder von 1—2 Jahren zur Behandlung.

Das Pleuraempyem fand sich nach einer lobären Pneumonie als sogenanntes **metapneumonisches** Empyem 15 mal. Es könnte in zwei Fällen (Nr. 14 und 17) evtl. bronchopneumonisch entstanden sein, was jedoch aus den nur kurzen Krankengeschichten nicht klar hervorgeht. In 4 Fällen (Nr. 9, 13, 14, 12) wurde es chronisch. Der Allgemeinzustand des Kindes war in diesen 4 Fällen stets äußerst schlecht, desolat, mit starker Gewichtsabnahme verbunden; dazu bestand, wie im Fall 13, eine stark ausgebildete Rachitis. Im Fall 14 war das Allgemeinbefinden des Kindes durch eine vorausgegangene Otitis media (Antrotomie) sehr stark geschwächt.

Mehrfach war das Empyem durch Begleiterkrankungen kompliziert. Nach einer Pneumonie, der Masern vorausging, bei Anwesenheit von Pneumokokken trat das Pleuraempyem einmal auf (Fall 10). Mit vorausgegangenem Keuchhusten war das Pleuraempyem zweimal verbunden (Fall 11 und 12).

Soweit eine bakteriologische Untersuchung durchgeführt wurde, überwogen beim metapneumonischen Empyem die Pneumokokken. In 7 Fällen waren im eitrigen Punktat Pneumokokken nachweisbar (Fall 3, 6, 10, 11, 15, 16, 21). In zwei Fällen (7 und 19) waren Diplokokken angegeben.

Gerade in den 4 Fällen, die chronisch wurden, handelte es sich um haemolyisierende Streptokokken (Fall 14), einmal Streptokokken gemeinsam mit Staphylokokken (Fall 9), während einmal das

Tabelle I.

Empyeme bei Kindern von 1—2 Jahren (21 Fälle):

Zahl der Fälle		Behandlung	Behandlungsergebnis		
♀	♂		geheilt	ungeheilt	gestorben
parapneumonisch	3	Punktion	2		1
	1	Punktion mit Aspirationsdrainage	1		
	1	intercostale Thoracotomie			1
	1	einfache Rippenresektion	1		
		breite Rippenresektion			
Sa.	2	4	4		2
metapneumonisch	2	Punktion		1	1
	2	Punktion mit Aspirationsdrainage	4		
	1	intercostale Thoracotomie	1		
	2	einfache Rippenresektion	4	1	
	1	breite Rippenresektion	2		1
Sa.	5	10	11	2	2

Punktat (Fall 13) bakteriologisch steril blieb; im Fall 12 war darüber aus der Krankengeschichte kein Befund zu erheben.

Ebenso war in den beiden Fällen (5 und 17) keine bakteriologische Angabe in der Krankengeschichte.

Parapneumonisch, d. h. gleichzeitig mit einer Pneumonie fand sich das Empyem 6 mal, jedesmal rechtsseitig auftretend.

Hierbei waren bakteriologisch nachweisbar in 2 Fällen Staphylokokken (Fall 1 und 2), einmal gemeinsam mit Enterokokken (Fall 8), einmal nur Pneumokokken (Fall 18), in den Fällen 4 und 20 waren aus der Krankengeschichte keine bakteriologischen Befunde zu erheben. Zu erwähnen ist, daß im Fall 4 eine Erkrankung an Keuchhusten vorausging.

Unter diesen 21 Pleuraempyemen betrafen 13 das weibliche und 8 das männliche Geschlecht. 11 mal trat es rechtsseitig und 10 mal linksseitig auf. Hierbei war das metapneumonische Empyem 7 mal rechtsseitig (Fall 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16) und 8 mal linksseitig (Fall 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21). Eine bestimmte Seitenprädisposition des metapneumonischen Empyems ist aus dem gegebenen Material nicht mit Wahrscheinlichkeit zu bejahen; doch ist erwähnenswert, daß das parapneumonische Empyem in den 6 angegebenen Fällen nur rechtsseitig auftrat.

Der Eiter war bei Anwesenheit von Pneumokokken grünlichgelb und dickflüssig, bei Staphylokokken von etwas mehr dünnflüssiger Beschaffenheit.

In 2 Fällen (Nr. 13 und 17) bestand bei Aufnahme zur Behandlung des postpneumonischen Pleuraempyems bereits ein Brustwandabszeß im Bereich der Mamillargegend bei drohender Perforation desselben (*Empyema necessitatis*).

In 2 Fällen (Nr. 3 und 9) wurde die Ausheilung bei Behandlung des postpneumonischen Empyems durch eine Bronchialfistel verzögert, wovon sich die eine schon durch Ablassen des Pneumothorax mittels Punktion schloß (Fall 3), (Erreger: Pneumo- und Staphylokokken). In dem anderen Fall (Nr. 9) war zu ihrer Ausheilung, wie auch der der veralteten Empyemhöhle die breite Rippenresektion erforderlich (Erreger: Strepto- und Staphylokokken).

Unter den 21 Empyemfällen bei Kindern im Alter von 1—2 Jahren waren 4 Todesfälle zu verzeichnen, je 2 beim para- und metapneumonischen Empyem.

2 Fälle starben schon kurz nach der Aufnahme des Kindes und einmaliger Punktionsbehandlung; der Allgemeinzustand dieser Kinder war denkbar schlecht (starke Kreislauffschwäche, Dispnoe, Staphylokokkeneiter). In dem einen Fall (Nr. 17) des metapneumonischen Empyems bestand dazu eine Nephritis und Cystitis. Im Fall 1 war das Pleuraempyem parapneumonisch. In den beiden anderen Fällen kam der letale Ausgang im Laufe der Behandlung (Fall 2 und 14); einmal bei einem parapneumonischen Pleuraempyem (Erreger: Staphylokokken) in Verbindung mit einer Otitis media, nach einer interkostalen Thorakotomie, die 5 Tage ante exitum gemacht wurde mit folgender Aspirationsdrainage mittels Drachterstachels (Fall 2). Im anderen Fall (Nr. 14) erfolgte der Tod bei einem Streptokokkenpleuraempyem, das anfangs durch eine Otitis media kompliziert, nach mehrfachen Punktionen und folgender Aspirationsdrainage nach Bülow nach 2 Monate langer Behandlungszeit ausgeheilt erschien, obwohl eine leichte Fistelsekretion fortbestand. Der Prozeß wurde jedoch 1½ Monate später wieder foudroyant mit starker Eiterentleerung aus der Fistel. Zur Ausheilung des chronischen Pleuraempyems wurde daher eine Thorakoplastik ausgeführt, der das Kind erlag. Die Sektion ergab einen Status lymphaticus, starke allgemeine Anaemie, Verfettung der Leber und Nieren und Bronchiektasien.

2 der Empyemfälle bei Kindern von 1—2 Jahren wurden gegen ärztlichen Rat aus der Behandlung von den Eltern fortgenommen und mußten daher als ungeheilt entlassen werden (Fall 10 und 12). Im Fall 12 war das postpneumonische Pleuraempyem bereits chronisch und war früher durch eine Rippenresektion auswärtig behandelt worden; mit der Sonde gelangte man 10 cm durch eine eiternde Fistel in die veraltete Empyemhöhle.

Die nach Sicherstellung der Diagnose durchgeführte **Behandlung**, die zum Erfolg führte, war verschieden.

Ein Empyemfall (Nr. 20), wo das Pleuraempyem wahrscheinlich synpneumonisch war, erforderte nach zweimaliger Punktion,

die nur beide Male sehr wenig Eiter (5 ccm) ergab und auswärtig schon vor Aufnahme des Kindes in die Klinik gemacht worden war, keine weitere Behandlung mehr; es heilte in ca. acht Tagen aus.

Durch mehrfache **Punktionen allein** kam das parapneumonisch verlaufende Pleuraempyem in einem Fall (Nr. 4) mit Erfolg zur Ausheilung; es wurden dabei Eitermengen von 50—100 ccm abgelassen, die fötide, dünnflüssig waren. Bakteriologisch war kein Befund aus der Krankengeschichte zu erheben. Der Krankheitszustand des Kindes im allgemeinen und die anfangs gleichzeitig bestehende Pneumonie gaben keine Indikation zu einem chirurgischen Eingriff. Die Heilungsdauer (Zeitpunkt vom Beginn der Behandlung) betrug bis zur völligen Genesung 14 Tage.

Durch Punktion mit **anschließender Aspirationsdrainage** mittels Wasserstrahlpumpe bei Anwendung des Drachter-Stachels kam das in vier Fällen postpneumonisch (Fall 3, 15, 16, 21) und in einem Fall synpneumonisch (Fall 8) verlaufende Pleuraempyem zur Ausheilung. Zu Beginn der Behandlung wurden zuerst einfache Punktionen versucht. Da diese aber zu keinem klaren Erfolg führten, oder wie im Fall 21 anfangs zu einer erfolgreichen Ausheilung zu führen schienen, um dann doch wieder den Prozeß aufflackern zu lassen, wurde dann die Aspirationsdrainage mittels Wasserstrahlpumpe bei Anwendung des Drachter-Stachels im Abstand von 2—23 (durchschnittlich in 10 Tagen) seit dem Beginn der Behandlung durch einfache Punktion eingeführt. Sie führte jeweils zur Ausheilung des Pleuraempyems. Die Heilungsdauer schwankte zwischen 8—21 Tagen.

Der Eiter war in diesen Fällen meist dickrahmig bei Anwesenheit von Pneumokokken allein in 3 Fällen (Nr. 15, 16, 21), einmal gemeinsam mit Staphylokokken (Fall 3). In einem Fall waren Staphylokokken (Fall 8) zusammen mit Enterokokken nachweisbar.

Eine Indikation zu einem größeren chirurgischen Eingriff war in diesen Fällen nicht gegeben, da die erwähnte Behandlung bereits zum Ziele führte.

Die **intercostale Thorakotomie** (Incision) wurde in einem Fall (Fall Nr. 5) mit folgender einfacher Drainage erfolgreich aus-

geführt. Hierbei bestand das postpneumonische Pleuraempyem schon fast 3 Wochen. Bakteriologisch war kein Befund aus der Krankengeschichte zu erheben, ebenso auch nichts über die Beschaffenheit des Eiters. Die Heilungsdauer beanspruchte ca. 1½ Monate.

Die **einfache Rippenrefektion** einer Rippe, meist nur in 2—3 cm Ausdehnung, wurde in fünf Fällen (Nr. 6, 7, 11, 18, 19) mit Erfolg angewandt. Der chirurgische Eingriff wurde entweder sogleich 3 mal nach der Aufnahme des Kindes in die Klinik ausgeführt, in den Fällen Nr. 7, 11, 19, oder nach vorhergehenden mehrfachen Punktionen und einfacher, bzw. Aspirationsdrainage, die nach ca. 10—14tägiger Anwendung keine Heilung brachte, in 2 Fällen ausgeführt (Nr. 6 u. 18). Es handelte sich in den Fällen 7, 11, 19 um ein bereits 2—3 Wochen bestehendes metapneumonisches Pleuraempyem mit Pneumokokken, bzw. Diplokokken und in einem Fall (Nr. 18) wahrscheinlich um ein parapneumonisch verlaufendes Pleuraempyem mit Pneumokokken nach Ausbildung der formativen Periode (dickflüssiger, rahmiger Eiter).

Der Allgemein- und Kräftezustand der Kinder war meist in diesen Fällen schlecht. Dazu bestanden Erscheinungen von Atemnot, wie Kurzatmigkeit, Dyspnoe, Nasenflügelatmen. Die Interkostalräume waren verstrichen oder die betreffende Thoraxseite blieb deutlich bei der Atmung zurück, die kranke Schulter stand tiefer als wie die der gefunden Seite. Die Dämpfung über der kranken Lungenseite war sehr ausgesprochen, bisweilen sogar weiter zunehmend, das Atemgeräusch und der Stimmfremitus aufgehoben. Röntgenologisch zeigte sich hochgradige diffuse Verschattung der betreffenden kranken Seite mit teilweise sehr deutlicher Spiegelbildung, Herzverdrängung nach der gefunden Seite; das Zwerchfell war unbeweglich und sein Schatten nicht abgrenzbar.

Alle diese Faktoren machten die Indikation zur Rippenrefektion zulässig, die danach dann oft einen erstaunlich raschen Umschwung herbeiführte.

In 2 Fällen (Nr. 6 und 11) wurde anschließend die geschlossene Aspirationsdrainage mittels Wasserstrahlpumpe angewandt. Insgesamt betrug hierbei die Heilungsdauer bis zur völligen Gesundung

30—50 Tage; in den übrigen 3 Fällen (Nr. 7, 18, 19) bei einfacher Drainage 35—52 Tage.

Die **breite Rippenrefektion** einer oder auch zweier Rippen in 4—6 cm Ausdehnung wurde in zwei Fällen (Nr. 9 und 13) ausgeführt.

Es handelte sich in dem Fall 9 um ein postpneumonisches Pleuraempyem (Strepto- und Staphylokokkeneiter), das nach einer etwa 3wöchentlichen Aspirationsdrainagebehandlung nur vorübergehend ausgeheilt erschien. Weiter durchgeführte Aspirationsdrainagebehandlung mittels Wasserstrahlpumpe und auch Spülungen wollten keinen rechten Heilerfolg des chronischen, fast 3 Monate bestehenden Pleuraempyems bringen. Die Ausheilung wurde verhindert, wahrscheinlich durch eine Bronchialfistel, die erst nach 3 Monaten röntgenologisch nachweisbar war. Erst die breit durchgeführte Rippenrefektion mit Übernähung der Bronchialfistel und Einlegung eines Hautlappens in die faustgroße veraltete Empyemhöhle brachte endlich die erfolgreiche Ausheilung unter bald eintretender Besserung des Allgemeinzustandes. Die Heilungsdauer betrug 3 Monate.

Bei dem anderen Fall (Nr. 13), in dem fast 2½ Monate ein postpneumonisches Pleuraempyem bestand, brachte ebenfalls die breite Rippenrefektion die Ausheilung der veralteten Empyemhöhle. Das eitrige grün-gelbe Punktat war kulturell steril. Die Heilungsdauer nach der Operation bis zur völligen Genesung betrug 44 Tage.

Eine Übersicht über das Pleuraempyem im Alter von 3 bis 14 Jahren bringt

(31 Fälle)

Bei den Kindern dieses Alters trat das Pleuraempyem nach einer lobären Pneumonie (**metapneumonisch**) 29mal auf.

Hinzuweisen wäre dabei auf den Fall 26, bei dem das Pleuraempyem auch nach einer Bronchopneumonie entstanden sein könnte; dazu war es offenbar interlobär. Bakteriologisch fanden sich hierbei Pneumokokken.

Einmal stellte sich das Pleuraempyem nach einer Grippe-Pneumonie ein (Erreger: Pneumokokken) (Fall 28).

Tabelle II.

Zahl der Fälle		Behandlung	Behandlungs- ergebnis		
♀	♂		geheilt	un- geheilt	ge- storben
parapneumonisch		Punktion			
		Punktion mit Aspi- rationsdrainage			
		intercostale Thoracotomie			
	2	einfache Rippenresektion	2		
		breite Rippenresektion			
Sa.	2		2		
metapneumonisch	1	Punktion	4	1	
	2	Punktion mit Aspi- rationsdrainage	3		
	1	intercostale Thoracotomie	1		
	5	einfache Rippenresektion	12		1
	4	breite Rippenresektion	6		1
Sa.	13	16	26	1	2

In 2 Fällen wurde es chronisch unter Ausbildung einer Empyemresthöhle (Fall 47 und 51), die einmal trotz vorhergehender Rippenresektion und das andere Mal trotz intercostaler Thorakotomiebehandlung 1—2 Jahre fortbestand. Bakteriologische Befunde waren aus der Krankengeschichte nicht zu erheben. Der allgemeine Kräftezustand des Kindes war hierdurch stark gehemmt und mäßig. In dem Fall Nr. 47, der auswärts operiert war, fand sich später ein zurückgebliebenes Stück eines alten Gummidrains, was wohl die Erklärung gab für die verzögerte Ausheilung.

Auch in diesem Alter war das Empyem mehrfach durch Begleiterkrankungen kompliziert. Nach einer Pneumonie, der Masern und einmal dazu vorher Grippe (Fall 27) vorausging, fand sich das Pleuraempyem 3 mal (Fall 23, 27, 40). Bakteriologisch war im Fall 23 kein Befund aus der Krankengeschichte zu erheben; im Fall 27 war das Punktat steril und im Fall 40 fanden sich Pneumokokken.

Soweit eine bakteriologische Untersuchung durchgeführt wurde, überwogen beim metapneumonischen Empyem die Pneumokokken. In 15 Fällen waren im eitrigen Punktat Pneumokokken nachweisbar (Fall 22, 24, 25, 26, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 50); einmal Diplokokken (Fall 34), zweimal Staphylokokken (Fall 30, 31), zweimal Streptokokken (Fall 49, 52); einmal war das Punktat steril (Fall 27). In den Fällen 33, 35, 37, 46 waren keine Angaben darüber zu erheben.

Parapneumonisch fand sich das Pleuraempyem, das bis zu einem Abstand von 10 Tagen seit dem Beginn der Pneumonie sicher diagnostiziert wurde, offenbar in 2 Fällen (Nr. 32 und 45). Eine eindeutige Klarheit läßt sich aus den Krankengeschichten leider nicht erheben. Das Pleuraempyem war im Fall 32 rechtsseitig; dazu bestand eine Otitis media purulenta. Eine bakteriologische Angabe war in der Krankengeschichte über das eitrige, mit Fibrinflocken durchsetzte Punktat nicht zu erheben. Im Fall 45 war das Pleuraempyem linksseitig bei Anwesenheit von Pneumokokken.

Unter den 31 Pleuraempyemen betrafen das weibliche Geschlecht 15 und das männliche 16.

Eine eindeutige Seitenprädilektion lag weder bei dem parapneumonischen noch bei dem metapneumonischen Empyem vor.

Das metapneumonische Empyem war 18 mal rechtsseitig und 11 mal linksseitig; parapneumonisch war es je einmal rechtsseitig und linksseitig.

Über die Beschaffenheit des Eiters geben die Krankengeschichten nicht immer eine Beschreibung. Der gelb-grüne Pneumokokkeneiter war teils dünn-, teils dickflüssig, meist aber doch mit Fibringerinnsel vermischt. Der Staphylokokkeneiter war auch gelbgrün und mehr dünnflüssiger; der Streptokokkeneiter war wieder dünnflüssig.

In 2 Fällen war bei der Aufnahme zur Behandlung des Pleuraempyems ein Brustwandabzeß im Bereich der Mamillargegend, der zu perforieren drohte; einmal bei Anwesenheit von Staphylokokken (Fall 30) und das andere Mal bei Anwesenheit von Pneumokokken (Fall 39).

In 1 Fall (Nr. 42) trat ein offenbar von dem Pleuraempyem, in dessen Punktat sich Pneumokokken befanden, her entstandener metastatischer Abzeß am linken Oberschenkel auf, der nach Incision abheilte.

In einem anderen Fall (Fall 30) bildete sich bei einem Pleuraempyem bei Anwesenheit von Staphylokokken nach der Rippenrefektion am vorderen unteren Wundwinkel ein intramuskulärer Abzeß aus, der nach Incision abheilte; gleichzeitig kam es hier kurz vor Abschluß der Behandlung des Pleuraempyems zu einer Otitis media acuta.

Unter den 31 Empyemfällen waren 2 Todesfälle zu verzeichnen, die im Laufe der Behandlung eintraten. Einmal (Fall 27) bei einem postpneumonischen Pleuraempyem rechts, dem Grippe und Masern vorangegangen waren und dessen dünnflüssiges eitriges Punktat kulturell steril war, da das Pleuraempyem schon 2 Wochen bestand und der allgemeine Kräftezustand des Kindes sehr mäßig war bei nebenherbestehender Rachitis und Atemnoterscheinungen auftraten, wurde dennoch durch eine Rippenrefektion in 3 cm Ausdehnung versucht, die infauste Prognose abzuwenden. Doch trat unter zunehmender Kreislaufschwäche 10 Tage nach der Operation der Exitus ein. Gleichzeitig hatte sich dazu ante exitum eine serofibrinöse Pleuritis der anderen Seite ausgebildet. Die Sektion

ergab eine bestehengebliebene Karnifikation des ganzen rechten Unterlappens, wandständige Thromben im rechten Herzventrikel, serofibrinöse Pleuritis links mit Kompressionsatelektasen der linken Lunge.

Im anderen Fall (Nr. 49) bei einem postpneumonischen Pleuraempyem links konnten allein durch die Probepunktion 650 ccm foetider, dünnflüssiger Eiter entleert werden, in dem sich bakteriologisch Streptokokken nachweisen ließen. An der Punktionsstelle entwickelte sich bald ein Weichteilabszeß. Auch hier war bei der Aufnahme in die Klinik der Allgemeinzustand des Kindes schon sehr schlecht. Dazu traten Herzverdrängungsercheinungen auf, so daß man zur Rippenresektion in 5 cm Ausdehnung schritt, wobei wiederum 500 ccm Eiter entleert werden konnten. Nach dem chirurgischen Eingriff trat bei reichlichem Eiterabfluß eine Besserung des Krankheitszustandes ein. Doch erlag trotzdem das Kind 6 Tage nach der Operation infolge einer hinzugekommenen Pneumonie des rechten Unterlappens, was auch die Sektion bestätigte; die Empyemhöhle links war leer, der linke Unterlappen atelektatisch.

In einem Fall (Nr. 37), einem postpneumonischen Pleuraempyem, das durch mehrfache Punktionen weitgehend im Laufe von 30 Tagen gebessert war, wurde die Behandlung und völlige Genesung durch Fortnahme des Kindes aus der Klinik von seinen Eltern vorzeitig unterbrochen. Bakteriologisch war kein Befund aus der Krankengeschichte zu erheben.

Bei den übrigen 28 Fällen, die alle mit Erfolg ausheilten, war die **Behandlung** folgende:

Durch **mehrfache Punktionen allein** kam das metapneumonisch verlaufende Pleuraempyem in vier Fällen (Nr. 24, 29, 31, 42,) zur Ausheilung. Der Allgemein- und Kräftezustand des Kindes war in diesen Fällen meist ausreichend, wenn nicht sogar gut. Auch waren die Krankheitsercheinungen nicht allzu bedrohlich. Die Temperatur war durchschnittlich 38°. Bakteriologisch fanden sich in 3 Fällen (Nr. 24, 29, 42) im Eiter Pneumokokken; im Fall 31 waren Streptokokken nachweisbar. Meist genügten bereits 2—3 Punktionen, wobei 20—150 ccm Eiter entleert wurden, um

das Empyem zur Ausheilung zu bringen bei zunehmender Besserung des Allgemeinbefindens, so daß ein chirurgischer Eingriff erspart werden konnte. Im Fall 29 war z. B. nach der Probepunktion von 30 ccm Eiter nur noch eine Punktion von wenigen ccm Eiter erforderlich; die Temperatur blieb danach normal. Die Heilungsdauer (Zeitpunkt vom Beginn der Behandlung) betrug in diesen Fällen 10—42 Tage bis zur völligen Genesung.

Durch Punktion mit **anschließender Aspirationsdrainage** mittels Wasserstrahlpumpe (Fall 25, 38) oder Bülow'scher Hebedrainage (Fall 52) bei Anwendung des Drachter-Stachels erfolgte in 3 Fällen eine Ausheilung des metapneumonisch verlaufenden Pleuraempyems. In den beiden Fällen 25 und 52 wurde erst versucht, eine erfolgreiche Heilung durch mehrfache Punktionen von 100—400 ccm Eiter, wie im Fall 52, zu erreichen, da der Allgemeinzustand des Kindes ausreichend bis gut war und auch keine allzu bedrohlichen Krankheitsverschlimmerungen außer einer nur mäßigen Herzverdrängung vorlagen. Bakteriologisch fanden sich im Eiter Pneumokokken (Fall 25) und Streptokokken (Fall 52). Schließlich wurde aber doch die Aspirationsdrainage notwendig, da sich noch immer reichliche Eitermengen zeigten, die Temperaturen nicht zur Norm zurückkehrten. Hierdurch wurde dann eine bessere Eiterentleerung erreicht, so daß diese dann nach 14—30 Tagen, wo nur noch eine geringe Sekretion bestand, wieder abgesetzt werden konnte bei weitgehender Besserung des Allgemeinzustandes. Im Fall 38, wo die Pneumonie schon fast zwei Monate zurücklag und das Pleuraempyem damit wohl offenbar auch schon eine gewisse Zeit bestand, — näheres ist aus der Krankengeschichte nicht zu ersehen —, war das Krankheitsbild ein mehr bedrohliches, so daß sogleich bei Sicherstellung der Diagnose die Aspirationsdrainage eingeführt wurde; der Allgemeinzustand des Kindes war bei der Aufnahme sehr elend. Dazu bestand eine Herzverdrängung und eine diffuse Verschattung über der linken Lunge. Im Eiter fanden sich Pneumokokken. Durch die Aspirationsdrainage wurde eine rasche und gute Entleerung erzielt, so daß sie schon nach 13 Tagen wieder abgesetzt werden konnte, nachdem die Sekretion so gut wie aufgehört hatte, die Temperatur zur Norm zurückgekehrt war und das Allgemein-

befinden des Kindes sich gut gebessert hatte. Die Heilungsdauer bei diesen 3 Fällen bis zur völligen Genesung schwankte zwischen 25 bis 38 Tagen. Ein größerer chirurgischer Eingriff war hier nicht erforderlich, da die ausgeführte Behandlung schon den erfolgreichen Umschwung und die Besserung des Krankheitszustandes brachte.

Die **intercostale Thorakotomie** mit folgender einfacher Drainage wurde in einem Fall (Nr. 34) erfolgreich angewandt, nachdem das postpneumonische Pleuraempyem eine gewisse Zeit bestanden haben mag. Der Allgemeinzustand des Kindes war bereits schlecht, die Temperatur um 38°. Bakteriologisch waren Diplokokken vorhanden. Durch die intercostale Incision wurde aber schon eine gute und reichliche Eiterentleerung bei Hebung des Allgemeinbefindens des Kindes und Sinken der Temperatur erreicht, so daß sich ein größerer chirurgischer Eingriff erübrigte. Die Heilungsdauer beanspruchte 25 Tage.

Die **einfache Rippenresektion** einer Rippe in 2—3 cm Ausdehnung wurde insgesamt in 14 Fällen erfolgreich ausgeführt. Entweder bestand vor diesem chirurgischen Eingriff das Pleuraempyem schon 2—3 Wochen und es hatte sich bereits die formative Periode des Empyems (dickflüssiger, rahmiger Eiter) ausgebildet oder es war nach vorhergehenden mehrfachen Punktionen und folgender einfacher Drainage, bzw. geschlossener Aspirationsdrainage keine Ausheilung durch sie zu erreichen, wie in den Fällen 25, 45, 48. Die Rippenresektion wurde kurz nach der Aufnahme des Kindes 11mal ausgeführt und zwar in den Fällen 26, 28, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 44. Metapneumonisch war es hier in 12 Fällen (Nr. 26, 28, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 48), wobei sich in 9 Fällen Pneumokokkeneiter fand; in einem Fall (Nr. 43) war er steril, in den Fällen 30 und 35 war kein bakteriologischer Befund zu erheben. Offenbar parapneumonisch war das Pleuraempyem wohl in 2 Fällen (Nr. 32 und 45), wobei im Fall 45 sich Pneumokokken im Eiter nachweisen ließen, wogegen im Fall 32 kein Befund darüber aus der Krankengeschichte erhoben werden konnte.

Über das Krankheitsbild wäre in all diesen Fällen daselbe anzuführen, wie ich es bei den Empyemen der Kinder von 1—2 Jahren beschrieben habe, so daß eine Indikation auch hier zu einem größe-

ren chirurgischen Eingriff berechtigt war, der dann oft erst einen guten raschen Eiterabfluß sicherte und eine Besserung des meist sehr schlechten, oft sogar schon defolaten allgemeinen Krankheitszustandes des Kindes veranlaßte und die völlige Genesung erreichen ließ.

An die Rippenrefektion wurde in 2 Fällen (Nr. 44 und 48) die Aspirationsdrainage mittels Wasserstrahlpumpe angeschlossen. Im Fall 44 wurde, da der Allgemeinzustand des Kindes noch nicht so entkräftet war und der pneumokokkenhaltige Eiter schon stark fibrinhaltig war, die Pneumonie bereits einen Monat zurücklag, sogleich nach der Aufnahme des Kindes das postpneumonische Pleuraempyem durch Rippenrefektion eröffnet. Im Fall 48 wurde das postpneumonische Pleuraempyem zwar erst noch durch die Punktion mit dem Drachter-Stachel und Aspirationsdrainage auszuhelen versucht, die aber infolge Verstopfung durch Fibringerinnsel versagte; zudem ließen sich nur wenige ccm Eiter hierdurch entleeren. Erst die Rippenrefektion verschaffte guten Eiterabfluß.

Die Heilungsdauer betrug in diesen beiden Fällen 44-48 Tage.

In einem Fall Nr. 32) wurde bei dem parapneumonisch verlaufenden Pleuraempyem die Empyemhöhle am gleichen Tage der Aufnahme des Kindes in die Klinik eröffnet, dessen Kräfte- und Allgemeinzustand noch ausreichend gut war, obwohl eine Otitis media gleichzeitig bestand. Bei Ausführung der Rippenrefektion konnten 900 ccm mit Fibrinflocken durchsetzter Eiter entleert werden, wonach die Empyemhöhle durch Hautnähte nach Einlegung eines Drains durch einen Ventilverband sicher abgeschlossen wurde. Die Heilungsdauer betrug hierdurch 25 Tage.

In 11 Fällen (Nr. 26, 28, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 45) wurde nach der Rippenrefektion nur die einfache Drainage ausgeführt; die Heilungsdauer beanspruchte hierbei durchschnittlich 26 Tage, sie schwankte aber zwischen 17 Tagen und 3 Monaten.

Hierunter war das Pleuraempyem im Fall 45 offenbar wohl parapneumonisch (Erreger: Pneumokokken). Mehrfach vorangegangene Punktionen im Laufe von 18 Tagen mit Entleerung von je 10—500 ccm Eiter, wie auch danach eine Einlegung des Drachter-Stachels mit angeschlossener Aspirationsdrainage brachten keine

Besserung des Krankheitszustandes, sondern erst die Rippenrefektion.

In den übrigen 10 Fällen war das Pleuraempyem metapneumonisch, wobei in 7 Fällen im Eiter Pneumokokken nachweisbar waren (Fall 26, 28, 33, 36, 39, 40, 41); in einem Fall (Nr. 43) war er steril; in 2 Fällen (Nr. 30 und 35) war kein Befund darüber in der Krankengeschichte zu erheben.

Im Fall 26 des wandständigen interlobären Empyems war nach der Punktion von dickem rahmigen Eiter nur von vornherein eine erfolgreiche Ausheilung desselben durch eine Rippenrefektion möglich, die 10 Tage danach erfolgte.

Ebenso brachte im Fall 28 die Rippenrefektion, nachdem bereits schon dicker rahmiger Eiter festgestellt worden war, die gewünschte Ausheilung; gleichfalls im Fall 33.

Im Fall 36 war die Rippenrefektion, die 12 Tage nach der Probepunktion erfolgte, zur erfolgreichen Ausheilung berechtigt, da allein durch die Punktion schon 500 ccm Eiter entleert werden konnten; zudem lag die Pneumonie bereits einen Monat zurück und das Allgemeinbefinden des Kindes war bereits schlecht.

Im Fall 39 hatte sich bereits ein Brustwandabzess ausgebildet, das Allgemeinbefinden des Kindes war daher sehr schlecht; die Pneumonie lag fast 1½ Monate zurück. Aus der großen Empyemhöhle entleerten sich bei der Rippenrefektion unter starkem Druck reichliche Eitermengen.

Im Fall 41 war zwar der Kräftezustand des Kindes gut, jedoch bestanden bereits Atemnoterscheinungen; die Pneumonie lag schon einen Monat zurück. Durch die Rippenrefektion wurde eine etwa 8 cm breite, und nach allen Seiten durch Verwachsungen abgekapselte Empyemhöhle eröffnet mit reichlich dicken, fibrinhaltigem Eiter.

Im Fall 40 konnten bereits zehn Tage vor der Rippenrefektion 100 ccm Eiter durch Punktion entleert werden; dazu war der Kräftezustand des Kindes schlecht, und es war keine Besserung unter Konstantbleiben der Temperatur auf 40° eingetreten. Die Pneumonie lag einen Monat zurück; die Erkrankung an Mäfern 16 Tage. Aus der Empyemhöhle konnte bei der Rippenrefektion 1 l

dickflüssiger Eiter entleert werden, wonach die Temperatur zur Norm zurückging und die Heilung eintrat.

Eine erfolgreiche Ausheilung des metapneumonisch verlaufenen Pleuraempyems wurde durch die **breite Rippenrefektion** einer Rippe in 4—5 cm Ausdehnung in den beiden Fällen 22 und 50, oder auch zweier Rippen in 2—4 cm Ausdehnung in den beiden Fällen 23 und 46 erreicht. In dem gelben, dickflüssigen, mit Fibrin durchsetztem Eiter fanden sich in 3 Fällen Pneumokokken, während im Fall 23 bakteriologisch keine Angabe aus der Krankengeschichte zu erheben war. In allen 4 Fällen bestand das Pleuraempyem nach Sicherstellung der Diagnose bereits 14 Tage bis zu einem Monat; im Fall 23 war der Pneumonie bereits kurz vorher eine Erkrankung an Mafern vorausgegangen. Der allgemeine Kräftezustand des Kindes war daher meist sehr mäßig, dazu waren Atemnoterscheinungen, Herzverdrängungsercheinungen vorhanden. Auch war in diesen 4 Fällen trotz vorhergehenden mehrfachen Eiterentleerungen durch einfache Punktion (Fall 22 und 23) oder auch durch Anschließung einer Aspirationsdrainage bei Anwendung des Drachter-Stachels (Fall 46 und 50) keine wesentliche Besserung des Krankheitszustandes und des Allgemeinbefindens des Kindes bei Konstantbleiben der Temperatur um 39° zu erreichen. Erst die breite Rippenrefektion brachte den gewünschten reichlichen Eiterabfluß und führte schließlich bei Besserung des Allgemeinbefindens und Sinken der Temperatur zur Ausheilung. In 2 Fällen (Nr. 46 und 50) wurde hierbei die geschlossene Aspirationsdrainage mittels Wasserstrahlpumpe angewandt, die nach 28—30 Tagen abgesetzt werden konnte. Die Heilungsdauer betrug in diesen beiden Fällen bis zur völligen Gefundung 35—40 Tage. Die einfache Drainage mit luftdicht geschlossenem Ventilverband mit nochmals darübergelegtem Mullzellstoffverband beanspruchte im Fall 23 eine Heilungsdauer von 25 Tagen; ebenso verlangte die einfache Drainage im Fall 22 auch nur 25 Tage als Heilungsdauer.

Eine **ausgedehnte Rippenrefektion** (Thorakoplastik) wurde bei 2 chronisch gewordenen metapneumonisch verlaufenden Pleuraempyemen (Fall 46 und 51) zur erfolgreichen Ausheilung der veralterten Empyemhöhle ausgeführt, nachdem sie fast ein Jahr lang

bestanden hatte und erfolglos auswärts behandelt worden war. Im Fall 47 war bereits 2mal im längeren Abstand hintereinander eine Rippenresektion versucht worden, ohne daß es dabei völlig zur Ausheilung kam. Der allgemeine Kräftezustand des Kindes war daher bei der Aufnahme in die Klinik sehr mäßig, die Temperatur war zwar $37,6^{\circ}$ und der Puls 120; die rechte Thoraxseite war abgeflacht und schleppte bei der Atmung deutlich nach, dazu bestand eine Linksskoliose der Brustwirbelsäule. Aus einer Fistel in Höhe der 8. Rippe entleerte sich eitrig-eitrige Flüssigkeit, in die man mit der Sonde 8 cm tief hineingelangte. Röntgenologisch zeigte die Lunge in den äußeren Partien eine Verschattung und das Zwerchfell war fixiert, wenig beweglich.

Im Fall 51 war zur Ausheilung des Pleuraempyems auswärtig eine intercostale Thorakotomie mit einfacher Drainage versucht worden, jedoch entleerte sich aus der zurückgebliebenen Fistel nach 2—3 Monaten erneut Eiter. Auch hier war der Kräftezustand des Kindes bei der Aufnahme in die Klinik sehr mäßig, die Temperatur war $37,6^{\circ}$, der Puls 112; mit der Sonde gelangte man 6 cm tief durch die Fistel ein. Röntgenologisch waren die unteren Lungenpartien links verschattet, das Zwerchfell links war nicht beweglich; eine Kontrastfüllung der Fistel ergab eine faustgroße Empyemresthöhle.

In beiden Fällen wurde die 5.—9. Rippe in einer Ausdehnung von 10—15 cm reseziert und die 2 cm verdickte Pleuraschwarte mitentfernt; in die starrwandige derbe Empyemhöhle wurde ein Hautmuskellappen eingeschlagen, die Höhle dann durch Hautnaht geschlossen und darüber ein Kompressionsverband angelegt.

Im Fall 47 fand sich in der veralteten Empyemhöhle ein zurückgebliebenes Stück eines alten Gummidrain. In den folgenden Tagen war nach dem großen chirurgischen Eingriff, den das Kind gut überstand, die serös-eitrig-eitrige Sekretion aus dem eingelegten Drain reichlich, die Temperatur leicht remittierend zwischen $38—39^{\circ}$, Puls 120. 10 Tage nach der Operation kehrte die Temperatur schon zur Norm zurück und das Allgemeinbefinden des Kindes besserte sich zusehends; nach weiteren 14 Tagen konnte die einfache

Drainage völlig abgesetzt werden. Doch beanspruchte die Heilungsdauer bis zur völligen Gefundung 2 Monate.

Im Fall 51 war nach der Operation die Sekretion nur gering und die Temperatur bereits 6 Tage danach normal. Eine Drainage war nicht notwendig. Das Allgemeinbefinden besserte sich rasch, die Heilungsdauer betrug hier 45 Tage.

Zur rascheren Wiederentfaltung der Lunge wurde in allen durch Rippenrefektion behandelten Fällen eine aktive Lungengymnastik betrieben, sobald es der Allgemein- und Kräftezustand des Kindes bei fast normal werdender Temperatur erlaubte, sei es durch Aufblasen von Gummitieren, Spielen von Mundharmonika, oder durch Summübungen.

Dazu wurden zur Hebung des meist oft sehr geschwächten Kräftezustandes des Kindes roborierende Maßnahmen durchgeführt, sei es durch Traubenzuckerinfusionen, Lebertran, Vigantol oder durch Höhensonne.

Die 31 durch Rippenrefektion behandelten Empyemfälle, soweit die Angaben darüber zu erheben waren, wurden meist in der Äthernarkose operiert und zwar 13 mal (Fall 11, 13, 14, 23, 27, 30, 32, 36, 39, 41, 43, 44, 49), in Avertin-Äthernarkose 2 mal (Fall 47 und 51), im Chloräthyl- (Fall 9) und Solästinrausch (Fall 26) je nur einmal, in Lokalanästhesie 2 mal (Fall 35 und 40). Bei keinem der Fälle hat sich ein verhängnisvoller Zwischenfall während der Operation ereignet. In den Fällen 14, 27, 49 trat zwar später der Exitus ein, der aber nicht auf die Narkose zurückzuführen war.

Spülungen mit Rivanol wurden nur in einem durch Rippenrefektion behandelten Fall (Nr. 14) angewandt und nur 4 mal physiologische Kochsalzspülungen bei einem durch intercostale Thorakotomie behandelten Fall (Nr. 2) und bei 3 durch Punktion und folgender Aspirationsdrainage behandelten Fällen (Nr. 3, 8, 37). Ein bedeutungsvoller, wesentlicher Fortschritt zur Ausheilung des Empyems wurde bei ihnen zwar nicht gesehen.

Aus der Zusammenstellung lassen sich hinsichtlich der Therapie des Pleuraempyems folgende Schlüsse ziehen:

Unter den 52 beschriebenen Empyemfällen sind 6 Fälle gestorben. Sowohl im Alter von 1—2, wie von 3—14 Jahren fällt der Tod der eingeleiteten Therapie kaum zur Last. Zwei Kleinkinder (Fall 1 und 17) kamen bereits in so desolatem Zustand in die Klinik, daß der Tod kurz nach der Aufnahme eintrat.

Im Laufe der Behandlung (intercostale Thoracotomie) erlag Fall 2; das Kind war ebenfalls sehr elend mit einer schweren Otitis media eingeliefert worden; die Begleitpneumonie ging bis zum Tode nicht zurück.

Unter den 31 durch Rippenresektion behandelten Fällen trat nur in 3 Fällen (14, 27, 49) der Exitus ein. Die von Anfang an bestehende Entkräftung nahm trotz Operation fortschreitend zu, ebenso wie Kreislauffschwäche und Anaemie. Die Sektion ergab jeweils eine Karnifikation der Lunge, eine frisch hinzugekommene Pneumonie der anderen Seite, Verfettung von Leber und Nieren bei bestehendem status lymphaticus.

Um einen Schluß zu ziehen über die zweckmäßigste Behandlung, ist das Krankengut zu gering. Immerhin ist zu sagen, daß der Rippenresektion mit folgender geschlossener Behandlung, Aspirationsdrainage und Thiersch'schem Ventilverband der Vorzug zu geben ist, da sie uns eine größere Übersichtsmöglichkeit über das Empyem selbst gibt, einen guten Abfluß des Eiters sichert und zur baldigen Wiederentfaltung der Lunge beiträgt; durch sie kann die raschere Heilung des Empyems begünstigt und vor allem das Chronischwerden weitgehend verhütet werden. Voraussetzung bleibt freilich, daß die eingangs angeführten Behandlungsgrundsätze, betreffs des Zeitpunktes für den operativen Eingriff unter Ausbildung der formativen Periode des Empyems gewertet und beobachtet sind.

Aber auch die schonenderen Eingriffe haben ihre Geltung. Sowohl beim para- wie metapneumonischen Empyem, beim Kleinkind, wie beim älteren Kind hat die Punktion allein, bzw. die Punktion mit folgender Aspirationsdrainage gute Erfolge gezeitigt, wenn der Allgemein- und Kräftezustand des Kindes noch ausreichend gut war, die Krankheitserrscheinungen nicht allzu bedrohlich waren. Die intercostale Thoracotomie wurde nur selten ausgeführt.

Die breite Rippenrefektion ist indiziert bei lange bestehenden, renitenten Empyemen, bei stark eingedickten großen Eitermengen mit Ausbildung der formativen Periode des Empyems oder bei alten Empyemresthöhlen.

Im übrigen ist zu bedenken, daß die Mortalität beim kindlichen Pleuraempyem nicht nur vom Empyem allein abhängt.

Graham, Everts, Berck führen an, daß die wenigsten Patienten durch das Empyem an sich sterben. Die Todesursache ist die Pneumonie oder andere ernste Komplikationen wie: Gehirnabszesse, Meningitis, Peritonitis usw. Vom Charakter dieser Begleitkrankheiten hängt vielfach die Anpreisung bestimmter Methoden weitgehend ab, was manchmal in Statistiken nicht genügend berücksichtigt wird. Rohrer betont, daß das Bild des akuten Empyems im Kindesalter von Jahr zu Jahr wechselt und abhängig ist von den verschiedensten Einflüssen, von den Eigentümlichkeiten der Individuen selbst, von der Art und Virulenz der infizierenden Organismen, von der Beschaffenheit und Ausdehnung der Primärerkrankung der Lungen, von den begleitenden Komplikationen. Auch Eggers weist auf die Qualität der Infektion hin, die in den Jahren 1917—18 die höchste Mortalität erreichte.

Zusammenfassung.

Nach eingehendem Studium des Schrifttums ist im allgemeinen zu sagen, daß sich für die Behandlung des kindlichen Pleuraempyems keine festen schablonenhaften Regeln aufstellen lassen, sondern daß ausschlaggebend die Art des therapeutischen Vorgehens bei dem einzelnen Fall von der Qualität der Infektion, vom Allgemein- und Kräftezustand des Kindes, von der Sicherstellung der Diagnose, vom allgemeinen Krankheitszustand überhaupt bestimmt wird; dazu sind die Begleiterkrankungen zu beobachten.

Unter Berücksichtigung des Schrifttums wurde das Krankmaterial der Chirurgischen Universitätsklinik und des St. Johannis-Hospitals in Bonn getrennt nach Empyemen im Alter von 1—2 Jahren (21 Fälle) und von 3—14 Jahren (31 Fälle) gesichtet.

Von diesen 52 Fällen gehörten 21 Fälle dem Alter von 1 bis 2 Jahren an, wovon 15 als völlig geheilt entlassen werden konnten,

während 2 als ungeheilt frühzeitig aus der Behandlung genommen wurden und 4 starben. Für den letalen Ausgang dieser 4 Fälle war weniger die Behandlung selbst, als vielmehr der denkbar schlechte Allgemein- und Kräftezustand des Kindes verantwortlich, der schon bei seiner Aufnahme in die Klinik eine infauste Prognose erwarten ließ.

Im einzelnen konnte die erfolgreiche Ausheilung des Pleuraempyems bei den 15 Fällen erreicht werden:

a) in den 4 parapneumonisch verlaufenden Pleuraempyemen bei 2 Fällen durch Punktion allein, bei einem Fall durch Punktion mit anschließender Aspirationsdrainage bei Anwendung des Drachter-Stachels und bei einem Fall durch einfache Rippenresektion.

In den durch Punktion allein, bzw. durch Punktion mit folgender Aspirationsdrainage behandelten Fällen war das allgemeine Befinden des Kindes und der Krankheitszustand noch so gut, daß sie bereits schon zur Heilung führten.

In einem Fall war die Rippenresektion erforderlich, da mehrfache Punktionen und Aspirationsdrainage allein keine Heilung brachten.

b) In den 11 metapneumonisch verlaufenden Pleuraempyemen konnten 4 Fälle durch Punktion mit folgender Aspirationsdrainage, 1 Fall durch intercostale Thoracotomie, 4 Fälle durch einfache Rippenresektion und 2 Fälle durch die breite Rippenresektion erfolgreich zur völligen Genesung gebracht werden.

In den durch Punktion und Aspirationsdrainage behandelten Fällen und in dem durch intercostale Thoracotomie behandelten Fall war der Krankheitszustand nicht so bedrohlich, daß ein größerer chirurgischer Eingriff erforderlich war.
chirurgischer Eingriff erforderlich war.

In den durch einfache Rippenresektion behandelten Fällen hatte die vorhergehende schonendere Behandlung keine Ausheilung gebracht. In der formativen Periode des Empyems hatte sich bereits dickflüssiger, rahmiger Eiter ausgebildet.

In den durch die breite Rippenresektion behandelten 2 Fällen konnte das 2—3 Monate bereits bestehende veraltete Pleura-

empyem nur allein durch diesen größeren chirurgischen Eingriff von vorne herein zur erfolgreichen Ausheilung gebracht werden.

Dem Alter von 3—14 Jahren des Krankenmaterials gehörten unter den 52 Fällen 31 an, wovon 28 Fälle als völlig genesen aus der Behandlung kamen, während 1 Fall als ungeheilt durch frühzeitige Fortnahme aus der Behandlung entlassen wurde und zwei Fälle starben. Der Exitus war auch hier wieder mehr schon durch den schlechten Allgemeinzustand des Kindes, durch die Qualität der Infektion, durch neue Begleiterkrankungen, wie einer Pneumonie der anderen Seite, bedingt als wie durch die Behandlung.

Im einzelnen konnte die erfolgreiche Ausheilung des Pleuraempyems bei den 28 Fällen erreicht werden:

a) in den beiden offenbar parapneumonisch verlaufenden Pleuraempyemen durch die einfache Rippenresektion. Dieser chirurgische Eingriff war erforderlich, da große eingedickte Eitermengen zu entleeren waren.

b) In den 26 metapneumonisch verlaufenden Pleuraempyemen konnten 4 Fälle durch Punktion allein, 3 Fälle durch Punktion mit folgender Aspirationsdrainage, 1 Fall durch intercostale Thoracotomie, 12 Fälle durch die einfache Rippenresektion und 6 Fälle durch die breite Rippenresektion, bzw. Thorakoplastik erfolgreich zur Genesung gebracht werden.

In den 4 durch Punktion allein und in den 3 durch Punktion mit folgender Aspirationsdrainage behandelten Fällen war der Allgemein- und Kräftezustand des Kindes noch ausreichend gut, so daß kein chirurgischer Eingriff zur Ausheilung erforderlich war.

In dem 1 durch intercostale Thoracotomie behandelten Fall war der Krankheitszustand bedrohlicher, so daß man die rasche Eiterentleerung anstreben mußte.

Die einfache Rippenresektion wurde in den 12 Fällen aus den gleichen Gründen wie beim Kleinkind ausgeführt.

In den 6 durch die breite Rippenresektion, bzw. Thorakoplastik behandelten Fällen hatte vorhergehende schonendere Behandlung keine Ausheilung gebracht, oder es bestanden Resthöhlen.

Zum Schluß meiner Ausführungen ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Freiherrn von Redwitz für die gütige Überlassung des Themas und Übernahme des Referates, Herrn Dr. med. habil. Derra für die freundliche Beratung bei der Zusammenstellung ergebenst zu danken.

Literaturverzeichnis.

- Acuña, Mamerto: Die eitrige Pleuritis beim Kinde in der ersten Kindheit. Arch. argent. Pediatr. 1, 46—73, 1930 (Span.). Ref. Z.-Org. Chir. 52, 118, 1931.
- Allen, G. M. van: Zit. bei Müller, George
- Anisratenko, J.: Ergebnisse der Behandlung der eitrigen Brustfellentzündung im Verlauf von 10 Jahren im Oktoberkrankenhaus in Kijev. (II. Chir. Klin. Med. Hochsch. Kijev). Vestn. Chir. H. 37, 49—55, 1935. Ref. Z.-Org. Chir. 75, 638, 1935.
- Arnstein, H.: Zur Frage des sog. Pleurashocks. Wien. klin. Wochenschr. 300—2, 1934 I. Ref. Z.-Org. Chir. 67, 569, 1934.
- Aron, Hans: Empyembehandlung im Säuglings- und Kindesalter, Tung-Chi, 8, 325—36, 1933. Ref. Z.-Org. Chir. 66, 519, 1934.
- Bauer, Curt: Über die Behandlung und Komplikationen der Pleuraempyeme (Chir. Abt. Ev. Krankenhaus Köln-Lindenthal). Arch. klin. Chir. 168, 269—283, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 57, 469, 1932.
- Bessesen, Daniel, H., Surgical treatment of chronic empyema. Amer. J. Surg. N. s. 10, 472—474, 1930. Ref. Z.-Org. Chir. 53, 633, 1931.
- Bettmann, Ralph, B.: The treatment of acute empyema (Surg. Dep., Michael Reese Hosp., Chicago), Surg. etc. 54, 39—51, 1932. Ref. Z.-Org. Chir. 57, 548, 1932.
- and Crohn, Nathan: The treatment of acute empyema complicated with a bronchial fistula. Use of the closed method. (Surg. serv. Michael Reese Hosp. Chicago). J. amer. med. Assor. 91, 1967—1988, 1928. Ref. Z.-Org. Chir. 46, 123, 1929.

- Binney, Horace: The treatment of empyema following pneumonia. *New England J. Med.* 199, 410—415, 1928. Ref. *Z.-Org. Chir.* 44, 402, 1929.
- Bloch, Harry, and Parrish, Paul L.: Acute Pyothorax. Treatment of children and infants by aspiration of pus and air replacement (Pediatr. Serv. Kings County Hosp., Brooklyn). *Amer. J. Des. Childr.* 46, 518—521, 1933. Ref. *Z.-Org. Chir.* 65, 736, 1934.
- Böhm: Anaemie bei Pleuraempyemen. *Chir. Kongr.* 54, Tag. d. Dtsch. Gef. f. Chir. Berlin. Sitzg. v. 23—26, IV. 1930 (Leipzig). Ref. *Z.-Org. Chir.* 50, 89, 1930.
- Boller, R.: Über eine kombinierte Spül- und Jodölbehandlung des nicht tuberkulösen Empyems. (I. Med. Abt. Kaiserin Elisabeth-Spital, Wien.) *Wien. Arch. inn. Med.* 23, 37—60, 1932. Ref. *Z.-Org. Chir.* 61, 517, 1933.
- Bonell, G. und Tomassini, J.: Zusammenarbeit von Chirurgie und Kinderheilkunde bei der Behandlung des Empyems im Kindesalter. *Kinderärztl. Praxis*, 5, 445—49, 1934. Ref. *Z.-Org. Chir.* 72, 521, 1935.
- Brown, Alfred: The treatment of acute empyema. *West. J. Surg. etc.* 42, 170—175, 1935. Ref. *Z.-Org. Chir.* 70, 286, 1935.
- Browne, Denis: The treatment of empyema in children. *Lancet* 733—738, 1930 II. Ref. *Z.-Org. Chir.* 52, 689, 1931.
- Brock, R. C.: Observations on pleural absorption. *Brit. J. Surg.* 21, 650—663, 1934. Ref. *Z.-Org. Chir.* 68, 550, 1934.
- Burghard: Zur Pathogenese und Therapie eitriger Pleurerkrankungen im Säuglingsalter. *Zt. f. Kinderheilkunde*, 42, 156, 1926.
- Čársky, Konstantin: Zur Behandlung des akuten Pleuraempyems. *Chir. Klin. Univ. Bratislava*) Bratislav. lek. Listy, 13, 443 bis 448, 1933. Ref. *Z.-Org. Chir.* 65, 148, 1934.
- Catteruccia, C.: Sul trattamento delle pleuriti purulente nell'infanzia. (Ist. di Clin. Pediatr. Univ. Roma.) *Pediatr. Riv.* 37, 375—384, 1929. Ref. *Z.-Org. Chir.* 46, 564, 1929.
- Coccheri, Pietro: Contributio alla cura dell' empiema pneumococcico col metodo del taurocolato di soelio. (Ist. di Clin. Pediatr. Univ. Bologna.) *Arch. ital. Pediatr.* 1, 317—372, 1932. Ref. *Z.-Org. Chir.* 63, 166, 1933.
- Cocke, C. H.: Pleural shock. *Amer. Rev. Tbc.* 24, 545—557, 1931. Ref. *Z.-Org.* 58, 473, 1932.
- Cohen, Morris: Acute suppurative pleurisy in children. A study of 123 cases. (Surg. Serv. Libanon Hosp., New York) *Surg. etc.* 54, 696—701, 1932. Ref. *Z.-Org. Chir.* 59, 485, 1932.

- Coquelet, Det.: Le traitement économique des pleurésies purulentes. Arch. med. chir. Appar. respirat. 8, 289—352, 1933. Ref. Z.-Org. Chir. 65, 527, 1934.
- Danno, Jof., A.: Some principles involved in the pathologic and treatment of empyema thoracis. With particular reference to treatment by periodic aspiration or evacuation, with air replacement without drainage. Surg. etc. 56, 294—309, 1933. Ref. Z.-Org. Chir. 62, 674, 1933.
- Dardel, G.: Zur geschloßl. op. Behandlung der akuten Pleuraempyeme, Zbl. Chir. 1484—1488, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 47, 261, 1929.
- Demel, Rud.: Die Behandlung der akuten nicht tuberkulösen Brustfelleiterung. Wien. med. Wschr. 1380—1384, 1929 II. Ref. Z.-Org. Chir. 48, 739, 1930. Arch. klin. Chir. 155, 547—576, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 48, 180, 1930.
- Demel, R. und Hofbauer, L.: Die krankhaften Zustände nach operativer Behandlung des Pleuraempyems und ihre Bekämpfung. (Chir. Univ.-Klin. Wien) Wien. med. Wschr. 1169—1176, 1930 II. Ref. Z.-Org. Chir. 52, 119, 1931.
- Doskočil, A. u. Procházka, J.: Pleuraempyembehandlung mit Rivanol und Optochin in großen Dosen. Čas. lik. Česk. 1057—1061, 1932. Ref. Z.-Org. Chir. 60, 396, 1933.
- Domarus, A. von: Grundriß der inneren Medizin, 252, 1931, 6. Aufl.; Verlag Julius Springer, Berlin.
- Douglas, Beverly: Partial rib-removed with closed drainage age in the Treatment of acute empyema in infancy and childhood (Dep. of Surg., School of Med. Yale Univ., New Haven and Vanderbilt Univ., Nashville), Amer. Surg. 91, 659—668, 1930. Ref. Z.-Org. Chir. 51, 422, 1930.
- McEachern, J. D.: The treatment of acute empyema in infancy and childhood. With a report of 75 cases treated by closed drainage (Winnipeg Children Hosp.) Brit. J. Surg. 20, 653—661, 1933. Ref. Z.-Org. Chir. 64, 429, 1933.
- Closed drainage in the treatment of empyema. With a report of forty-two cases in infancy and childhood. (Winnipeg Children Hosp.) Brit. med. J. Nr. 3661, 389—391, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 54, 359, 1931.
- Ederer, Stefan: Physikalisch-chemische Gesichtspunkte in der Behandlung d. Empyeme im Kindesalter. (Kinderklin. Univ. Pécs). Klin. Wschr. 1906—1907, 1928 II. Ref. Z.-Org. Chir. 45, 621, 1929.
- McEnery, Eugene F.: Aspiration in the treatment of empyema in children, with a critical evaluation Amer. J. Dis. Childr. 44, 742—753, 1932. Ref. Z.-Org. Chir. 61, 745, 1933.

- McEnery, Eugene and Brennemann, Josef: Aspiration in the treatment of empyema in children with a critical evaluation based on ninety-four cases (Children Mem. Hosp., Chicago). Amer. J. Dis. Childr. 44, 742—753, 1932. Ref. Z.-Org. Chir. 61, 745, 1933, Aspiration in empyema of children, J. amer. med. Assoc. 93, 362—367, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 50, 586, 1930.
- Engel: Das Empyem. Handb. d. Kinderheilk. (Pfaundler-Schloßmann.) 3. Aufl., 646, 1924.
- Erdély, Gyula: Unser Verfahren z. Behandlung von Empyemen d. Säuglingsalters. St.Stefan-Krankenh.Budapest. Gyógyázat, 845—846, 1930, II. Ungarisch. Ref. Z.-Org. Chir. 52, 634, 1931, Zbl. Chir. 2982—2985, 1930. Ref. Z.-Org. Chir. 53, 173, 1931.
- Feer, E.: Erkrankung von Nase, Luftröhre, Bronchien, Lunge, Pleura. Handb. d. Kinderheilkunde (Pfaundler-Schloßmann) 3, 405, 1910.
- Finkelstein: Lehrbuch der Säuglingskrankheiten. 3. Aufl., 638, 1924.
- Fleisch, Armin: Die Behandlung der eitrigen Pleuritis im Säuglings- und Kleinkindesalter. Orv. Hetil, 1211—1213, 1930, II. Ref. Z.-Organ. Chir. 53, 633, 1931.
- Frenkl, H. und Margolis, A.: Verlauf und Ergebnisse der Behandlung von Pleuraempyemen bei Kindern auf Grund der im Anna-Maria-Hosp. in Lodz von 1911—13 beobachteten Fälle. Wacraur Gzas, lek. 8, 761—764, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 56, 499, 1932.
- Beitrag zum Verlauf und zur Behandlung des Pleuraempyems im Kindesalter. (Anna-Maria-Krankenhuas, Lodz). Mfchr. Kinderheilk. 51, 188—198, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 57, 400, 1932.
- Graham, Everts A. u. Berck, Maurice: Principles versus details in the treatment of acute empyema. Amer. Surg. 98, 520—527, 1933. Ref. Z.-Org. Chir. 66, 91, 1934.
- Grosser, Richard: Zur Frage der konservativen Therapie der Pneumococcenempyeme im frühen Kindesalter (Intern.Abt., Kinderfp. Brünn). Mfchr. Kinderheilk. 43, 222—232, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 47, 478, 1929.
- Haas, A.: Die Pleuraempyembehandlung bei Kindern in den ersten Lebensjahren und die Stachelheberdrainage nach Prof. Drachter (Chir. Abt. Univ.-Kinderklinik, München). Z. Kinderheilk. 48, 15—30, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 48, 738, 1930.

- Harloe, Ralph, F.: Empyema-Report of 351 cases treated by a closed negative pressure method. *Amer. J. Surg. N. s.* 26, 231—247, 1934. Ref. *Z.-Org. Chir.* 71, 653, 1935.
- Hanza wa, Shogoro: Zur Statistik des Empyeme pleurae mit besonderer Berücksichtigung seines Erregers. (*Chir. Klin. u. Bakt. Inst. Univ. Sendai.*) *Mitt. Path. Sendai* 6, 347—357, 1930. Ref. *Z.-Org. Chir.* 51, 232, 1930.
- Hart, Derby: Empyema, acute, chronic and tuberculous. Report of fifty cases treated by tidal irrigation and suction. (*Surg. Dep., Johns Hopkins Univ.-School of Med. a. Hosp. Baltimore.*) *J. amer. med. Assoc.* 93, 1724—1731, 1929. Ref. *Z.-Org. Chir.* 50, 435, 1930, Treatment of chronic empyema by tidal irrigation, suction and thoracoplasty. *J. thorax Surg.* 2, 157—182, 1932. Ref. *Z.-Org. Chir.* 62, 167, 1933.
- Empyema in Children. Report of thirtysix cases treated by tidal irrigation and suction. (*Dep. of Surg., Duke Univ. Durham.*) *South. med. J.* 23, 823—829, 1930. Ref. *Z.-Org. Chir.* 52, 118, 1931.
- Hathaway, Frank, J.: Modern surgery in the treatment of empyema. (*King Edward VII. Hosp. Windsor.*) *Pract.* 123, 103—110, 1929. Ref. *Z.-Org. Chir.* 48, 44, 1930.
- Head, Jerome, R.: Empyema with bronchial fistula simulating lung abscess and bronchiectasis. (*Northwestern Univ. Med. School, Chicago.*) *Surg. etc.* 53, 691—697, 1931. Ref. *Z.-Org. Chir.* 58, 830, 1932.
- Hedblom, Carl A.: The treatment of empyema. Ref. *Z.-Org. Chir.* 58, 1932. 473 *J. Amer. med. Assoc.* 97, 1943—50, 1931.
- Heubner: *Lehrbuch der Kinderkrankheiten.* 1, 251, 1911, 2, 325, 331, 1911.
- Heuer, George: Acute empyema. *J. thorac. Surg.* 1, 461—484, 1932. Ref. *Z.-Org. Chir.* 60, 395, 1933.
- Hoppe, V.: Ergebnisse der Behandlung der Pleuraabscesse bei Kindern nach dem Verfahren von Čarsky. *Polski Przyl. Chir.* 12, 799—800, 1933. Ref. *Z.-Org. Chir.* 68, 552, 1934.
- Hudson, jr. Henry W.: The treatment of acute empyema thoracis in children. Report oft eighty-six cases. (*Surg. Serv. Boston Children Hosp.*) *New England J. Med.* 202, 853—859, 1930. Ref. *Z.-Org. Chir.* 51, 145, 1930.
- Jäger, Julius: Experimentelle und klinische Daten zur konservativen chir. Therapie des akuten Empyems der Pleura. (*III. Chir. Univ.-Klin. Budapest.*) *Dtsch. Z. Chir.* 223, 412—419, 1930. Ref. *Z.-Org. Chir.* 50, 329, 1931.
- Beiträge z. Therapie des Brusthöhlenempyems, Orvosképzés.

- Sonderh. 58—69, 1920, Ungarisch. Ref. Z.-Org. Chir. 49, 434, 1930.
- Die Bronchialfistel als Komplikation des akuten Pleuraempyems. (Chir. Univ.-Klin. Budapest.) Dtsch. Z. Chir. 230, 335—337, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 54, 192, 1931.
- J a m i n, Friedrich: Über Behandlung des Pleuraempyems bei Kindern. (Univ. Kinderklin. Erlangen.) Dtsch. Z. Chir. 229, 164 bis 172, 1930. Ref. Z.-Org. Chir. 53, 633, 1931.
- K a š k a r o v, S.: Behandlung der Pleuraempyeme mit Gentianviolett (Chir. med. Hochsch. Astrachan.) Vestn. Chir. H. 82/84, 76—81, 1932 (Russisch). Ref. Z.-Org. Chir. 65, 149, 1934.
- K e y e s, E. Lawrence: Bilateral empyema of the pleural cavities (II. Surg. Div. New York Hosp.) Amer. Surg. 93, 1050 bis 1063, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 57, 471, 1932.
- K l a g e s, Friedrich: Ergebnisse der Behandlung des kindlichen Pleuraempyems mittels Rippenresektion und geschlossener Drainage. (Chir. Univ.-Klin. Halle.) Zbl. Chir., 627—633, 1933. Ref. Z.-Org. Chir. 63, 47, 1933.
- Konservative oder operative Behandlung des Pleuraempyems der Kinder? Mfchr. Kinderheilk. 57, 334—341, 1933. Ref. Z.-Org. 63, 713, 1933.
- K o o s, Aurél: Neues Verfahren bei der geschlossenen Behandlung der eitrigen Brustfellentzündung. Orvosképzés 24, Hainiss-Sonderh. 18—22, 1934. Ref. Z.-Org. Chir. 71, 190, 1935.
- K r i e g e l, Kurt: Erfahrungen über den Verlauf und Therapie des Pleuraempyems im Säuglings- und Kleinkindesalter an der Freiburger Kinderklinik. (Prof. Dr. Noeggerath.) Diss. 1930.
- K ü t t n e r, Hermann: Chirurgische Operationslehre (Bier-Braun-Kümmel) Bd. II. 6. Aufl. 253 ff. 1935. Operationen an Hals und Brust, 260 ff, 271 ff.
- L a d d and C u t l e r: Empyema in children, with analysis of 172 cases. Ref. Zbl. f. g. Khk. 11, 492, 1921.
- Mortality from empyema in children. Ref. Zbl. f. g. Khk. 18, 252, 1925.
- L a n d o i s, Felix: Die Chirurgie; Kirchner-Nordmann I, 1926. Geschichtliches zur Empyembehandlung. Verlag Urban-Schwarzenberg. 1926.
- Die Chirurgie. IV, 2. Teil, 441 ff., 1928. Die entzündlichen Erkrankungen der Pleura.
 - Die Chirurgie. IV, 2. Teil, 444 ff., 1928. Die Chirurgie der Pleura.
 - Die Chirurgie. IV, 2. Teil, 454 ff., 1928. Pleuritis purulenta oder Empyem.

- Larson, Eric: The treatment of empyema (Woodland Clin.) California a. Western. med. 27, 199—204, 2, 1927. Ref. Z.-Org. Chir. 43, 85, 1928.
- Laurinsich, Alessandro: Sulla pleuriti purulenta nell'infanzia I. Contributio alla etiopatogenesi (Ist. di Clin. Pediatr. Univ. Napoli.) Pediatr. Riv. 40, 401—413, 1932. Ref. Z.-Org. Chir. 59, 485, 1932.
- Lehtinen, V.: Über Pleuraempyeme (Helsingfors), Duodecim 46, 979—993, 1930. Ref. Z.-Org. Chir. 52, 634, 1931.
- Lewkowicz, K.: Das Problem der konservativen Empyembehandlung (Kinderklin. Univ. Krakau), Mfchr. Kinderheilk. 52, 151—167, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 58, 26, 1932.
- Lilienthal, Howard, and J. Burns Amberson: Unilateral pneumothorax. The behaviour of the mediastinum. Arch. Surg. 18, 533—541, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 46, 826, 1929.
- Linhberg, A.: Diagnose und Therapie der Pleuraempyeme, Lungenabzesse, Lungengangrän. (Chir. Univ. Klin. Tartu.) Brun's Beiträge 150, 453—462, 1930. Ref. Z.-Org. Chir. 52, 391, 1931.
- Ljachoveckij, M.: Die Schedefche Operation bei Kindern. (Chir.-Klin. Inst. f. ärztl. Fortbild., Charkow.) Surg. Clin. N. Amer. 12, 241—247, 1932. Ref. Z.-Org. Chir. 60, 396, 1933.
- Ein Fall von Schedefcher Empyemoperation Nor. chir. Arch. 23, 194—195, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 61, 517, 1933.
- Lockwood, Ambrose L.: Fundamental principles in the treatment of acute empyema. (Sect. of Surg. Lockwood-Clin. Toronto.) Surg. etc. 52, 386—393, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 54, 579, 1931.
- Melchior, Eduard: Das Pleuraempyem. Zbl. chir. 2581—2582, 1928. Ref. Z.-Org. Chir. 44, 642, 1929.
- Melchior, Eduard: Zur Therapie des Pleuraempyems. Chir. Univ.-Klin. Breslau.) Ther. Gegenwart 70, 152—158, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 47, 757, 1929.
- Mikulá, M.: Pleuraempyem beim Kinde. Čas. lék. česk. 1297 bis 1300 u. 1341—1345, (Tschech.), 1929 II. Ref. Z.-Org. Chir. 48, 536, 1930.
- Müller, George P., u. Allen, C.: The mortality of operation for acute empyema. (Surg. Div. Hosp., Univ. Pennsylv. Philadelphia.) J. thorac. Surg 1, 15—23, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 57, 110, 1932.
- Naegeli, Th.: Darstellung des Einflusses von Drucksteigerungen im Thorax auf Herz und Zirkulation in den großen Venen. Zbl. Chir. 2288, 1932. Ref. Z.-Org. Chir. 61, 107, 1933.

- Natale, Antonio: Contributo al trattamento delle pleuriti sierofibrinose con la pneumotora-cocentesi. (Ist. di Clin. Med. Univ. Roma.) Riv. Pat. e. Clin Tbc. 3, 741—762, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 48, 611, 1930.
- Neuhof, Harold, u. Berck, Maurice: Staphylococcic empyema and pyopneumothorax. (Surg. Serv. Mt. Sinai Hosp., New York.) Arch. Surg. 30, 543—556, 1935. Ref. Z.-Org. Chir. 72, 520, 1935.
- Neuhof, Harald, u. Hirshfeld, Samuel: Suppurative Pleuritis in children. Its pathogenesis, diagnosis and treatment. (Surg. Serv. Mt. Sinai Hosp. New York.) Amer. J. Dis. Childr. 44, 973—993, 1932. Ref. Z.-Org. Chir. 62, 528, 1933.
- Nicoll, Alexander: The flap operation for the treatment of acute empyema thoracis. Surg etc. 58, 206—214, 1934. Ref. Z.-Org. Chir. 67, 118, 1934.
- Nissen, R.: Die Behandlung des kindl. Empyems. (Chir. Univ., Klin. Charité, Berlin.) Ergebnisse der inneren Medizin u. Kinderheilkunde. Hrsg. v. A. Czerny. 39, 143—152, 1931. Berlin: Julius Springer. Ref. Z.-Org. Chir. 54, 191, 1931.
- Nobécourt, P.: Les péricardites purulentes á pneumocoques chez les enfants. (Hôp. des enfants malades, Paris.) Progrès med. 550—554, 1930 I. Ref. Z.-Org. Chir. 50, 587, 1930 (Blechmann).
- Noeggerath, C.: Vereinfachte Empyembehandlung b. Kinde. (Univ. Kdkl. Freiburg.) Münch. Med. Wfchr. 1931 I, 303 bis 306. Ref. Z.-Org. Chir. 54, 192, 1931.
- Ochsner, Alton, and Gage, J. M.: Acute Empyema thoracis. A statistical study with comparison of the white and the coloured races. (Dep. of Surg., Tulane Univ. School of Med. a Charity Hosp. of Louisiana, New Orleans.) Ann. surg. 94, 25—37, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 55, 755, 1931.
- Packard jr., George: Empyema in children. Surg. etc. 53, 255 bis 258, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 55, 754, 1931.
- Paßchlau, Günther, u. Lehmann, Ernst: Therap. Erfahrungen beim Pleuraempyem im Kindesalter. (Chir. Abt. Städt. Krankenhaus, Bln.) Klin. Wfchr. 542—547, 1931 I. Ref. Z.-Org. Chir. 55, 678, 1931.
- Passeron, J. S.: The treatment of purulent pleurisy by pleurotomy and balneotherapy. (San Roque's Childr. Hosp., Buenos Aires.) Lancet 870, 871, 1929 II. Ref. Z.-Org. Chir. 49, 435, 1930.
- Paszkiewicz, A.: Über die konservative Behandlung der Pleuraempyeme. Bull. internat. Acad. pol. Sci. Cl. Méd. 4, 293—306, 1932. Ref. Z.-Org. Chir. 62, 111, 1933.

- Perthes - Löwen: Lehrbuch der Chirurgie von Wullstein u. Küttner, 425, 1931, Pyothorax.
- Pirquet, v.: Krankheiten der Respirationsorgane. Lehrbuch der Kinderheilkunde (Feer). 7. Aufl. 344, 1924.
- Pétren, Gustav: Zur Frage schwerer cerebraler Symptome bei Operation an Pleura oder Lunge. (Chir. Klin. Univ. Lund.) Acta chir. scand. (Stockh.) 74, 1—18, 1934. Ref. Z.-Org. Chir. 67, 569, 1934.
- Plate, Anton: Über Empyembehandlung beim Kinde. (Kinderabt. Städt. Krankenhaus, Hildesheim.) Dtsch. med. Wschr. 528—530, 1929 I. Ref. Z.-Org. Chir. 46, 825, 1929.
- Popoviciu, G., et Toma, J.: Contribution au traitement des pleurésies purulentes des enfants par l'autopyothérapie. Rev. franc. Pédiatr. 10, 640—656, 1934. Ref. Z.-Org. Chir. 71, 655, 1935.
- Popoviciu, G.: Beitrag zur Behandlung der Pleuritis purulenta bei Kindern mit Autopyotherapie. (Sect. de Puericult. Inst. de Ig. si Sanat. Publ., Cluj.) Cluj. med. 12, 381—386, u. dtsh. Zusammenhang 413, 1931 (Rumänisch). Ref. Z.-Org. Chir. 56, 499, 1932.
- Procházka, Jaroslav: Optochinbehandlung des kindlichen Pleuraempyems. Čas. lék. česk. 1633—1638, 1930 II (Tschechisch). Ref. Z.-Org. Chir. 54, 191, 1931.
- Rapant, Vlad: Ein interessanter Fall von typhösem Empyem. Med. Klin. 1930 I, 427—428. Ref. Z.-Org. Chir. 50, 586, 1930.
- Typhusempyem. (Chir. Klin. Univ. Bruč.) Čas. lék, česk, 16—18, 1930 I. Ref. Z.-Org. Chir. 49, 672, 1930.
- Ratichvili, Gabriel: Considérations sur le traitement de la pleurésie purulente chez les enfant ... (Hosp. Tiflis.) Arch. Méd. Enf. 36, 606—614, 1933. Ref. Z.-Org. Chir. 65, 479, 1934.
- Ratner, J.: Der heutige Stand der Frage über die Behandlung akuter Pleuraempyeme. (Chir. Klin. Kazan.) Vrač. Delo 11, 292—296, 1928, Polnisch. Ref. Z.-Org. Chir. 46, 563, 1929.
- Reimold, Werner: Über Empyembehandlung im Kindesalter. Univ.-Kinderklin. Breslau.) Ther. Gegenw. 70, 117—120, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 44, 643, 1929. Zbl. Chir. 2583 bis 2587, 1928. Ref. Z.-Org. Chir. 46, 564, 1929.
- Rienhoff jr. W. F., und Davison, Wilburt: Empyema in infants under two years of age (John Hopkins Univ. School of med. a. hosp. Baltimore.) Arch. med.-chir. Appar. respirat. 4, 158—162, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 48, 536. 1930.

- Rohrer, John Verne: Acute empyema in children. (Childr. Surg. Serv. Bellevue, Willard Parker a Knickerbocker Hosp. New York.) Ann. Surg, 100, 113—124, 1934. Ref. Z.-Org. Chir. 69, 628, 1934.
- Rovello: Sull' empyema pleurico nell' infanzia. Ref. Zbl. f. g. Khk. 12, 201, 1922.
- Rütz, A.: Die Behandlung des Pleuraempyems. Klin. Wschr. 1933 II, 1414—16. (Chir. Univ. Klin. Charité Berlin.) Ref. Z.-Org. Chir. 65, 34, 1934.
- Salge: Zit. bei Zybell.
- Sano, Umetaro: A case of empyema necessitatis caused by trauma. (Childr. Clin., Imp. Univ. Kyoto.) Orient J. Dis. Infants 8, engl. Zusammenfassung 34, 1930 (Japanisch). Ref. Z.-Org. Chir. 54, 577, 1931.
- Sauerbruch, Ferd.: Brustfelleiterungen, Chir. Kongreß 53. Tag d. Dt. Gef. f. Chir., Berlin, Sitzung v. 3.—6. IV. 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 45, 746, 1929.
- Sauerbruch-Schmidt: Handbuch der prakt. Chirurgie. II. Bd. 2. Halbbd. 6. Aufl. 1931, 146 ff., 157 ff., 173 ff., 167 ff.
- Sauerbruch, Ferd.: Die Chirurgie der Brustorgane. 3. Aufl. Bd. I: Die Erkrankungen der Lungen. Ref. Z.-Org. Chir. 45, 345, 1929.
- Scollo, G.: Le pleuriti purulente dell' infanzia Boll. Accad. lanciai, Roma 7, 476—508, 1934. Ref. Z.-Org. Chir. 70, 189, 1935.
- Silber, Ludwig: Zur Empyembehandlung des Säuglings- und Kleinkindesalters. (Städt. Säuglingsheim, Breslau.) Monatschrift f. Kinderheilk. 39, H. 1/2, 35—39, 1928. Ref. Z.-Org. Chir. 44, 342, 1929.
- Sluckij, A.: Katamnestische Untersuchungen über eitrige Brustfellentzündung bei Kindern. Sovit. Pediatr. 3, 78—84, 1935. Ref. Z.-Org. Chir. 74, 360, 1935.
- Spasokukockij, S., u. (Vinograd-Finkel): Zur Frage der Pathogenese akuter eitrigter Pleuritiden. (II. Chir. Klin. II. Med. Hochsch. Moskau.) Nov. chir. Arch. 28, 369—387, 1933 (Russisch). Ref. Z.-Org. Chir. 65, 477, 1934.
- Sussi, L.: Nota clinica sulla terapia chirurgica dell' empiema nell' infanzia. (Reparto Chir. Osp. Civ. Vittorio Emanuele III, Gorizia.) Gazz. internaz. med. chir. 39, 631—636, 661—669, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 58, 26, 1932.
- Schwarz, Eugenio: Über die Behandlung der eitrigten Pleuritis im Kindesalter mit Na.Taurocholat. (Univ. Kinderklin. Messina.) Kinderärztl. Praxis 3, 542—552, 1932. Ref. Z.-Org. Chir. 62, 675, 1933.

- Stajić, St.: Behandlung der purulenten Pneumococcenpleuriden bei den Kindern. Srpski. Arch. Lekarst. 32, 278—280, 1930. (Serbo-Kroatisch.) Ref. Z.-Org. Chir. 52, 634, 1931.
- Stamm, C.: Empyembehandlung im Säuglings- u. Kleinkindesalter. (Kinderkrkh. Rothenburgsort Hamburg.) Mfchr. Kinderheilk. 49, 11—16, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 55, 32, 1931.
- Steinke, Carl, R.: Acute empyema in children. Report of 310 cases. Ann. Surg. 101, 617—623, 1935. Ref. Z.-Org. Chir. 72, 110, 1935.
- Steinke, Carl, R.: Bilateral empyema. Report of eight cases. (City a Childr. Hosp., Akron.) J. thorac. Surg. 2, 287—291, 1933. Ref. Z.-Org. Chir. 63, 47, 1933.
- Stenbuck, J. B., and Whitacer, James C.: Cases of empyema thoracic treated by Gauze poking of the pleural cavity. (Surg. Serv. Harlem Hosp. New York.) Surg. Clin. N. Amer. 11, 707—714, 1931. Ref. Z.-Org. Chir. 56, 498, 1932.
- Szabad-Gawronska, R.: Die Behandlung eitriger Pleuriden mit Rivanol bei Säuglingen u. Kindern bis zu 2 Jahren. Warszaw. Czas. lek. 6, 36—37, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 46, 279, 1929.
- Stransky, Eugen: Über eitrige Pleuritis und Thoraxempyeme im frühen Kindesalter. (Reichsanstalt f. Mutter- u. Säugl.-Pflege, Wien.) Z. Kinderheilk., 49, 229—230. 1930. Ref. Z.-Org. Chir. 52, 118, 1931.
- Strockij, A.: Weitere Beobachtungen über Autopyotherapie bei eitrigen Pleuriden im frühen Kindesalter. (Kinderkl. Med. Hochsch. Odessa.) Vrač. Gaz. 33, 288—291. Ref. Z.-Org. Chir. 47, 758, 1929.
- Versuche mit Anwendung der Autopyotherapie bei purulenten Pleuritiden im frühen Kindesalter. Odesskij. med. Z. 3, 267—272. Ref. Z.-Org. Chir. 44, 342, 1929.
- Takahashi, R.: Untersuchungen über die chem. Eigenschaften des Pneumococcenempyemeters. IV. Mitt.: Orient. J. Dis. Infants 11 2—9, 1932. Über die Fermentbildung im Pneumococcenempyemeter. Dtsche. Zusammenfassung 20, 1932 (Japanisch). V. Mitt.: Orient. J. Dis. Infants 11. Über die Wasserstoffionenkonzentration (pH) des Pneumokokkenempyemeters, dtsch. Zusammenfassung 22, 1932. (Kinderkl. Kaif. Univ. Kyoto.) Ref. Z.-Org. Chir. 61, 108, 1933.
- Thomson, F. G.: Remarks on the treatment of empyema Brit. med. J.-Nr. 3550, 89—91, 1929. (Roy united hosp., Bath.) Ref. Z.-Org. Chir. 47, 555, 1929.
- Vinograd-Finkel: Zit. bei Spasokukockij.

- Vahala, Z.: Tödl. Pleuraempyem nach Sekundärinfektion mit Di-Bazillen. Čas. lék. Česk. 1931 I, 348—351 (Tschechisch). Ref. Z.-Org. Chir. 54, 577, 1931.
- Walz, K.: Zur Technik der Empyemoperation. Erwiderung auf die Entgegnung von Atanasof. Ref. Zbl. Chir. 1155, 1932.
- Woringer, Pierre: Le traitement de la pleurésie purulente par l'optochine. (Clin. Infant., Fac. de Méd., Strasbourg.) Zbl. Chir. 1929, 3096—3098. Ref. Z.-Org. Chir. 50, 585, 1930.
- Les résultats du traitement de la pleurésie purulente par l'optochine. (Clin. Inf. Univ. Strasbourg.) Rev. franc. Pédiatr. 5, 60—96, 1929. Ref. Z.-Org. Chir. 47, 175, 1929.
- Ylppö: Zur Klinik und Cytologie der Pleuraergüsse, vor allem der serösen im Säuglingsalter. Ztschr. f. Kinderheilk. 17, 169, 1918.
- Young, R. A.: Lumleian lectures entitled a medical Review of the surgery of the chest. III. Surgery in pleural and mediastinal conditions. (Middlesex Hosp. London.) Lancet 1929 I, 805—810. Ref. Z.-Org. Chir. 47, 260, 1929.
- Zischinsky, Hermann: Ein Beitrag zur Klinik und Therapie der Pleuraempyeme im Kindesalter. (Abt. f. infektionskranke Kinder, Wilhelminenpit. Wien.) Jb. Kinderheilk. 137, 125—140, 1932. Ref. Z.-Org. Chir. 61, 109, 1933.
- Zybell: Das Empyem im Kindesalter. Ergebnisse der inneren Medizin u. Kinderheilkunde. 11, 611—39, 1911.
- Zur Klinik u. Therapie des Pleuraempyems. Monatschr. f. Kinderheilkunde 11 (Original), 370, 1913.

Lebenslauf.

Als Sohn des Apothekenbesitzers Dr. Hans Virchow und seiner Ehefrau Maria, geb. Streckenbach, wurde ich, Friedrich Wilhelm Virchow, am 9. April 1908 in Berlin geboren.

Nach Besuch des Leibniz-Gymnasiums in Berlin, des Landfermann-Gymnasiums in Duisburg und später des Realgymnasiums in Oberhausen (Rheinland) legte ich daselbst am 1. März 1929 die Reifeprüfung ab.

Danach studierte ich Medizin an den Universitäten Bonn und München und machte am 7. November 1931 in Bonn die ärztliche Vorprüfung. Darauf suchte ich meine klinische Ausbildung an der Universität in Göttingen, an der med. Akademie in Düsseldorf und an der Universität in Bonn, wo ich am 24. Januar 1935 die ärztliche Prüfung bestand.

Nach Ableistung des praktischen Jahres an der Med. Universitäts-Klinik, der Universitäts-Kinderklinik und der Chirurg. Universitäts-Klinik in Bonn erhielt ich am 15. Februar 1936 die Approbation als Arzt für das deutsche Reichsgebiet. Seitdem bin ich als nichtbeamteter Volontär-Arzt an der Chirurg. Universitäts-Klinik in Bonn tätig.
